36129

PHARMACOPOEA DANICA,

REGIA AUTORITATE A COLLEGIO MEDICO HAUNIENSI *CONSCRIPTA.*



HAUNIAE.

Apud HEINECK & FABER, Bibliopolas.

Typis NICOLAI MÖLLERI, Aulae Typographi.

1772.


WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

PRAEFATIO.

EX QUO *ſtabilito a Rege* CHRISTIANO SEXTO *glorioſiſſimae Memoriae* Collegio Medico Haunienſi, *inter alia novam Pharmacopoeam conſcribendi officium impoſitum fuit, varia nobis oblata fuere Schemata, quae tamen plures ob rationes publici juris facere merito haeſitavimus. Antiquis enim praejudiciis & praeconceptis vulgi opinionibus obvoluta Ars, multa admittere ſuadebat, quae Medicorum rationalium juſtam cenſuram merito incurrerent. Arduum vero erat opus, Hydram hancce protinus oppugnare. Lentam ſuadebant feſtinationem & conſuetudo inveterata, & cauta modeſtaque apprehenſio, ne Publico obtrudatur Opus, Seculo noſtro in omnibus, noſtra vero inprimis Scientia inclareſcenti, minus dignum. Aequus judicet Lector, an ſcopum attigerit Collegium noſtrum praeſenti hac* PHARMACOPOEAE DANICAE *Editione, quae quamvis Codicem Pharmaceuticum multo contractiorem, limatiorem, concinniorem exhibeat, tantum tamen abeſt, ut omnibus numeris abſoluta pronuntiari poſſit, ut potius plura adhuc diei poſterae & corrigenda, & eliminanda relinqui, lubenter confiteamur. Quocirca & Medicos noſtrates, & Exteros amice hortamur & precamur, velint ea, quae ad ulteriorem Operis perfectionem neceſſaria & utilia ipſis videantur,*

)(2 *benevole*

benevole nobiscum communicare, eum in finem, ut in nova forſan adornanda Editione, illa in noſtros & publicos uſus convertere poſſimus.

IN duas diſtincta eſt Partes noſtra PHARMACOPOEA. *Prima exhibet Materiam Medicam, quam* PHARMACEUTICAM *vocamus, quia non omnium, ſed eorum Simplicium enumerationem continet, quae in noſtra penu pharmaceutica aſſervanda cenſuimus. Non vero ſimplicem modo Catalogum, verum ſic adornatum ex optimis Materiae medicae Scriptoribus conquiſivimus, ut & Medicis ad Scrutinia Pharmacopoliorum, & Pharmacopoeis ipſis utilis ſit & neceſſarius.*

SEQUENTEM autem in enumerandis Simplicibus obſervavimus Methodum: Adduximus Nomen ſic dictum Officinale; Nomina Vernacula omnis, quantum fieri potuit, Danici, Norvagici, Lapponici &c. idiomatis, & Germanica. His ſubjunximus in Regno Vegetabili Nomina trivialia Illuſtris de LINNÉ; *non qvod haec ad dignoſcendam Speciem ſufficientia credamus, ſed ad facilitandam hujus in majore ejusdem Autoris de Speciebus Plantarum Opere, in quo Nomina illa trivialia ad margines notata offenduntur, explorationem. Quibus praemiſſis ſequuntur Caracteres ſenſus potiſſimum ferientes, Saporis, Odoris, nec non Figurae cujuscunque fere Simplicis; Locus natalis; Tempus collectionis, & inprimis Notae Bonitatis; in quibus aſſerendis forte prolixiores hinc inde videbimur, quam tamen incuſationem incurrere maluimus, quam contrariam.*

NE vero Operis perfectioni, quantum Noſtrum intereſt, aliquid deſit, citavimus circa finem deſcriptionis Vegeta-

bilium indigenorum, Magnificum & vere Regium Opus, ubique tam per Munificentiam Summi Statoris, Regis FRIDERICI QUINTI *gloriosissimae Memoriae, quam aeque Magni ac Benevoli Litterarum & Scientiarum Promotoris, Regis nostri Clementissimi* CHRISTIANI SEPTIMI, *in nostris terris obvium;* FLORAM *scilicet* DANICAM, *ab Illustri* OEDERO *nostro adornatam, cujus reliqua pariter, occasione ejusdem Operis edita & adhuc edenda Scripta Botanica, Medicorum nostrorum & Pharmacopoeorum attentae perlustrationi iterum iterumque commendata volumus. Indicata scilicet fuit Icon, quae Plantam in* FLORA DANICA *exhibet.*

CIRCA *Mineralia & Animalia, partim citatum Illustrem de* LINNE', *partim Celeberrimum* WALLERIUM *secuti sumus.*

MULTA, *imo egregia ad perficiendam* Materiam Pharmaceuticam *contulit Celeberrimus* P. G. HENSLER, *Medicus provincialis Regius Altonauiensis, Collegii nostri Adjunctus, qui ea, quae per plures annos circa Notas Bonitatis Simplicium, ex optimis Autoribus summo studio conquisivit, benevole nobiscum communicare non dubitavit.*

ALTERA *Pharmacopoeae nostrae Pars circa* Medicamenta composita & praeparata *versatur. Parciores fuimus in prioribus, quamvis largiores quam Londinenses & Edinenses. Etenim opinamur, Medicis rationalibus & vere doctis, genuinam Materiae medicae aliarumque ad Artem salutarem necessariarum Scientiarum cognitionem, copiam sufficientem ad conscribendas Formulas suppeditare: Agyrtis vero,*

 iisque,

iisque, qui qrope Aegrotorum Lectulos demum ad Libros Formulares confugiunt, non ſcribimus.

ANTIQUAS quasdam, ob ſupra dictas rationes, reluctanter retinuimus Compoſitiones. Mutavimus alias; novas plures ex optimis Codicibus pharmaceuticis, aliisque Autoribus, aut propria Experientia adoptavimus. Aliquae occurrunt Formulae, quae recentem, dum praeſcribuntur, exigunt Praeparationem: Has Aſteriſco (*) notavimus.

CHEMICARUM Praeparationum rigoroſius Examen iis Noſtrum debemus, quorum expertum & probatum his in rebus eſt Judicium.

ADJECIMUS Taxam *ſic dictam, Pretium Simplicium & Compoſitorum Pharmacopoeae noſtrae determinantem. Duplex illa eſt: Alia pro Regnis Daniae & Norvagiae; alia pro Holſatia & Comitatibus; cujus diſcriminis ratio ultro eluceſcit.*

SIC tandem, non ſine labore & difficultate, perfecimus Opus, dudum in noſtris Terris deſideratum, & nunc eo magis neceſſarium, cum hoc ipſo tempore placuerit AUGUSTISSIMO REGI, novis, iisque Sapientiſſimis, circa Rem Medicam univerſam, in Regnis & Ditionibus SUIS gerendam, Statutis, *novum, & egregium GLORIAE EX AMORE PATRIAE Documentum, Populo SUO impertire.*

HAUNIAE, in Collegio Medico Regio. Die XXXI. *Decembris* CIϽIϽCCLXXI.

NOTAE

N O T A E

Circa Pondera & Menſuras.

I. LIBRAM Medicam ubique in Pharmacopoea noſtra intelligimus. Eſt illa Unciarum duodecim. Si quis igitur Libram Ponderis civilis deſideret, diſtinctis hac in praeſcriptione notetur verbis, Unciarum numerum, quarum haec ſedecim habet, indicando.

II. UNCIA (℥) Drachmas octo; Drachma (ʒ) tres Scrupulos; Scrupulus (℈) Viginti Grana continent.

III. MENSURA noſtra ordinaria, (Pott) eſt Librarum duarum Ponderis civilis.

IV. HERBARUM Florumque Pondus in praeſcriptionibus per Manipulos & Pugillos determinari ſolet. Praeſtat vero & his Pondus exactius aſſignare. Sit igitur Manipulus Drachmarum trium, Pugillus Drachmae unius Ponderis.

V. IN Formularum praeſcriptione omittantur reliqui Caracteres chemici, & omnia diſtinctis Pharmacopolae indicentur verbis.

Corrigenda & Addenda.

Pag. 10. Lin. 14. lege: *Laricis.*
— 13. — 8. — Alpibus.
— 16. — 3. — pratis.
— — — 9. — Cichorei.
— 19. — 20. — tenuibus.
— 21. — 22. dele: Laserpitii.
— 26. — 12. adde: Flor. Dan. 574.
— — — 18. — Flor. Dan. 589.
— 32. — 12. — Praefertur ab Ill. de Linne Lignum Radicis, quod colore ſubfuſco a Ligno trunci, cujus color albus eſt, facile dignoſcitur.
— 35. — 18. adde: Flor. Dan. 588.

Pag. 37. Lin. 19. adde: Flor. Dan. 579.
— — — 28. — Flor. Dan. 572.
— 43. — 12. — Flor. Dan. 562.
— 44. — 18. — Flor. Dan. 580.
— 48. — 1. — Lysimachiae rubrae.
— 49. — 9. — Flor. Dan. 593.
— 50. — 21. — Flor. Dan. 574.
— 56. — 16. — Flor. Dan. 594.
— 72. — 16. lege: Cardamomum.
— 73. — 2. — diſſepimentis.
— — — 7. — efficax.
— 85. — 9. — contineat.

Pag.

Pag. 98. Lin. 25. lege: Aquae.
— 100. — 14. — Terebinthi.
— 104. — 2. post Saponariorum adde: usibus.
— 106. — 15. dele: Cocci.
— — — 22. dele: Cynipis, & adde: In Foliis.
— 107. — 6. post cocciferae adde: sive.
— 117. — 10. dele: destillationi e retorta vitrea subjiciatur & adde; in Lagena vitrea servetur.
— 118. Post Lin. ultimam adde Notam: Succus Citri post solutionem demum addendus est.
— 122. Lin. 19. lege: praecavendum.
— 127. — 13. — Incisis & contusis.
— — — 14. — Librae decem.
— 128. — 15. — Incisis & contusis.
— — — 16. — Unciae.
— 131. — 24. dele: ut solutio coaguletur, & adde: adj absolvendam praecipitationem.

Pag. 134. Lin. 9. intelligitur Oleum Nucistae stillatitium.
— 140. — 6. Concharum, lege: Testarum.
— 144. Lin. 2. lege: martialis.
— 145. — 20. agrestium, lege: asininorum.
— 149. — 1. lege: Incisis & contusis.
— — — 2. lege: libra una.
— 150. — 10. lege: vitrea.
— 178. — 25. — ex retorta.
— 203. — 7. stillatitii lege: cocti.
— 203. — 9. adde: stillatitii.
— 249. — 10. post tartarisata adde: vel Scoriarum Reguli Antimonii simplicis.
— 267. Lin. 2. dele: calore, & adde: radiis.
— 279. post Lin. 4. adde: Olei Olivarum sesquilibram.

PARS

PARS I.

MATERIA PHARMACEUTICA.

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30412134



MATERIA PHARMACEUTICA.

I.

E REGNO MINERALI.



I. *TERRAE ET LAPIDES.*

ALABASTRUM, Alebaster Dan. Alabaster German.

Alabaſtrum candicans, Gypſi ſpecies.

BOLUS ALBA. Hviid Bolus. Weiſſer Bolus.

Argillae pinguis ſpecies ex Moravia, Sileſia, Italia aliisque locis advecta.

BOLUS ARMENA. Armeniſk Bolus. Armeniſcher Bolus.

Argillae pinguis ſpecies coloris rubri, vena lutea interſtincti, durioris compagis ac reliquae terrae bolares, promte linguae adhaerens.

haerens. Olim ex Oriente advecta, nunc etiam in Galliae & Germaniae nonnullis provinciis reperitur.

Bolus Rubra. Rod Bolus. Rother Bolus.

Argillae pinguis varietas rubra, ex Bohemia & Episcopatu Salisburgensi advecta, ad Spirituum Nitri & Salis destillationem inserviens.

Calx Viva. Ulæsked Kalk. Ungelöschter Kalk.

Paratur ex Lapidibus & terris calcareis pro externo; e Conchis marinis & Ostrearum calcinatis pro interno usu.

Creta Alba. Hviid Krid. Weisse Kreide.

Terra macra alcalina, quae in Seelandia nostra reperitur. Praestantior alba, levis, non arenosa, ex Insula Moen adfertur.

Specularis Lapis. Selenites. Glacies Mariae. Marie Glas. Frauen-Eiß.

Gypsum, lamellis rhomboidalibus pellucidum, varii, ut plurimum albicantis coloris, scissile.

Terra Sigillata Alba et Rubra. Hviid og rod forseglet Jord. Weisse und rothe versiegelte Erde.

Terrae bolares, ex Silesia & Turcia allatae, in placentas formatae, cum impresso Sigillo. Sint pingues, minus friabiles atque Sabuli expertes.

II. SALIA.

Alumen Crudum Vulgare. Allun. Alaun.

Alumen Lapide fissili mineralisatum album, ex Norvagia, Scania, Anglia, Germania & Italia advectum.

Alumen Rupeum Romanum. Rod Allun. Rother Römischer Alaun.

Alu-

Alumen Lapide calcareo mineralisatum, ex Italia forma cryſtallorum advectum, coloris roſei pallidi.

BORAX. BORAX VENETA. CHRYSOCOLLA. Borax. Borras. Borax.

Sal, qvod ex peculiari ab Indiis orientalibus advecta minera, *Tincal* dicta, Venetiis & in Hollandia paratur. Eligatur Borax alba, ex parvis transparentibus maſſulis conſtans, in igne facile fluens atque vitreſcens.

COLCOTHAR VITRIOLI. Vitriol-Ueberbleibſel.

Terra rubra metallica poſt deſtillationem acidi vitriolici ſuperſtes.

NITRUM. Salpeter. Salpeter.

Eligatur purum, album, cryſtallos exhibens longas, ſexangulares, prismaticas, carbonibus ignitis inſperſum absque crepitatione promte deflagrans, atque in aqua facile ſolubile, quale ex India orientali adfertur.

NITRUM MURARIUM. ALKALI MINERALE. NATRUM. APHRONITRUM VETERUM. Mineraliſk Salt. Mineraliſches Salz.

Sal Alkali compactum, muris cellisque humidioribus ſuperficialiter adhaerens.

SAL ANGLICUM CATHARTICUM, EBSHAMENSE. Engelſk Laxeer-Salt. Engliſches Laxier-Salz.

Sal neutrum artificiale Anglicanum, ex lixivio a cryſtalliſatione Salis marini reſiduo, acido Vitrioli ſaturato paratum. Album ſit, purum & in aqua facillime ſolubile.

SAL GEMMAE. Steen-Salt. Stein-Salz.

Muria fossilis pura, semipellucida, post longum satis tempus in aqua solubilis, dura, fortiter in igne crepitans. Ex Hungaria, Transylvania, Polonia adfertur.

SAL SEDLICENSE. Seidlitzer-Salt. Seidlitzer-Salz.

Neutrum acidulare Sedlicense, ex iisdem quibus Anglicum partibus constans, cum aliquo tamen proportionis discrimine. Eligatur album & crystallisatum.

VITRIOLUM ALBUM. Hviid Vitriol. Weisser Vitriol. Galitzen-Stein. Augen-Stein.

Vitriolum Zinci album apud Gostarienses paratum, Sacchari instar album & non nimis durum.

VITRIOLUM COERULEUM. Blaa Vitriol. Blauer Vitriol.

Vitriolum Cupri coeruleum Sapphiri instar, crystallisatum.

VITRIOLUM VIRIDE. Grøn Vitriol. Grüner Vitriol. Eisen-Vitriol.

Vitriolum Ferri viride crystallisatum, ex Hungaria & Anglia advectum, coloris herbacei. Cuprum admistum prodit immissa lamina ferrea pura, cui Cuprum adhaeret.

III. INFLAMMABILIA.

AMBRA GRYSEA. AMBARUM. Ambra. Ambra.

Ambra binis vel trinis coloribus variegata, post praegressam fortem pelagi agitationem, in mari Indico ad partem Africae & vicinas insulas, a Mozambicis usque ad mare rubrum, odoratu piscata. Eligatur levis, parum odorata, quae laminae candenti imposita gratum edit odorem, & parum vel nihil relinquit, facile ad candelam liquescit & bene cohaeret.

ASPHAL-

ASPHALTUM. BITUMEN JUDAICUM. Jøde-Beeg. Judenpech.

Bitumen solidum coagulatum, nigrum, fragile, resplendens, magna copia mari mortuo innatans.

PETROLEUM ALBUM. OLEUM PETRAE. Hviid Steen-Olie. Peter-Olie. Weisses Stein- oder Berg-Oel.

Bitumen levissimum & fluidissimum Naphtha dictum, ex terra aut rimis montium exsudans, aquae & spiritibus, si purum est, supernatans, facillime inflammabile, aurum ex Aqua regis attrahens & solvens; ex Sumatra insula, Persia & Ducatu Modenensi allatum, non ingrati odoris, admodum rarum. Substituitur plerumque

PETROLEUM FLAVUM subrubellum, crassius, ex Sicilia & Italia advectum, Oleo Terebinthinae ut plurimum adulteratum.

SUCCINUM. ELECTRUM. CARABE. AMBARUM. Bernsteen. Rav. Bernstein.

Succinum pellucidum. Substantia bituminosa flava & alba, e terra effossa, aut ad littora maris Baltici collecta. Ex Jutia, insula Moen, Prussia Polonica, & Pomerania adfertur.

SULPHUR CITRINUM. Guul Svovel. Gelber Schwefel.

Sulphur nativum, *purum*, *flavum*, ex Islandia, Germania, Italia & Helvetia advectum.

IV. SEMIMETALLA.

ANTIMONIUM CRUDUM. STIBIUM. Spits-Glas. Spiesglaß.

Sit longis & splendentibus striis praeditum, & sub igne strenuo totum exhalet. Ex Hungaria advehitur.

ARGENTUM VIVUM. MERCURIUS VIVUS. HYDRARGYRUM. Qveg-Sølv. Quecksilber.

Sit

Sit purum, nullo alio metallo inquinatum, quod deflagratione in cochleari ferreo ſupra carbones detegitur, ubi avolat Mercurius, relicto metallo admiſto.

ARSENICUM ALBUM. Rottekrud. Ratzen- oder Mäuſegift.

Arſenicum nativum farinaceum, qvod Cobalti fuligo eſt, fortiſſimo igne, addita parca ſalis Alcali quantitate, in maſſam cryſtallinam vitream ſublimata.

ARSENICUM CITRINUM. Guul Arſenik. Gelber Arſenik.

Arſenicum flavum, ex Sulphuris una & Arſenici decem partibus mixtis, ſublimatione paratum.

ARSENICUM RUBRUM. Rusgeel. Rauſchgelb.

Arſenicum rubrum, ex Sulphuris duabus & Arſenici decem partibus ſublimatione paratum.

AURIPIGMENTUM. SANDARACHA GRAECORUM. Operment. Operment. Auripigment.

Arſenicum Sulphure & Lapide ſpathoſo ac micaceo mineraliſatum, minera flaveſcente. Optimum ex India orientali, Turcia & Tranſylvania advehitur, punctulis ſive micis velut aureis nitens, coloris citrini.

CALAMINARIS LAPIS. CADMIA. Galmey. Gallmey.

Zinci minera terrea, coloris flaveſcentis vel fuſci, circa Aquisgranum, nec non in Anglia & Polonia ex terra eruta.

NIHILUM ALBUM. POMPHOLYX. Hviid Nix. Weiſſes Nichts.

Tutia alba farinacea leviſſima. Flos Zinci albus inter fuſionem minerarum Zinci ſuperne lateribus camini adhaerens, atque inter fuſionem Orychalci, inſtar fumi albi, rimas fictilium penetrans.

TUTIA.

TUTIA. CADMIA. NIHIL GRYSEUM. Tutia. Tutia.
Relicta ſublimata zincina plus minus condenſata, gryſea, lateribus fornacum inferne adhærentia, in praeparatione Orychalci pariter undequaque circa vaſa fuſoria reperiunda. Sint denſa, modice gravia & dum franguntur, cinerea.

V. METALLA.

ARGENTUM CUPELLATUM. Solv. Silber.
Pro cauſtico lunari.

ARGENTUM FOLIATUM. Solvblade. Silber-Blätter.

AURUM FOLIATUM. Guldblade. Goldblätter.

CERUSSA VENETA. Bleeghvid. Bleyweiß.
Ex Plumbo vaporibus acidorum expoſito, aut iisdem ſoluto paratur. Sit alba & guſtu dulcis.

CUPRUM. Kaaber. Kupfer.
Cuprum praecipitatum, purum, ex ſolutione Vitrioli.

FERRUM. MARS. Jern. Eiſen.
Ferrum ſelectum, Dannemorae, Nordbergae &c. repe-riundum.

HAEMATITES LAPIS. Blod-Steen. Blut-Stein
Ferrum mineraliſatum, *minera figurata rubra*, *aut tritura rubente.*

LITHARGYRIUM ARGENTI. Solverglod. Silberglette.
Plumbum inter depurationem Argenti ſemivitrificatum. Praeſtat quod ex puro acquiritur Plumbo, cujus ſolutio cum Alcali volatili coeruleum non induit colorem, quod contingit, ſi cuprum admixtum fuerit.

MINIUM. Monne. Mennich. Rother Meng.
Paratur ex Cerussa citrina ad rubedinem calcinata.

PLUMBUM. SATURNUS. PLUMBUM NIGRUM. Bly. Bley.
Plumbum Galena, mineralisatum, particulis cubicis.

STANNUM ANGLICUM. JUPITER. PLUMBUM ALBUM. Engelsk Tin. Englisch Zinn.
Pro rasura purissimum nec Plumbo nec Arsenico inquinatum.

VIRIDE AERIS. AERUGO. Spansk Gron. Grünspan.
Factitium ex Cupro mediantibus vinaceris corroso. Eligatur coloris ad coeruleum vergentis, Creta non adulteratum.

II.

E REGNO VEGETABILI.

I. FUNGI. ALGAE. MUSCI.

AGARICUS. Lerke-Svamp. Lerchen-Schwamm.

Boletus suberosus, *Pini Larius annosae Fungus*, cujus sub Cortice cinereo subruffo calloso subest medulla alba, primum subdulcis dein amaricantis saporis, quae quo magis est fragilis, facile scissilis, candida, levis, eo est melior. Praestat ex Oriente advectus. Nigricans, decolor & in frustula duriora dehiscens, corruptus est.

BOVISTA. CREPITUS LUPI. Ulvefiis. Fiissop. Bofist.

Lyco-

Lycoperdon Bovista, ſub cute externa membranacea parenchyma exhibens leve, ſpongioſum, admodum molle, pulverulentum. In campis collibusque pullulat.

FUNGUS QUERNUS. Ege-Svamp. Eichen-Lunten-Schwamm.

Boletus igniarius, in caudicibus naſcens, Menſibus Auguſti ac Septembris colligendus. Praeparationem vide in Parte II.

LICHEN TERRESTRIS CINEREUS. Hunde-Mos. Hunde-Moos.

Lichen caninus, foliaceus, repens, ſubtus venoſus, villoſus, pelta marginali adſcendente, in ſylvis, juxta lapides in terra reperiundus.

LYCOPODII SEMEN ſive SULPHUR. Jordmos. Ulvefod. Luuſegræs. Kraakeſtiig. Kraakefod. Soenkraakefod. Ræve-Rever. Bärlappſamen.

Lycopodii clavati, in montoſis & ſylvoſis reperiundi, pollen. Flor. Dan. 126.

MUSCUS CUMATILIS. Alvnæver. Almnæver.

Lichen aphthoſus, in ſylvis aceroſis ſterilibus ſub Juniperis habitans.

MUSCUS ISLANDICUS. Islands Mos. Fiællegræs. Isländiſch Lungen-Moß.

Lichen Islandicus foliaceus, adſcendens, laciniatus, in Islandiae, Norvagiae, Lapponiae montanis & alpinis, ad terram & ſaxa proveniens. Flor. Dan. 155.

MUSCUS QUERNUS ARBOREUS. USNEA VULGARIS. Ege-Mos. Eichen-Moos.

Lichen plicatus, ad annoſas quereus reperiundus.

QUERCUS MARINA. Strandklever. Fattigmands Tarm. Butang. Kutang. Knoptang. Svinetang.

Fucus veſiculoſus, pro Cineribus (Aethiope vegetabili Ric. Ruſſel) Menſe Auguſto colligendus.

SPONGIA. Vid. Regnum animale.

CANONES GENERALES.

I. CITO ſiccata ab heterogeneis admiſtis liberentur.

II. SERVENTUR loco ſicco, ne mucorem contrahant.

II. RADICES.

ACETOSAE. Syre. Sauerampfer-Wurz.

Rumicis acetoſae RADIX perennis, fibroſa, longa, ſublutea, verno tempore colligenda.

ACORI VULGARIS. Sverts-blad-Rod. Ackermanns-Wurtzel.

Iridis Pſeudacori, RADIX perennis, in locis paludoſis reperiunda, nodoſa, extus & intus rubra.

ALKANNAE RUBRAE. ANCHUSAE. BUGLOSSI. Rød Oxetunge. Rothe Ochſenzungen-Wurtz.

Anchuſae officinalis RADIX perennis, teres, oblonga, foris rubens aut nigricans. Eligantur radices parvae, fibroſae, quae colorem purpureum in tota ſubſtantia magis diffuſum habent. Majores intus albicant.

ALLII. Log. Knoblauch.

Allii ſativi RADIX bulboſa, tunicata, ſabulo ſervanda.

ALTHAEAE. BISMALVAE. Althee. Althee-Eibiſchwurtz.

Al-

Althaeae officinalis Radix perennis, alba, digitum craſſa, mucagine lenta turgida. Flor. Dan. 530.

Angelicae. Angelik. Engelrod. Quanne. Quannerod. Stoike. Stoke. Fatno. Fadne. Boſk. Fadnorvotas. Fadnoranſſe. Angelikenwurtz.

Angelicae Archangelicae Radix biennis, oblonga, ex capite craſſiore in fibras ſaepe pollicares vel tenuiores diviſa, foris ex flavo rubeſcens, intus alba, in Aepibus Norvagicis & Lapponicis ſponte; apud nos in hortis reperiunda, hyeme colligenda. Sit tenax, abunde fragrans, transverſim ſecta puncta flava ubertim exhibens. Flor. Dan. 206.

Apii Sativi. Seleri. Garteneppich. Seleri.

Apii graveolentis Radix biennis.

Ari. Dansk Ingefer. Deutſcher Ingwer. Aarons-Wurtz.

Ari maculati Radix perennis, inaequaliter globoſa aut oblonga, tuberculis hirta, recens, compacta, verno tempore, antequam floreat, collecta. In locis umbroſis habitans praeferenda illi quae in apricis ſiccis offenditur. Per hyemem & aeſtatem ſabulo tecta ſervetur & quotannis recens colligatur. Flor. Dan. 505.

Aristolochiae Fabaceae. Huulrod. Rød Haneſam. Kleine runde Hohlwurtz.

Fumariae bulboſae Radix perennis, cava, in hortis reperiunda.

Aristolochiae Verae. Lange og runde Huulurtsrod. Oſterluceywurtz.

Ariſtolochiae longae & rotundae Radix tuberoſa, ſubrotunda aut oblonga, parum fibroſa, ex Europa auſtrali allata, craſſior, ponderoſa, compacta, intus e gilvo olivaris, non farinacea, nec rugoſa.

ARMORACIAE. RAPHANI RUSTICANI. Peberrod. Meerrettig.
Cochleariae Armoraciae RADIX fuſiformis, biennis, recens ſabulo ſervanda.

ARTHANITAE. Galteknappe. Madekernerod. Saubrodt.

Cyclaminis Europaei RADIX perennis, tuberoſa, craſſa, orbiculata, foris nigricans, intus candida, in hortis & ſponte in montoſis habitans; recens, ſaporis acris, urentis.

ASARI. Haſelurtrod. Haſelwurtz.
Aſari Europaei RADIX perennis, fibroſa, recens, odore nardino, Valerianae aemulo praedita, ſub calidiore Germaniae coelo germinans.

ASPARAGI. Aſparris. Aſpargis. Spargelwurtz.
Aſparagi officinalis RADIX perennis.

BARDANAE. LAPPAE MAJORIS. Agerburre= Agerſkrepe= Storſkreppe= Tordenſkreppe=Rod. Lungegræs= Klunger= Klægg= Haarklægg= Burrer= Burre=Rod. Klettenwurtz.

Arctii Lappae RADIX perennis, ramoſa, foris nigricans, intus alba, fibroſa, ſaporis ſub dulcis, ſub auſteri, ad vias in rudetis reperiunda, Majo Menſe colligenda. Rejiciatur vetuſta lignoſa.

BISTORTAE. Slangeurtrod. Natterwurtz.
Polygoni Biſtortae in humidis ſponte creſcentis RADIX perennis, intorta, tuberoſa, intus pallide rubella, ponderoſa, fractu difficilis. Flor. Dan. 421.

BRITANNICAE. Vandſkræppe. Grindwurtz.
Rumicis aquatici RADIX perennis, lignea, magna, obſcure ruffa, intus flava, in paludoſis germinans.

BRU-

Brusci. Rusci. Muusetornrod. Bruschwurtz. Mäusedornwurst.

Rusci Hypophylli Suffruticis Radix crassa, implexa, albicans, saporis in initio subdulcis, postea amari, Italiae & Galliae indigena.

Bryoniae. Galdebær. Hundebær. Zaunrübe. Gichtrübe.

Bryoniae albae Radix perennis, fusiformis, praegrandis, e circulis annulisque composita, in umbra juxta sepes reperiunda.

Calami Aromatici. Acori Veri Calmus. Kalmus. Kalmus.

Acori Calami Radix perennis, in paludosis & Aquis stagnantibus luxurians, longa, obliqua, crebro geniculata, digitum crassa, ex flavo ruffescens, intus alba & fungosa, saporis acris & aromatici.

Cardopatii. Carlinae. Eberrod. Eberwurtz.

Carlinae acaulis Radix perennis, palmae unius vel alterius longitudinis, crassitudinis pollicis, foris ruffa, intus albida, saporis & odoris grati, aromatici, ex Italia & montosis Germaniae locis advecta.

Caryophyllatae. Benediktrod. Nellikerod. Benedicktwurtz. Nägeleinwurtz.

Gei urbani Radix fibrosa, subruffa, odoris & saporis aromatici, caryophyllacei, coloris intus carmesini. In sylvis & umbrosis habitat.

Chelidoni Vulgaris Majoris. Store Svaleurtrod. Selidon. Groß Schellkrautwurtz.

Chelidoni majoris Radix perennis, fibrosa, miniati coloris, succo croceo intensiori turgens. Flor. Dan. 542.

Cheli-

CHELIDONII VULGARIS ſive MINORIS. Lille Svale-urtrod. Feigwarzenwurz. Scharbockskrautwurz.

Ranunculi ficariae in partis & umbroſis creſcentis RADICES perennes, fibroſae, primo vere colligendae. Flor. Dan. 499.

CHINAE. Chinarod. Chinawurz.

Smilacis Chinae RADIX nodoſa, ex Indiis advecta, ponderoſa, ſolida, firma, difficulter ſciſſilis, pallide rubens, tentata digitum, manducata linguam pinguedinis aliquo ſenſu afficiens.

CICHORES. Vægvardrod. Wegwartwurz. Hindlauffwurz.

Cichorei Intybi RADIX biennis, ramoſa, pedem longa, pollicem craſſa, obliqua & fibroſa, ſucco lacteſcente turgida, verno tempore colligenda. Lignoſa & ingrate amara rejiciatur. Sponte creſcens hortenſi præferenda.

COLCHICI AUTUMNALIS. Nøgne Jomfruer. Nøgne Horer. Zeitloſe.

Colchici autumnalis RADIX gemina, tuberoſa, carnoſa, quarum una exterior ſterilis eſt & marceſcens, altera intra priorem latens, in fibras porrigitur. In pratis humidioribus reperitur.

CONTRAYERVAE. Giftrod. Bezoarwurz. Peruvianiſche Giftwurz.

Dorſteniae Contrayervae RADIX e capitulo nodoſo fibroſa, ex Peru allata, odoris leviter aromatici, ſaporis ſub adſtringentis, non ingrati, coloris obſolete rubelli. Rejiciantur fibrae tenuiores.

COSTI DULCIS. Søde Coſtusrod. Süſſe Coſtuswurz.

Coſti Arabici RADIX perennis, ex Occidente & Oriente allata, ſolida, craſſa, oblonga, foris cinerei, intus albicantis coloris, ſaporis aromatici, odoris ad Iridem Florentinam accedentis.

CUR-

Curcumae. Gurgemeie. Curcumei.

Curcumae longae Radix Orientalis, extus lutea, intus e luteo ruffa, dura, denſa, ponderoſa, diffracta particulas reſinoſas micantes exhibens; ſaporis amaricantis, leviter aromatici.

Cynoglossi Hundstunge. Uldborre. Hundszungenwurtz.

Cynogloſſi officinalis Radix biennis, ad vias reperiunda, recta, craſſa, foris ex atro rubens, intus albida; odoris gravis, narcotici; ſaporis ſubdulcis, mucoſi.

Cyperi rotundi. Cyperrod. Trindvildgalgan. Runde Cyperwurtz.

Cyperi rotundi Radix perennis, turbinata, Olivae magnitudinis & figurae, ſcabra, ſtriata, foris ſubruffa, intus albida, ex Aegypto & Oriente advecta. Sit odorata, gravis, non carioſa.

Dictamni albi. Fraxinellae. Hviid Diptamrod. Weiſſer Diptam-Aſchwurtz.

Dictamni albi Radices oblongae, multifidae, intus lignoſae, in montoſis Galliae, Germaniae & Italiae habitantes, albicantes, ab interiore parte lignoſa liberae, non carioſae; ſaporis ſubamari, cum obſcura acredine; odoris, ſi recentes ſint, fragrantis, gravis.

Doronici. Ulveurtrod. Gemſenwurtz. Schwindelwurtz.

Doronici pardalianchis Radices tuberoſae, in montibus Helvetiae, Tiriae, Stiriae & Auſtriae germinantes, albicantes; ſaporis ſubdulcis, aromatici, acris; non carioſae.

Enulae. Helenii. Alandsrod. St. Ellensrod. Alandwurtz.

Inulae Helenii RADIX biennis, craſſa, carnoſa, multifida, foris fuſca, intus alba; ſaporis amari, aromatici; in hortis culta, & in locis humidis paludoſis reperiunda, quae efficacior.

ERYNGII. Bergmandstroe - Mandstroe - Mands-hielprod. Mannstreu - Radendiſtel - Brackendiſtelwurtz.

Eryngii campeſtris RADIX perennis, pedem longa, pollicem craſſa, mollis & tenera, cum nervo in medio, extus nigricans, intus candida; ſaporis dulcis; in Germaniae, Italiae & Hiſpaniae campis ſiccis & in Norvagia habitans. Flor. Dan. 554.

FARFARAE. TUSSILAGINIS. Heſtehov. Føllefod. Hovblad. Hovurterod. Skreppe. Leerſkreppe. Leer-fivel. Brand - Lattich - Huflattichwurtz.

Tuſſilaginis Farfarae RADICES perennes, longae, tenues, candidae, ſaporis ſubacris cum levi lentore; in agris ſubhumidis & ad foſſas reperiundae, primo vere colligendae.

FILICIS. Bregne. Hanbregne. Skiærbregne. Grofte Molfoor. Molfoorblom. Klojæſke. Bujæſke. Skorv. Hanblom. Rysteblom. Trepeek. Caſſa Gai-ſke. Farnkrautwurtz.

Polypodii Filicis maris RADIX perennis, craſſa, ramoſa, foris nigricans, intus pallida; ſaporis primum ſubdulcis, dein amariuſculi, ſubadſtringentis; autumno colligenda.

FOENICULI. Fennikelrod. Fenchelwurtz.

Anethi Foeniculi RADIX biennis, digitalis, recta, alba; ſaporis ſubdulcis, aromatici. In hortis colitur; pars corticoſa in uſum vocatur.

FRAGARIAE. Jordbærrod. Erdbeerkrautwurtz.

Fragariae veſcae RADICES perennes.

GALANGAE MINORIS. Galangerod. Galgant.

Maran-

Marantae Galangae Radix tuberoſa, nodoſa, geniculata, dura, minimum digitum craſſa. Seligantur ponderoſae, non carioſae, aroma ſpirantes, extus e ſpadiceo rubrae, intus rubellae. Ex Oriente advehuntur.

Gentianae-rubrae. Søde. Sødrod. Søtkonge. Skiærſøde. Rother Enzian.

Gentianae purpureae Radix biennis, longa, pollicem unum aut alterum craſſa, foris fuſca, intus ex flavo ruffeſcens, intenſe amara, in Norvagiae Alpibus habitans, quae luteae praeferenda. Flor. Dan. 50.

Glycyrrhizae. Liqviritiae. Lakritz. Süßholz-Liquiritienwurtz.

Glycyrrhizae glabrae Radix ramoſa, late ſerpens, perennis. Sit recens, tenax, flexilis, diſſecta laete flava, dulcis gratique ſaporis. Ex Franconia plerumque adfertur.

Graminis. Hundegræs- Kroppegræs- Knægræsrod. Taggræs- Tæggræs- Axroot- Axing- Skingræs- Quikketaa- Quikkurod. Queck-Graßwurtz.

Tritici repentis Radix perennis, repens, geniculata, e ſarmentis tetuibus conſtans. Verno & autumnali, non aeſtivo tempore colligatur.

Helleбori albi. Hviid Nyſeurtrod. Weiſſe Nieſewurtz.

Veratri albi Radix ramoſa, extrinſecus gilva, intus albeſcens, ex Germania auſtrali advecta.

Hellebori nigri. Melampodii. Sort Nyſerod. Chriſtwurtz. Schwarze Nieswurtz.

Hellebori nigri Radix fibroſa, maximam partem in Lalandia, inſula Moen, Germaniae auſtralis & Helvetiae Alpibus col-

lecta. Probae radicis caput tuberosum, nigrum, Nucem Moschatam aequat & sulcatum est. Fibrae sint extus tenues, laeves, intus albae, parum tenaces. Sapor nauseosus sit, acer & amaricans. Rejiciantur radices vetustae, fragiles, pulverulentae.

HERMODACTYLI. Hermodadeler. Hermodattelwurz. Fremde Zeitlosenwurz.

Iridis tuberosae RADICES trigonae, ex una parte compressae, ex altera tuberosae, ex Smirna, Aleppo & Syria advectae, extus albicantes, intus prorsus albae, saporis dulcescentis & acris, odoris nullius.

HIRUNDINARIAE. VINCETOXICI. Svalerod. Schwalbenwurz. Giftwurz.

Asclepiadis Vincetoxici RADIX biennis, tuberosa, fibrosa, in sabulosis & montosis reperiunda; subacris fervidique saporis, & validi, nardini, subaromatici odoris.

JALAPPAE. Jalaprod. Jalappe.

Mirabilis Jalappae RADIX, vel potius taleoli radicis, Zonulis cincti, externe ex lurido fusci, interne e fusco cinerei, ex America allati. Radix compacta sit, dura, ponderosa, igni admota inflammabilis, diffracta particulis resinosis resplendens. Admista Bryoniae segmenta colore albo, textura spongiosa, annulisque illico se produnt.

IMPERATORIAE. OSTRUTII. Mesterrod. Meisterwurz.

Imperatoriae Ostrutii RADIX biennis, oblonga, pollicem crassa, rugosa, foris fusca, intus alba; gravis, acris & valde aromatici saporis atque odoris; in montosis Helvetiae & Stiriae habitans atque in hortis culta.

IPECACOANHAE. Americansk Brekrod. Americanische Brechwurz. Ruhrwurz.

Euphor-

Euphorbiae Ipecacoanhae Radix repens, nodoſa, geniculata, Braſilienſis fuſca, aut Peruviana cinerea, quae priori praeferenda. Quae externe albicant radices, aut coloris gilvi ſunt, ſpongioſae & ſulcis haud notatae, rejiciuntur. Eligatur quae colorem exhibet ex cinereo obſolete caſtaneum, quae rugoſa eſt, annulisque & inciſuris profundis conſpicua. Cortex craſſus ſit, durus, denſus, fragilis, fractus particulis reſinoſis reſplendens; ſapor acris, amarus, parum nauſeoſus cum ſenſu mucilaginis. Rejiciantur fibrae adhaerentes cum medulla lignea alba, inſipida.

Iridis florentinae. Violrod. Violenwurtz.

Iridis Florentinae Radix tuberoſa, ſublato Cortice ex Italia advecta, ponderoſa, denſa candida, punctis e fulvo fuſcis diſtincta, Violae Martiae odorem ſpirans. Radices minores majoribus praeſtant.

Iridis nostratis. Blaa Lilie. Sværdlilie. Schwertelwurtz. Schwertlilienwurtz.

Iridis Germanicae Radix tuberoſa, articulata, ex inferiori parte fibrata, in clivoſis habitans, non confundenda cum Iridis paluſtris (*Iridis pſeudacori* Flor. Dan. 494.) Radice, in paludocis locis & lacubus creſcente. Quae Autumno eruitur recens & ſucco plena, per hyemem in ſabulo ſicco conſervari poteſt.

Levistici. Ligustici. Laserpitii. Løbſtik. Lubſtik. Liebſtöckelwurtz. Badkrautwurtz. Saukrautwurtz.

Liguſtici Leviſtici Radices perennes, grandes, toroſae, foris nigricantes, intus albae, verno tempore colligendae. In hortis coluntur.

Mechoacannae albae. Hvid Jalapperod. Weiſſer Jalapp. Weiſſe Rhabarber.

Convolvuli Mechoacannae Radix grandis, levis, externe cinerea, intus candida aut gilva, annulis interne cincta, ex America meridionali advecta; ſaporis primum farinacei, dein acris, a Bryoniae ſapore diſtinguendi, qui nauſeoſe amarus eſt.

Morsus diaboli. Succisae. Engeknop. Blaaknop. Dievelshid. Fareblade. Gronſkoll. Blaakoll. Blaahorſt. Skor. Gronblad. Teufelsabbißwurtz.

Scabioſae Succiſae Radix perennis, oblonga, craſſitiei minimi digiti, fibris longis & albis cincta; ſaporis acris, amari; in paſcuis humidiuſculis habitans. Flor. Dan. 279.

Oxylapathi. Lapathi acuti. Heſteſyre. Gründwurtz.

Rumicis acuti Radix perennis, pollicem craſſa, octo vel decem pollices longa; coloris extus obſcure rubelli, intus flaveſcentis.

Pareirae bravae. Americanſk Grunsrod. Americaniſche Grieswurtz.

Ciſſampelos Pareirae Radices, in America provenientes, extrinſecus plane nigricantes, intrinſecus ex fuſco luteae; ſaporis dulcamari; craſſiores, non carioſae.

Petasitidis. Peſtilentsrod. Peſtilentzwurtz. Schweißwurtz.

Tuſſilaginis Petaſitidis Radices perennes, fibroſae, a communi provenientes capite; odoris aromatici fragrantis; ſaporis acris, aromatici, amariuſculi; in aquoſis habitantes, vere colligendae.

Petroselini vulgaris. Perſilrod. Peterſilienwurtz.

Apii Petroſelini Radix.

Pimpinellae albae. Quæserod. Biergrod. Vild Pimpinelle. Bibenell.

Pimpi-

Pimpinellae Saxifragae Radix perennis, tenuis, fibras minores maxime ex capite craſſiore emittens; coloris extus pallide flaveſcentis, intus albicantis; in ſiccis ſabuloſis ac ſaxoſis affatim germinans. Eligatur recens, tenax, ſaporis eximie pungentis. Inertior eſt quae in pratis humidisque crecit locis. Flor. Dan. 92.

Poeoniae. Pœonienrod. Päonienwürtz. Pfingſtroſenwurtz. Gichtroſenwurtz.

Paeoniae Officinalis Radices perennes, tuberoſae; coloris extus ruffi, intus pallidioris; ſaporis ſubdulcis, ingrati; primo vere colligendae. In hortis coluntur.

Polypodii. Engelſot. Eegebregne. Mariebregne. Steenſote. Syſſelroet. Heilſota. Engelſüß.

Polypodii vulgaris Radix perennis, fibroſa, geniculata, ad radices quercuum & in rudetis locisque ſiccis germinans; extus e ſpadiceo fuſca, intus obſolete viridis, compagis tenacis; ſaporis dulcis leviter nauſeoſi.

Ptarmicae. Hviid Regnfan. Weiſſer Bertram. Weiß Reinfarn. Wieſen Dragun.

Achillaeae Ptarmicae Radix perennis, lignoſa, capillata, ejusdem fere ac Radix Pyrethri virtutis.

Pyrethri. Bertramsrod. Bertramswurtz.

Anthemidos Pyrethri Radix fibroſa, tenuis, qualis ex Germania & Gallia Narbonenſi adfertur. Praeſtat vero Tunetana, craſſa, tenax, extus ferruginea, intus alba; ſaporis adeo feruidi, ut linguam faucesque adurat; ex Italia advecta.

Rhabarbari. Rhabarber. Rhabarber.

Rhei palmati Radix tuberoſa; ſaporis amari, leviſſime nauſeoſi; cum duritie aliqua fragilis, levis, probe ſicca; externe dilute lutea, digitum flavedine non inficiens, interne dilute crocea

cum

cum albis & rubellis venulis, nucis moſchatae inſtar, eleganter variegata; ex India Orientali advecta.

RUBIAE TINCTORUM. Krap. Krapp. Färberröthe.

Rubiae Tinctorum RADIX perennis, recens, non nigra aut maculis interſperſa, ſed eleganter & dilute rubens, atque a parenchymate lignoſo, quantum fieri poteſt, liberata.

SALAB. SALEB. Salebrod. Salapwurtz.

Orchidis morionis RADICES perennes, figurae ovalis, ſemipellucidae, coloris ex gryſeo albi, ex Perſia advectae. Conveniunt virtute cum *Orchidis morionis* noſtratis radicibus. Flor. Dan. 253.

SAPONARIAE. Sæbeurtrod. Seifenwurtz.

Saponariae officinalis RADIX perennis, ramoſa, geniculata, repens, ad rivos, foſſas & in humidis habitans. Verno tempore collecta, ſaporis fit dulcis primum & glutinoſi, dein acris, amaricantis. Non confundatur cum Radice *Lychnidis dioicae* aut *Cucubali Behen.* Flor. Dan. 543.

SARSAE. SARSAPARILLAE. Sarſaparillrod. Saſſaparillwurtz.

Smilacis Sarſaparillae RADICES tenues, longae, ex America auſtrali advectae, parum rugoſae; ſub cortice ex rubello virideſcente materiam albam, ramentoſam, quae medullam ligneam cingit, continentes. Durae, fragiles, lignoſae, farinaceae rejiciantur.

SATYRII. Ræveneſſer. Gogøhid. Stendelwurtz. Knabenkrautwurtz.

Orchidis bifoliae RADICES perennes, bulboſae, rotundae aut palmatae, ſucculentae, albidae; ſaporis viſcoſi, ſubdulcis. In paſcuis habitant. Flor. Dan. 235.

SCOR-

SCORZONERAE. Slangemyrder. Scorzonerwurtz. Schlangenwurtz.

Scorzonerae humilis RADIX perennis, oblonga, crassitiei aut digiti aut calami scriptorii; coloris extus pallidi aut ferruginei, intus albi; in pratis reperiunda.

SCROPHULARIAE. Ormeurt. Bruunrod. Braunwurtz. Saukrautwurtz. Feigwartwurtz.

Scrophulariae nodosae RADIX perennis, repens, crassitudinis digitalis; coloris albi; saporis acris, ingrati; verno colligenda tempore. Ad vias & fossas non aquosas habitat.

SENEGAE. Senekarod. Senekawurtz.

Polygalae Virginianae RADIX, ex America septentrionali advecta, tenuis, fusiformis, vertice nodoso, crista laterali acuta; saporis primum farinacei, mox subacidi, denique acris, pungentis.

SERPENTARIAE VIRGINIANAE. Slangeurtrod. Virginische Giftwurtz.

Aristolochiae Serpentariae RADIX, e capite nodoso fibrosa, praemorsa; in Virginia & Carolina habitans; coloris extus e gilvo viridescentis, intus pallide lutei; saporis acris pungentis; odoris gravis e Valerianae Camphoraeque odore confusi.

SPICAE INDICAE. NARDI INDICI. Indisk Spikrod. Indianische Spicanardwurtz.

Laguri odorati RADICES, ex Oriente advectae, recentes, leves, coma longa praeditae; Cyperum redolentes.

SQUILLAE. Strandlogrod. Meerzwiebel.

Squillae maritimae in ora maris mediterranei sponte provenientis, RADIX bulbosa, tunicata, recens, torosa, ponderosa; intus

tus albicans; ſucco acri glutinoſo, peramaro dives; non decolor, neque attrita & defricata.

SYMPHYTI. CONSOLIDAE MAJORIS. Kulſukkerod. Gongſalverod. Schwartzwurtz. Wallwurtz.

Symphyti officinalis RADIX perennis, ramoſa, in humidis habitans.

TARAXACI. Lovetand-Præſtekrone-Munkehovedrod. Fivel. Kabbelaup. *Laxeblomſterrod. Pfaffenröhrlein-Löwenzahn-Löwenkrautwurtz.

Leontodos Taraxaci RADIX perennis, oblonga, ramoſa, minimi digiti craſſitiei; foris ſubfuſca, intus pallida; ſaporis amaricantis. Recens verno colligatur tempore.

TORMENTILLAE. Tormentill-Rodme. Mundſkaalerod. Tepperod. Blodrod. Tillerod. Tolvmandsrod. Tormentillwurtz.

Tormentillae erectae RADIX perennis, tuberoſa, pollicem craſſa; coloris extus ruffi, intus ex flavo aut fuſco rubentis; ſaporis auſteriusculi; in arenoſis luxurians.

TURBITH. Turbithrod. Turbithwurtz.

Convolvuli Turpethi RADICES, ex Inſula Ceylon & Malabaria advectae, reſinoſae, albicantes, non rugoſae, nec carioſae; ſaporis ſubacris, nauſeoſi.

VALERIANAE SYLVESTRIS. Baldrian. Dienrod. Valerian. Wild Nardus. Velandsrod. Venderod. Vendmosrod. Kleiner Baldrian.

Valerianae officinalis RADIX fibroſa, praemorſa, in ſylvis, ad ſepes & in hortis habitans. Sit tenuis, fibris piloſis hirta, tenax, e pullo obſolete vireſcens. Rejiciatur craſſior, minus piloſa, magis lignoſa, fragilis, e cinereo caſtanei coloris. Cum ſubtilis

radicis

radicis hujus virtus facile in auras avolet, a ſqualore liberata & probe ſicca, in vaſe vitreo probe clauſo arctiſſime compingenda, & loco ſicco frigidoque ſervanda eſt. Flor. Dan. 570.

URTICAE. Nelde-Nældebrænde-Nott-Brændehæt-terod. Neſſelwurtz. Brenneſſelwurtz.

Urticae dioicae RADIX perennis, lignoſa, nodoſa, geniculata, fibroſa, digitum craſſa; coloris pallide flaveſcentis; ſaporis leviter amaricantis.

ZEDOARIAE. Zitverrod. Zitwer.

Kaempferiae rotundae RADIX nodoſa, brevis, quodammodo compreſſa, paucis fibris intertexta, digitum craſſa, ex Indiis allata. Eligatur ponderoſa, dura, tenax, probe ſicca, tota cinerea, egregie fragrans & camphorati quid ſpirans.

ZINGIBERIS. Ingever. Ingfer.

Amomi Zingiberis RADIX ex Indiis advecta, brevis, tuberoſa, nodoſa, ramoſa, paululum compreſſa; coloris extus albidi, ſublutei, aut ex fuſco rubelli, intus albicantis; ſaporis valde acris, aromatici. Sit ponderoſa, minus fibroſa, non carioſa.

CANONES GENERALES.

I. ANNUAE Radices, quarum parciſſima tamen in noſtris Pharmacopoliis copia eſt, evellantur antequam caules floresque protrudant. Biennes altero, ex quo ſata ſunt ſemina, vere eruantur. Si vero inopia urget, autumno ejusdem anni, quo ſata ſunt, poſtquam folia caulesque emarcuere, colligi poſſunt. Perennes perinde eſt, vere an autumno effodiantur. Autumno tamen pleraeque ſunt, ſi non efficaciores, certe aquoſo ſucco non adeo turgidae.

II. In delectu Radicum ſpongioſae farinaceae, carioſae, inprimis] vero exſucco Cortice tectae, rejiciantur. Bonitatem enim Radicum determinat perfectus toroſusque corticis habitus.

III. Quae principiis aromaticis & reſinoſis praeditae ſunt Radices, lotione non purgentur. Sufficit, ſi de modice ſiccatis pulveres ſordesque excutiantur.

IV. Praegrandes & ſucculentae Radices in taleolos diſſectæ ſerventur.

V. Siccentur cito Radices, aut loco calido ventis perflato, aut fornacis leni cautoque calore.

VI. Siccatae frigido ſiccoque ſerventur loco, ne ſitum mucoremque contrahant, aut uredine atque carie exedantur. Fragrantes vitreis coerceantur vaſis.

VII. Patriae noſtrae inquilinae, tum ſucculentae, multum gummoſae, tum etiam ſubtilibus & facile avolantibus viribus praeditae, quotannis recentes legantur aut arceſſantur.

VIII. Quibus ſiccatis exigua, recentibus vero multa virtus eſt, ut *Armoraciae*, *Iridis*, *Ari*, *Scillae*, *Bryoniae*, illae opportuna tempeſtate collectae, ſabulo ſicco reconditae, ſerventur.

III. LIGNA. CORTICES. STIPITES.

Aloes. Agallochum. Paradistra. Paradisholtz.

Agallochi Lignum, in Siamenſi, Cambodiae & Sinenſi regnis reperiundum. Seligantur fruſta ſolida, denſa, reſinoſa, nigro - purpurea, ponderoſa, amara; odoris, dum accenduntur aut durius perfricantur, fragrantis. Raro genuinum adfertur.

Aspa-

Aspalathum officinale. Rhodiſerträ. Rhodiſer-dornholtz.

Aſpalathi Linn. Mat. med. 524. Ligni fragmenta reſinoſa, Ligno Aloes leviora, laxiora & pallidiora, ex India orientali advecta.

Aurantiorum cortex. Vid. Fructus.

Buxi. Buxbomträ. Buxbaumholtz.
Buxi Lignum.

Campescanum. Campeſketrä. Campeſchenholtz.
Haematoxyli Campeſcani Lignum durum admodum & compactum; coloris rubri; ſaporis dulcis, adſtringentis.

Cascarillae. Eleutherii. Kaſkarille. Schaccarille.
Croton Caſcarillae? Cortex ex America allatus, coloris extus cinerei, intus e ferrugineo fuſci, quem etiam comminutus ſeruat; ſaporis amari, multum aromatici; odoris, inprimis cum incenditur, gratiſſime fragrantis. Praeſtat ponderoſus, diffractus particulis reſinoſis ſplendens.

Cassiae caryophyllatae. Nellikebark. Nelken-rinden. Nelkenzimmt.
Myrthi caryophyllatae in India occidentali provenientis, Cortex tenuis, ex ruffo ferrugineus, in modum tubuli convolutus, ſaporis & odoris caryophyllacei.

Cassiae ligneae. Moderkaneelbark. Mutterzimmt.
Lauri Caſſiae Cortex, Cinnamomi ſimilis, ſed odore, ſapore, virtute debilior, ex Malabaria allatus.

Cinnamomi. Kaneel. Zimmt. Canel.
Lauri Cinnamomi Cortex interior. Laudantur cortices tenelli, tenues, longe cannulati, coloris e croceo laete fulvi, fragran-

fragrantes; ſaporis acris aromatici, cum multa dulcedine & parco adſtrictionis ſenſu.

Citri cortex. Vid. Fructus.

Culilavan. Bedſke Kaneelbark. Bittere Zimmetrinde.
Arboris amboinenſis Cortex, pennae anſerinae craſſitiem vix aequans; odoris fortiter caryophyllacei; ſaporis admodum aromatici, mucilaginoſi, ſubadſtringentis; coloris extus dilute gryſei, intus pallide rubri, lateritii.

Dulcamarae. Bitterſode. Hundebær. Troldbær. Knipplyng. Bitterſüß. Alfranken.
Solani Dulcamarae, ad foſſas, & in locis paludoſis habitantis, Stipites, vel potius Cortex radicis & ligni.

Frangulae. Torſtetræ. Brakald. Olſuckhæg. Troldæg. Hundehæg. Troldkierringhæg. Hundveed. Faulbaum. Hundsbaum. Zapfenholtz.
Rhamni Frangulae Cortex medius. Praeſtat radicum Cortex flaveſcens, amaricans. Fl. Dan. 278.

Fraxini. Aſk. Eſchenbaum.
Fraxini excelſioris Cortex ex cinereo palleſcens, ad viriditatem inclinans; ſaporis acris, amari, adſtringentis.

Granatorum cortex. Vid. Fructus.

Guajaci. Pokkentræ. Guajac. Franzoſenholtz.
Guajaci officinalis Lignum & Cortex; illud extus fulvum, intus obſolete viride; hic e cinereo fuſcus & e viridi variegatus, minus ligno efficax. Utrumque quo magis eſt ponderoſum & reſinoſum, eo eſt melius. Sapor ſit amarus, ſubacer, parum aromaticus. Carbonibus injectum non ingratum ſpargat & aromaticum odorem. Subſidat in aqua. Quod coloris dilutio-

ris

ris eſt, exoletum & vetuſtum habeatur. Adfertur ę nova Hiſpania & Inſulis Americae.

JUNIPERI. Enebærtræ. Jenbærtræ. Ene. Ener. Eine. Briſk. Bruſe. Rædka. Goſkas. Wacholderholtz.

Juniperi communis LIGNUM album, ſolidum, fragrans, aut trunci aut radicis. Lignum radicis, quippe odoratum magis & efficax, priori praeferendum eſt.

PERUVIANUS. CHINACHINAE. Kina. Chinarinde. Fieberrinde.

Cinchonae officinalis CORTEX, ex America auſtrali advectus. Variae dantur ſpecies: e rubro ferruginea (Caſcarilla colorada); e Cinnamomeo ruffa (Caſcarilla amarylla); alba, craſſa, fungoſa (Caſcarilla blanca); externe denique alba, intus cinnamomea, quae viliſſimi ſpecies frigidiori ſub cœlo germinat (Caſcarilla creſpilla). Utraeque priores adhibeantur, rejiciantur vero duae poſteriores. In ſelectu autem cautiſſime verſandum eſt. Sapor ſit amarus cum adſtrictione aliqua, diu linguae inhærente, inprimis vero ſapore ſuo ſpecifico *mucido* ſe diſtinguat. Non ſit parum ſapidus, neque ſaporis viſcidi, neque impenſe ſtypticus & nauſeoſe amarus, uti occurrit in ſpecie viliori, aliarum arborum corticibus remixta, & ſubinde Aloes ſolutione imbuta. Odor ſit paulum aromaticus, ſpecifice mucidus, quem notabilem exhibet affuſa pulveri aqua bulliens. Non vero nullus ſit, neque putridus, nauſeoſus odor, quem ſpargit haud rite ſiccatus, aut in navi madefactus & corruptus Cortex. Tenuis ſit, certe craſſitudinis mediae; gravis tamen pro voluminis ratione. Neque laevis ſit facies externa & quaſi polita: ſed ſcabra, ſubfuſca, & Lichene albo cinereo hinc inde obducta; non nigra, qui corrupti Corticis color; neque pallide flava, qui Blancae & Creſpillae eſſe ſuevit; neque laete rutilans, cujusmodi de aliis arboribus deglubitur.

bitur. Internus color ſit pauxillum Cinnamomo obſcurior, magisque obſoletus aut ferrugineus. Digito tentatus non tenax ſit aut fungoſus, neque in fibras lignoſas decerpatur, aut in farinam carioſam dehiſcat; ſed compactus ſit, aequaliter fragilis, & ad ſolem moleculis micantibus reſplendeat. Decoctum Corticis aquoſum, adhuc calidum vitro inditum ruffeſcat, frigefactum vero palleſcat. Lignum Cortici forte adhaerens, ſtudioſe ſeparandum eſt. Qui in pulvere aliunde advehitur, propter admiſtas particulas lignoſas, fibroſas, pilorum inſtar ſuſpectus, rejiciatur.

QUASSIAE. Quaſſebark. Surinamiſches Bitterholtz.

Quaſſiae amarae LIGNUM ſubalbidum, compactum & valde amarum.

RHAMNI CATHARTICI. CERVISPINAE. Korsbærtorn. Brietorn. Vigretorn. Viebærtorn. Hiortetorn. Jyttelbærtorn. Træet hvorved Fanden flaaede Gieten. Creutzbeer = Weichdorn.

Rhamni cathartici CORTEX.

RHODIUM. Roſentræ. Roſenholtz.

Geniſtae canarienſis LIGNUM radicis durum, reſinoſum; ſaporis ſubamari. Eligatur ponderoſum, odoris fragrantis, roſei.

SALICIS ALBAE. Hviid Piil. Weiſſe Weiden.

Salicis albae CORTEX.

SAMBUCI MEDIUS. Hyld. Hollunder = Rinde.

Sambuci nigrae CORTEX verno tempore detrahendus medius, qui externum cineritii coloris ſequitur, viridis.

SANTALI FLAVI. Guul Sandel. Gelber Sandel.

Santali albi LIGNUM ex Indiis advectum, coloris eleganter citrini, denſum, ponderoſum, reſinoſum; odoris grati, ex Moſcho & Ambra confuſi; ſaporis amari, aromatici.

SAN-

SANTALI RUBRI. Rod Sandel. Rothes Sandelholtz.

Caeſalpiniae ſpeciei LIGNUM ex America allatum, pro tingendo inſerviens. Sit ſaporis acerbi, adſtringentis; coloris ſanguinei.

SASSAFRAS. Saſſafras. Fenchelholtz.

Lauri ſaſſafras LIGNUM cum Cortice. Lignum ſit obſolete rubrum, leve, ſpongioſum; odoris Foeniculi, tectum cortice ferrugineo aſpero; ſaporis Foeniculi, ſed validioris. Prunis injectum crepitet inſtar Salis communis. Vis major ineſt fruſtis ramuſculorum inprimis radicis parvis, dilutioris coloris, quam trunci majoribus. Advehitur ex America.

SIMARUBAE. Simarube. Simarube. Ruhrrinde.

Arboris Piſtaciae ſimilis CORTEX ex Gujana advectus, tum trunco, tum radici detractus. Qui a radice deglubitur, praeſtantior eſt, & fibris ſuccifis diſtinguitur. Eſt coloris dilute gilvi, tenax & flexilis fere ac ſequax; ſaporis amaricantis & leniter adſtringentis. Pars lignoſa adhaerens, ut iners, abjiciatur; neque vetuſtior, lignoſus & obſcuri coloris Cortex ſervandus eſt.

TAMARISCI RADICIS. Klaadeed. Tamariſken Rinde.

Tamaricis Gallicae radicis CORTEX tenuis; coloris obſcure fuſci, intus ferruginei; ſaporis auſteri, amari, adſtringentis.

THURIS. THYMIAMATIS. Sort Virakbark. Weyhrauch = Rinde. Juden = Weyhrauch.

Styracis Thymiamae CORTICES coloris ferruginei; ſaporis acris, aromatici & amari; odoris ſuavis, ad Styracis & Balſami Peruviani accedentis. Praeferuntur Cortices pingues, odorati, craſſiores. Ex India orientali advehuntur.

VISCUS QUERNUS. Fugleliim. Meſtertiene. Vintergront med ſmale Blade. Eichenmiſtel.

Viſci albi paraſiti quercuum aliarumque arborum LIGNUM cum CORTICE, FOLIIS & BACCIS. Vetuſtius Viſcum, utpote adſtringens & balſamicum, juniori praeſtat.

WINTERANUS. Hvid Cancel. Winterxrinde.

Winteranae Canellae CORTEX externe cinereus, interne coloris Cinnamomeo parumper obſcurioris, compactus; ſaporis peracris aromatici; odoris non ingrate aromatici. E Terra Magellanica adfertur.

CANONES GENERALES.

I. STIPITES verſus Autumnum, quo tempore ſucco efficaci, probe cocto ſcatent, reſecentur.

II. CORTICES e fruticibus Autumno; ex arboribus adulta hyeme, accedente vere, deglubantur.

III. LIGNA hiberno ſuccidantur tempore.

IV. HERBAE. FOLIA. GEMMAE.

ABROTANI. Abrod. Eberraute. Stabwurzkraut.
Artemiſiae Abrotani HERBA in hortis culta.

ABSYNTHII. Malurt. Wermuth.
Artemiſiae Abſynthii HERBA, in ruderatis, aridis proveniens, Auguſto colligenda.

ABSYNTHII ROMANI. Romersk Malurt. Römiſcher Wermuth.
Artemiſiae Ponticae HERBA, gratior vulgari, in hortis culta, in Hungaria & Pannonia habitans.

ACE-

ACETOSAE. Syre. Sauerampf.

Rumicis Acetoſae FOLIA recentia, primo vere colligenda.

ACETOSELLAE. Suurklever. Giøgemad. Giøgeurt. Sauerklee.

Oxalidis Acetoſellae HERBA recens.

ACONITI. Stormhat. Blaamunke. Munkehætte. Narrenkappen. Münchskappen. Eiſenhütlein. Blauer Sturmhut.

Aconiti Napelli HERBA recens, plerumque in hortis culta, ſed in Seelandia & Lalandia etiam ſponte creſcens, Julio colligenda.

AGERATI. EUPATORII. Leverbalſamurt. Lebensbalſamkraut.

Achilleae Agerati HERBA, Galliae Narbonenſis & Hetruriae indigena, in hortis culta.

AGRIMONIAE. Agermaane. Katteſtiert. Svinerumpe. Aakermenni. Odermennig.

Agrimoniae Eupatoriae HERBA, in pratis apricis argillaceis creſcens, Junio colligenda.

ALCHIMILLAE. Synav. Løvefod. Vor Frue Kaabe. Kaapegræs. Marikaabe. Maristak. Sinnau. Löwenfuß. Frauenmantel. Groſſe Sanicul.

Alchemillae vulgaris FOLIA, in paſcuis & pratis humidis creſcentia, Majo colligenda.

ALTHEAE. Althee. Eibiſchkraut. Heilkraut.

Altheae officinalis FOLIA, in hortis culta & ſponte hinc inde provenientia, Julio colligenda. Flor. Dan. 530.

ANAGALLIDIS. Rodarve. Gaaseheel. Grine ved Dag. Grine ved Middag. Gauchheil. Vogelkraut. Hünerdarm.

Anagallidis arvensis FOLIA & flores, Julio colligenda. Flor. Dan. 88.

ANSERINAE. POTENTILLAE. Gaaseurt. Gänserich. Silberkraut.

Potentillae Anserinae HERBA, Junio mense colligenda, in pascuis & argillosis proveniens. Flor. Dan. 544.

ANTIRRHINI. Torskeflab. Hundehoved. Löwenmäulerkraut.

Antirrhini orontii HERBA, in agris & arvis crescens, Junio colligenda.

ARNICAE. DORONICI MONTANI. Volverley. Guldblomme. Hesteblomme. Gionsockblomme. Hestsoloie. Stoksvæve. Ollkonge. Fallkraut. Wulferley.

Arnicae montanae HERBA cum FLORIBUS, quae e montuosis Bohemiae & Saxoniae locis allata, propter validiorem odorem, alibi crescenti praefertur. Non confundenda est cum *Conyza media*, *Astere flore luteo* (Inula dysenterica). Arnicae folia magis sunt ovata, integra nervosaque, Plantaginis instar; Conyzae vero oblonga, subtomentosa. Flor. Dan. 63.

ASARI. Hasselurt. Haselwurtzkraut.

Asari Europaei FOLIA, in dumetis & circa radices Corylorum perpetuo virentia, in Scania crescentia, Majo & Junio colligenda.

ASPLENII. Liden Hiortetunge. Klein Hirschzungen. Miltzkraut.

Asplenii Ceterach HERBA, in Italia & Wallia proveniens.

AURAN-

AURANTIORUM. Pomerantzblade. Pomeranzenblätter.
Citri Aurantii FOLIA.

BASILICI. Basilken. Basilienkraut.
Ocymi Basilici HERBA, in hortis proveniens.

BECCABUNGAE. Lemmike. Ledmye. Beckbung. Bachbungenkraut.
Veronicae Beccabungae HERBA recens, ad rivulos habitans. Flor. Dan. 511.

BELLADONNAE. Natskade. Nachtschatten. Tollbeeren.
Atropae Belladonnae FOLIA, in hortis culta, Austriae & Angliae indigena, cum cautela seorsim siccanda, cavendo ne quid aliis herbis immisceatur. Proveniunt pariter in Falstria, & Junio colliguntur.

BETONICAE. Batonie. Batonien. Zehrkraut.
Betonicae officinalis FOLIA, Junio mense colligenda.

BONI HENRICI. Stolte Henrik. Aldgode. Guter Heinrich. Schmerbel.
Chenopodii Boni Henrici HERBA recens, in ruderatis crescens, Majo colligenda.

BORRAGINIS. Borrasurt. Borretschkraut.
Borraginis officinalis HERBA, in hortis culta.

BRANCAE URSINAE VERAE. Biørnelabbe. Biørneklov. Bärenklauen. Bärentatzenkraut.
Acanthi mollis HERBA, in pratis humidioribus proveniens, Junio colligenda.

BUGLOSSI. Oxetunge. Ochsenzungenkraut.
Anchusae officinalis FOLIA & FLORES, ad ruderata, vias, agros, Majo colligenda.

Capilli veneris. Venushaar. Frauenhaar.
Adianthi Capilli Veneris Herba, ex Italia & Gallia Narbonensi allata.

Cardui benedicti. Corbenedikt. Cardobenedikten.
Cnici Benedicti Herba, in hortis culta, colligenda quo tempore flores protrudere coepit.

Chaerefolii. Korvel. Kyrvel. Kerbel.
Scandicis Cerefolii Herba recens, in hortis omni, qua fieri poteſt tempeſtate colenda, ſicca etiam ſervanda.

Chamaedryos. Gamanderurt. Gamanderlein.
Teucrii Chamaedryos Herba, folio ovato inciſo crenulato petiolato, cujus loco non raro in officinis ſervatur *Veronica Chamaedrys*; odore Chamaedryos orbata, in pratis proveniens. Majo colligatur.

Chamaepityos. Ivae arthriticae. Slagurt. Schlagkraut. Je länger je lieber.
Teucrii Chamaepityos Herba, in hortis culta, Italiae, Galliae, Angliae, Hungariae & Helvetiae indigena; odoris balſamici terebinthinacei.

Chelidonii majoris, Svaleurt. Selidon. Groß Schellkraut. Schwalbenkraut.
Chelidonii majoris Herba, in ruderatis germinans, recens modo in uſum vocanda, cum ſiccata nullarum virium ſit. Flor. Dan. 542.

Cicutae terrestris. Skarntyde. Schierling.
Conii maculati Herba, in agris, ruderatis creſcens, menſibus Junio & Julio, antequam flores protruſit, colligenda, caule laevi, glabro, maculato, foliis obſcure viridibus, ſingularis foetoris, a reliquis Cicutae ſpeciebus diſtinguenda. Pro Emplaſtro confi-

conficiendo, praefertur merito a Linnaeo *Cicuta aquatica* Wepferi Flor. Dan. 208.

COCHLEARIAE. Skeeurt. Strandskeeurt. Skiørbugsurt. Cochlearie. Finmarkekaal. Stort Erichsgræs. Löffelkraut.

Cochleariae officinalis HERBA recens. Flor. Dan. 135.

CONSOLIDAE MAJORIS. Kulsukkeurt. Kongsalveurt. Wallwurtzkraut.

Symphyti officinalis HERBA, in locis humidis, circa fossas pratorum proveniens, Majo colligenda.

CONSOLIDAE REGALIS. CALCATRIPPAE. Ridderspore. Hanespore. Blaa Hanefod. Wilder Rittersporn.

Delphinii Consolidae HERBA, in agris proveniens, Junio colligenda.

CUSCUTAE. Stor Horsilke. Flachsseiden. Filtzkraut.

Cuscutae Europaeae HERBA, Augusto colligenda. Flor. Dan. 199.

DATURAE. STRAMONII. Galurt. Stechapfel. Tollkraut. Stachelnuß = Kraut.

Daturae Stramonii HERBA. Flor. Dan. 436.

DICTAMNI CRETICI. Diptam. Cretischer Diptam.

Origani Dictamni FOLIA ex Creta advecta, tomentosa, recentia, odorata. Pro Theriaca modo adhibentur. Recentia Folia praestans exhibent Oleum essentiale.

EQUISETI MINORIS. Studeknæ. Ræverumpe. Katzenwedel. Schaafheu. Zinnkraut.

Equiseti arvensis HERBA, in pratis & agris crescens, Junio colligenda.

ERY-

ERYSIMI. Vild Senep. Wilder Wegsenf.

Eryſimi officinalis HERBA, in ruderatis habitans, Majo colligenda. Flor. Dan. 560.

EUPHRASIAE. Oientroſt. Augentroſt.

Euphraſiae officinalis HERBA, Julio colligenda.

FUMARIAE. Jordrøg. Aaker Siſſel. Erdrauch. Taubenkropf.

Fumariae officinalis PLANTA recens, in agris reperiunda, Majo colligenda.

GALLII LUTEI. Træ̈ttegræs. Klammerurt. Marie Senghalm. Guul Mour. Jomfrue Marie Sengfoor. Marie Fægre. Opſkreed Fægre. Meyerkraut. Waldſtroh. Bettſtroh.

Gallii veri HERBA, in rudetis creſcens, Junio & Julio colligenda.

GENISTAE. Gyel. Gyfvel. Ginſter. Gienſien.

Spartii ſcoparii HERBA, in arenoſis proveniens, Junio colligenda. Flor. Dan. 313.

GENTIANELLAE. Liden Enzian. Kleiner Enzian.

Gentianae Amarellae HERBA, in pratis habitans, Julio colligenda. Flor. Dan. 328.

GERANII MOSCHATI. Desmerſtorkeneb. Biſamkraut.

Geranii cicutarii HERBA, in ſterilibus proveniens, quae cum vires facile perdit, quotannis recens colligenda, menſe Majo.

GERANII ROBERTIANI. Robertsurt. Stinkende Storkeneb. Stinkende Skovflock. Stinkender Storchſchnabel.

Geranii

Geranii Robertiani HERBA, in rupibus borealibus crescens, recens quotannis Majo colligenda.

GRATIOLAE. Gudsnaadeurt. Gottesgnadenkraut.

Gratiolae officinalis HERBA, in uliginoſis humidisque creſcens, recens quotannis colligenda. Flor. Dan. 363.

HEDERAE TERRESTRIS. Jordvedbende. Gundermann. Huder.

Glechomae hederaceae HERBA, ad ſepes & aggeres ubique obvia, Aprili colligenda.

HEPATICAE NOBILIS. Adelklefver. Edel-Leverurt. Blaa Simmer. Leberkraut. Güldenklee.

Anemones hepaticae FOLIA, in ſylvis & dumetis provenientia, Aprili colligenda.

HERNIARIAE. Pisseurt. Harnkraut. Bruchkraut.

Herniariae glabrae HERBA, in apricis, glareoſis, ſiccis creſcens, Junio & Julio colligenda. Flor. Dan. 529.

HORMINI. Skarleurt. Scharlachkraut.

Salviae Hormini HERBA, in hortis culta.

HYOSCYAMI. Fandensnoſſer. Fandenspunger. Honſebane. Bulmeurt. Horſetænder. Soebonne. Bilſenkraut.

Hyoſcyami nigri HERBA, in ruderatis, pinguibus proveniens, Julio colligenda, recens, pro Emplaſtro & Extracto.

LAURI. Loorbærblade. Lorbeerblätter.

Lauri nobilis FOLIA recentia, fortiter olida, non effoeta, coloris obſolete flavi, e gilvo olivaris.

LINARIAE. Horurt. Vildhor. Torskemund. Torskeflab. Stranneblom. Dodningehoved. Leinkraut. Stallkraut.

Antirrhini Linariae FOLIA, in ruderatis provenientia, Julio colligenda.

LINI CATHARTICI. Vildhor. Purgeerliin. Purgier-Flachs. Klein Leinkraut.

Lini cathartici HERBA, in pafcuis montofis Julio & Augufto florens.

LINNEAE. Marislegræs. Narislegræs. Norislegræs. Noretlegræs.

Linneae borealis HERBA, ex Suecia & Norvagia adveniens. Flor. Dan. 3.

MAJORANAE. Meiran. Mirrian Majoran.

Origani Majoranae HERBA, in hortis culta.

MALABATHRI. FOLIA INDI. Indianiske Blade. Indianische Blätter.

Lauri Cinnamomi FOLIA, ex Malabaria advecta, oblonga, acuminata, denfa & glabra, a pediculo ad apicem tribus nervis excurrentibus; odoris grati; faporis aromatici. Pro Theriaca requiruntur.

MALVAE. Kattcoft. Käsepappeln.

Malvae rotundifoliae FOLIA, menfe Majo collecta, non multum adulta.

MARI VERI, SYRIACI. Marumverum. Amber. Mastixkraut.

Teucrii Mari FOLIA cum petiolis & ftipitibus, ex Hifpania allata. Recentia eligantur & fragrantiffima, non exoleta,

neque

neque petiolis & ftipitibus multis fcatentia. Electa in cifta plumbo munita probe obturata ferventur.

Marrubii albi. Prasii. Marrube. Weisser Andorn.
Marrubii vulgaris Herba, ad fepes & in rudetis luxurians, Augufto & Septembri colligenda.

Matricariae. Matrem. Mutterkraut.
Matricariae Parthenii Herba cum floribus, in ruderatis & cultis crefcens, Junio colligenda.

Matrisylvae. Stoomerke. Mysike. Bokar. Bukar. Myske. Waldmeister.
Afperulae odoratae Herba, in umbrofis proveniens, Majo colligenda.
Nota. Folia Matryfilvae cum Meliloti floribus mixta, gratiffimum conftituunt Errhinum.

Melissae canariensis. Canarisk Hiertensfryd. Canarische Melisse.
Dracocephali Canarienfis Herba.

Melissae citratae. Citron-Melisse. Citron-Melisse.
Meliffae officinalis Herba, junior & antequam verticillos florentes emittat colligenda. Colitur in hortis.

Melissae turcicae. Tyrkisk Melisse. Türkische Melisse.
Dracocephali Moldavicae Herba, quae pro oleo ftillatitio parando requiritur.

Menthae crispae. Krusemynte. Krausemünze.
Menthae crifpae Herba, colligenda antequam fpicam florentem protrudat. In hortis provenit.

MENTHAE PIPERITIDIS. Pebermynte. Pfeffermünze.
Menthae Piperitae HERBA, in hortis culta.

MENTHASTRI. Aakermynte. Vildmynte. Horsemynte. Agermynte. Kornmynte. Vild=Poley. Bachmünze.
Menthae arvensis FOLIA, in agris provenientia, Julio colligenda. Flor. Dan. 484.

MERCURIALIS. Hanbingel. Bingelurt. Bengelkraut. Hundskohl.
Mercurialis annuae FOLIA, in hortis & campis provenientia, Aprili colligenda. Flor. Dan. 400.

MYRRHIDIS MAJORIS. CICUTARIAE ODORATAE. Vellugtende Körvel. Wohlriechender Kerfel.
Scandicis odoratae HERBA, in hortis culta, Junio florens.

NASTURTII AQUATICI. Vandkarse. Brunnenkreß.
Sisymbrii Nasturtii aquatici HERBA recens.

NEPETAE. Katteurt. Sissenbrant. Katzenmünz.
Nepetae catariae FOLIA, in rudetis provenientia, Julio & Augusto colligenda.

OREOSELINI. SESELI. DAUCI. Vilde guule Røder. Grundheil. Bergpetersilien.
Athamantae Oreoselini HERBA, in collibus apricis germinans, Junio colligenda.

ORIGANI. Vild Meiran. Tostkonning. Rospons. Skaarekonge. Bergkonge. Bergmynte. Skovmynte. Skarmynte. Klevhumle. Vildmynte. Brauner Dosten. Winter=Majoran.
Origani vulgaris HERBA, in dumetis crescens, Julio colligenda.

PARIE-

PARIETARIAE. Dag og Nat. St. Pedersurt. Tag- und Nacht-Kraut. St. Peterskraut. Nachtkraut.

Parietariae officinalis FOLIA, in ruderatis crescentia, Julio colligenda. Flor. Dan. 521.

PERSICAE. Pferskeblade. Pfirsichblätter.

Amygdalae Persicae FOLIA tenella.

PETROSELINI. Persille. Petersilie.

Apii Petroselini HERBA recens, quamdiu obtineri poterit. Servetur pariter sicca.

PHYTOLACCAE.

Phytolaccae Americanae HERBA, in hortis culta.

PINGUICULAE. SANICULAE MONTANAE. Viibefit. Haarvært. Tættegræs. Melkekors. Butterblume. Butterkraut. Kiwittsfett.

Pinguiculae vulgaris HERBA, in uliginosis proveniens, Majo colligenda. Flor. Dan. 93.

PINI, vulgo STROBILI. TURIONES. Grankuopper. Junge Tannenknospen.

Pini Abietis tenelli e frondibus APICES, non nisi recentes mense Majo adhibendi. Flor. Dan. 193.

PLANTAGINIS MAJORIS. Veibred. Faaretunge. Groeblad. Groeblokke. Wegerich. Fünfaderblatt.

Plantaginis latifoliae FOLIA, mense Majo colligenda. Flor. Dan. 461.

POLII CRETICI. Kretisk Poley. Cretischer Berg-Poley.

Teucrii Cretici HERBA cum floribus, in Creta insula proveniens. Eligenda recens odorata.

POLYGALAE. Kaarsblomster. Creutzblumen.

Polygalae vulgaris Herba vel planta tota, in pratis & pafcuis ficcis proveniens, Majo & Junio colligenda. Flor. Dan. 516.

Polygoni. Veigræs. Hundrede Knuder. Honfegræs. Wegtritt. Wegegraß. Blattkraut. Saukraut.

Polygoni avicularis Herba, in cultis ruderatis habitans, Julio colligenda.

Populi oculi. Pappelpiil. Pappelknofpen.

Populi nigrae Gemmae nondum evolutae, fucco flavefcente balfamico turgidae, Aprili menfe decerptae. Praeftant recentes.

Prunellae. Brunell. Kierringrock. Blaakolle. Ølkale. Gottheyl. St. Antonikraut.

Prunellae vulgaris Folia, in pafcuis provenientia, Junio colligenda.

Pulegii. Poley. Poley.

Menthae Pulegii Herba, Junio & Julio colligenda. In hortis colitur.

Pulmonariae maculosae. Lungurt. Flecken-Lungenkraut.

Pulmonariae officinalis Folia, in nemoribus crefcentia, Aprili & Majo colligenda. Flor. Dan. 482.

Pyrolae. Vinterlilie. Bundlilie. Wintergrün. Holtz- oder Wald-Mangold.

Pyrolae rotundifoliae Herba, Junio & Julio colligenda. Flor. Dan. 110.

Quercus. Egeblade. Eichenlaub.

Quercus roboris Folia tenella.

Ranun-

Ranunculi vesicatorii. Froernes Peber. Vandpeber. Brennender Hahnenfuß.

Ranunculi flammulae Herba, in paludosis germinans; recens in usum vocanda.

Ribis nigrae. Soelbærblade. Schwarß Johannsbeerenblätter.

Ribis nigrae Gemmae, cum nidore graveolentes, quae praecisis stipitibus vel ramusculis, integrae siccentur. Flor. Dan. 556.

Roris solis. Soeldug. Himmeldug. Vortegræs. Diengræs. Ringormgræs. Luusegræs. Duggræs. Tættegræs. Sonnenthau.

Droserae rotundifoliae Herba, in humidis & palustribus inter muscos proveniens, Junio mense colligenda.

Rosmarini. Rosmarin. Rosmarin.

Rosmarini officinalis Folia, in hortis culta.

Rosmarini sylvestris. Vild Rosmarin. Wilder Rosmarin. Heidebienen-Kraut. Post.

Ledi palustris Folia, in paludibus uliginosis provenientia, Junio colligenda; non confundenda cum foliis *Myricae Gale.*

Rutae. Rude. Raute. Wein-Raute.

Rutae graveolentis Herba, recens inprimis adhibenda. In hortis colitur.

Sabinae. Sevenbom. Sadenbaum. Sevenbaum.

Juniperi Sabinae Folia, vel potius frondium apices, verno inprimis tempore collecti, siccati. In hortis coluntur.

Sali-

SALICARIAE. Katteurt. Bokkeblade. Brauner Weiderich. Blauer Fuchsschwanz.

Lythri Salicariae HERBA, ad ripas proveniens, Julio & Augusto colligenda.

SALVIAE. Salvie. Salvey.

Salviae officinalis FOLIA adultiora, quae efficaciora.

SAMBUCI TURIONES. Hyldknopper. Fliederknospen. Holunderknospen.

Sambuci nigrae GEMMAE.

SANICULAE. Sanikel. Sanikel. Bruchkraut.

Saniculae Europaeae FOLIA, in sylvis & montosis provenientia, Majo colligenda. Flor. Dan. 283.

SAPONARIAE. Flesknurt. Sæbeurt. Seiffenkraut.

Saponariae officinalis HERBA, in arenosis juxta rivulos & torrentes nascens, Junio, dum floret, colligenda. Flor. Dan. 543.

SATUREJAE. Sar. Saturey. Garten-Isop. Bohnenkraut.

Saturejae hortensis HERBA, Augusto mense colligenda.

SCABIOSAE. Skabios. Skaburt. Blaahat. Skotten. Rodknap. Scabiosen. Apostemkraut.

Scabiosae arvensis FOLIA, in pascuis & ad margines agrorum provenientia, Junio & Julio colligenda. Flor. Dan. 447.

SCHOENANTHI. Kameelstraa. Cameelheu. Cameelstroh.

Andropogonis Schoenanthi HERBA ex Arabia allata. Eligatur spicis instructa, saporis acris, amaricantis, suavis; odoris fragrantis. Pro Theriaca modo inservit.

SCLA-

SCLAREAE. Graakuſe. Scharlachkraut.

Salviae Sclareae HERBA, in hortis culta.

SCOLOPENDRII. LINGUAE CERVINAE. Hiortetunge. Hirſchzungen.

Aſplenii Scolopendrii FOLIA, in hortis & hinc inde ſponte provenientia.

SCORDII. Skordium. Løgsurt. Lachenknoblauch.

Teucrii Scordii HERBA, in paludoſis germinans, Junio colligenda.

SEMPERVIVI. SEDI MAJORIS. Huusløg. Huuslok. Hauslauch.

Sempervivi Tectorum FOLIA recentia, pro ſucco exprimendo Julio menſe colligenda.

SENECIONIS. Kaarsurt. Svineblom. Kong Henrik. Meſter Henrik. Flinken Henrik. Creutzwurtzkraut. Grindwurtzkraut. Goldkraut.

Senecionis vulgaris HERBA, in cultis, ruderatis, ſucculentis germinans, Aprili colligenda. Flor. Dan. 513.

SENNAE. Semsblade. Senne. Semsblätter.

Caſſiae Sennae FOLIA, ex Arabia, aut Alexandria advecta. Sint e luteo ſubviridia, parva, ſubovata, in apice multum acuminata, molliuſcula tactu, non ingrate olentia; ſaporis ſubacris, amari, aliquantum nauſeoſi. Impura, maculata, prorſusque flava rejiciantur. Virtute ad Sennam Alexandrinam accedit, ſed nullo modo aequat, *Senna Tripolitana*, cujus folia elegantius ſunt viridia, non adeo acuminata & digito tentanti ſubhirſuta videntur. Deterioris adhuc

G notae

notae eſt *Senna Itala*, cujus folia latiora, obtuſiora, laetius virentia, ſaporis ſubdulcis ſunt & glutinoſi.

SERPILLI. Vild Thymian. Vor Frue Sengehalm. Quendel. Marien Bettſtroh.

Thymi Serpilli HERBA florens, Junio & Julio colligenda. In apricis & aridis habitat.

SOLANI. Svineurt. Sovbær. Nachtſchatten. Saukraut.

Solani nigri FOLIA recentia, inter Braſſicam provenientia, Junio colligenda. Flor. Dan. 460.

SPIGELIAE. Americanſk Ormeurt. Americaniſches Wurmkraut.

Spigeliae anthelmiae PLANTA tota, e Jamaica & inſulis Gallicis in America, Domingo & Martinica, ut & Danica S. Crucis, vel etiam e Braſilia, ubi ſponte creſcit, petenda.

TABACI. Toback. Toback.

Nicotianae Tabaci FOLIA, probe ſicca, flava, nondum contorta.

TARAXACI, DENTIS LEONIS. Lovetand. *Vid. Radix.* Pfaffenröhrchen Hundeblume.

Leontodos Taraxaci PLANTA omnis cum radice, recens in uſum vocanda.

TERTIANARIAE. Feberurt. Liden Fredlos. Blaa Stierneurt. Fieberkraut.

Scutellariae galericulatae HERBA, in humidis proveniens, Junio & Julio colligenda.

THLASPI ARVENSIS. Pengeurt. Pengegræs. Pfenningkraut. Klaffer.

Thlaſpi

Thlaſpi arvenſis HERBA, in agris proveniens, Majo colligenda.

THYMI VULGARIS. Thymian. Thymian.
Thymi hortenſis HERBA.

TRIFOLII FIBRINI. Bukkeblade. Beſke Klever. Gedekløv. Bitterklee. Dreyblatt.

Menyanthis trifoliatae FOLIOLA tenera, adhuc convoluta, ſucco lacteſcente ſaponaceo turgida, menſibus Majo & Aprili in pratis colligenda. Flor. Dan. 541.

TUSSILAGINIS. Heſtehov. *Vid. Radix.* Huflattich.
Tuſſilaginis Farfarae, in humidis provenientis FOLIA, non adeo adulta, Majo menſe colligenda.

VERBENAE. Jernurt. Hofveurt. Eiſenkraut. Taubenkraut.

Verbenae officinalis HERBA, juxta ſepes & muros creſcens, Junio & Julio colligenda.

VERONICAE. Veronica. Ærenpriis. Barsleik. Flesmegræs. Norſk Thee. Ehrenpreis.

Veronicae officinalis HERBA, in arboretis & dumetis, ſiccoque in ſolo germinans, ſtrigoſo tomentoſa; his notis ab aliis Veronicae ſpeciebus diſtinguenda, Junio & Julio colligenda. Flor. Dan. 248.

VIRGAE AUREAE. CONSOLIDAE SARACENICAE. Gyldenvundurt. Ædelvundurt. Guldriis. Gyldenriis. Sougræs. Akeloje. Heidniſch Wundkraut.

Solidaginis virgae aureae HERBA, in paſcuis ſiccis proveniens, cum Coma florente Auguſto menſe colligenda.

URTICAE MINORIS. Nelde. Brende. Nott. Bren-dehætte. Brennesseln. Heiter-Nesseln.

Urticae urentis HERBA Junio colligenda.

UVAE URSI. Meelbær. Meelbarrus. Miolbær. Miolnebær. Sandbeere.

Arbuti Uvae Ursi FOLIA oblongo-ovata, ad basin angustissima, subtus venis obscurioribus praedita; his notis distinguenda a *Vaccinio Vitis Idaea*, de qua vid. *Fructus*. Flor. Dan. 33.

VULVARIAE. Stæggan. Wuhlkraut. Buhlkraut.

Chenopodii Vulvariae HERBA, in cultis oleraceis habitans.

CANONES GENERALES.

I. TURIONES Gemmaeque primo vere, quo tempore turgidulae sunt & ante explicationem foliorum decerpantur.

II. HERBAE colligantur adultae cum foliis rite expansis, antequam flores sese explicuerint. Quae semper virent, qvovis tempore colligere licet, vernum tamen praestat.

III. FOLIA colligenda sunt tempestate sicca, non diu post ortum solis, simulac rorem, quo nocte canescunt plantae, Solis radii dissipaverint. Decerpantur vero postquam defloruit & antequam maturuit planta.

IV. HERBAE indigenae quotannis recentes comparari debent. Effoetae superstites pro Sale Alcali Herbarum parando adhiberi possunt.

V. Ex-

V. Exsiccatio Herbarum citiſſime fiat, aut calido, umbroſo & ab aere perflato loco, aut lento cautoque fornacis calore.

V. FLORES ET COMAE FLORIDAE.

Acaciae nostratis. Slaatornblomster. Kreigebærblomster. Schleeblüthe.

Pruni ſpinoſae Flores, Aprili menſe colligendi.

Anthos. Rosmarinblomster. Rosmarinblüthe.

Roſmarini officinalis Flores, vel potius Coma florens.

Arnicae. Volverley. *Vid. Herba.* Wolferley.

Arnicae montanae Flores papposi. Flor. Dan. 63.

Artemisiae. Bynke. Graabynke. Graabonne. Buggræs. Bue. Buegræs. Graabue. Beyfuß.

Artemiſiae vulgaris Coma florens, in cultis & ad ſepes habitans, Julio colligenda.

Balaustiorum. Granatblomster. Granatblüthe.

Punicae Granati Flos e roſeo ſpadiceus, in Europa auſtrali & Africae ora collectus. Affertur calice obſcure viridi cinctus. Eligantur Flores magni, obſcure rubri, haud multis calycibus & ungulis remixti.

Bellidis minoris. Gaaseurt. Tusindbyd. Tusindfryd. Faa til Liss. Put i Bug. Maaslieben. Gänseblümlein. Tausendschön.

Bellidis perennis Flores, Aprili colligendi. Flor. Dan. 503.

CALENDULAE. Ringblom. Soelsik. Ringelblumen.

Calendulae officinalis FLORES, in arvis crescentes.

CARDAMINES. Engekarse. Vildkarse. Gogeblomster. Gauchblume. Wiesenkresse.

Cardamines pratensis FLORES, Majo in pascuis colligendi.

CARTHAMI TINCTORII. Vild Safran. Wilder Safran.

Carthami tinctorii FLORES, in hortis culti.

CARYOPHYLLI AROMATICI. Nelliker. Würtz-Nägelein.

Caryophylli aromatici Amboina crescentis FLORUM CALYCES, cum flore nondum expanso. Eligantur egregie fusci, grandes, ponderosi, e quibus ungue pressis Olei quid exsudat.

CENTAURII MINORIS. Tusindgylden. Agerum. Tausendgylden.

Gentianae Centaurii minoris COMA florens, in apricis, praesertim maritimis proveniens, Julio & Augusto colligenda.

CHAMOMILLAE ROMANAE. Romerske Cameelblomster. Römische Camillen.

Anthemidos nobilis FLOS, sive simplex sit, sive plenus, in hortis proveniens.

CHAMOMILLAE VULGARIS. Cameelblomster. Cammeelblom. Barbroegræs. Munkekrone. Camillen.

Matricariae Chamomillae FLORES, in agris cultis crescentes, Julio colligendi, qui a *Cotulae fœtidae* floribus dignoscantur tum odore, tum paleis setaceis in Cotulae receptaculo reperiundis.

CHEIRI. Guule Filitter. Gelbe Veilchen.

Cheiranthi Cheiri FLORES, in hortis crescentes.

COTU-

COTULAE FOETIDAE. Hundeurt. Gaaſeurt. Gaaſedild. Baldersbraa. Bakerblom. Hunds-Cameelblomſt. Siurguld. Gaaſeguld. Gaaſedill. Krötentill. Hundsdill. Hunds-Camillen.

Anthemidos Cotulae FLORES, in ruderatis creſcentes, Julio colligendi.

CROCI. Safran. Safran.

Croci ſativi PISTILLORUM STIGMATA. Proſtat *Crocus Anglicus*, in maſſas orbiculares preſſione coactus, itemque Hiſpanicus. Plerumque vero Gallicus e provincia *Gaſtinois*, aut Auſtriacus ad nos pervenit. Sit coloris Aurantii, recens, neque marcidus tactu, neque humidus; ſed tenax, mollis, pinguis, digitum tamen oleo non inquinans, ſequax, ejusdem intus ac foris coloris; ſaporis amariuſculi; odoris gravis, circum quaque ſe diffundentis; inſignis ratione voluminis levitatis. Adulteratur, inprimis Gallicus, flore Carthami tinctorii, qui colore dilutius luteo facile dignoſcitur. Qui mucidi odoris eſt, rejiciatur.

CYANI COERULEI. Kornblomſter. Kornblumen.

Centaureae Cyani FLORES.

EUPATORII CANNABINI. Flocks. Kunigundsurt. Hiortekiever. Kunigundenkraut.

Eupatorii Cannabini COMA florens, ad aquas creſcens, Julio colligenda.

FARFARAE. Heſtehov. *Vid. Herba.* Huflattig.

Tuſſilaginis Farfarae FLORES, in argilloſis, ſubtus humidis, provenientes, Majo colligendi.

GENI-

GENISTAE. Gyel. Gyfvel. Ginster.

Spartii ſcoparii FLORES, in arenoſis auſtralibus provenientes, Julio colligendi. Flor. Dan. 313.

HYPERICI. Piricon. Hypericon. Jordhumle. Blodblomſter. St. Hansurt. Mandeblod. Apotheker Pericom. Johanniskraut.

Hyperici perforati COMA florida, in pratis proveniens, antequam flos ſeſe explicuerit, Junio & Julio decerpenda. Quod ejus loco non raro ſubſtituitur Hypericum quadrangulum, caule quadrato herbaceo foliisque non pertuſis dignoſcitur.

HYSSOPI. Iſop. Iſop. Iſpen.

Hyſſopi officinalis COMA florida. Colitur in hortis.

LAMII ALBI. Dod Nelde. Dov Nelde. Blinde Nelde. Acker-Neſſel. Taube-Neſſel. Bienenfang.

Lamii albi FLORES, in cultis creſcentes, Julio colligendi.

LAVENDULAE. Lavendel. Lavendel.

Lavendulae Spicae tum latifoliae, tum anguſtifoliae SPICA. Hujus, utpote gratioris, ſiccandus flos eſt; illius pro oleo inſervit.

LILIORUM ALBORUM. Hvide Lilier. Weiſſe Lilien.

Liliorum alborum PETALA, pro oleo parando. In hortis coluntur.

LILIORUM CONVALLIUM. Maymaanedsblomſter. Lille Conval. Ryſeblad. Mayenblümchen. Lilien Convallien.

Convallariae majalis COROLLA.

LUPU-

LUPULI. Humle. Hopfen.
Humuli Lupuli COMAE, Augusto colligendae.

MALVAE ARBOREAE. Katost. Kattestoel. Stockrosen. Pappelrosen.
Alceae roseae FLORES e violaceo pulli, sub autumni initium colligendi.

MELILOTI. Amur. Steenklever. Steinklee. Meliloten.
Trifolii officinalis COMA, in campestribus habitans, floribus sive albis, sive luteis, Julio colligenda.

MILLEFOLII. Rollike. Harhous. Barbrick. Jordhumle. Schaafgarbe. Rölck.
Achilleae Millefolii CORYMBUS FLORIDUS, Julio colligendus.

NAPHAE. Orangenblomster. Pomeranzblüthe.
Citri Aurantii FLOS recens.

NYMPHAEAE ALBAE. Basgaas. Aakande. Kieringskrut. Wasserlilien. Seerosen.
Nymphaeae albae FLORES, in aquis dulcibus crescentes, Julio colligendi.

ORIGANI. Vild Meyran. *Vid. Herba.* Brauner Dosten. Winter-Majoran.

Origani vulgaris COMA florida, in rupestribus habitans, Julio colligenda, quae a plerisque legitur pro oleo stillatitio obtinendo, quod tamen majori largitur copia *Thymus vulgaris.*

PAPAVERIS ERRATICI. Kornrose. Agersilke. Rother Mohr. Klatschrose.

Papaveris rhoeados FLORES, Junio & Julio colligendi.

Paralyseos. Haneleeg. Koedrofoel. Oredrif. Koedriver. Nogleblom. Vor Frues Noglebaand. Kuesimmer. Batengen. Schlüsselblumen.

Primulae Veris Flores, in pratis reperiundi, Aprili & Majo colligendi. Flor. Dan. 434.

Persicorum. Persikeblomster. Pfersichblüthe.

Amygdali Persicae Flores recentes.

Poeoniae. Pionroser. Gichtrosen.

Paeoniae officinalis Flores, Majo menſe colligendi.

Rosarum. Roser. Rothe Rosen. Essigrosen.

Roſae centifoliae & albae petala. Colligatur flos nondum explicatus. Abjiciantur calices cum ungulis, germen ac ſtamina.

Sambuci. Hyldblomster. Fliederblumen. Holunderblumen.

Sambuci nigrae Flores. Flor. Dan. 545.

Scabiosae. Skabios. Skaburt. *Vid. Herba.* Apostemkraut. Scabiosen.

Scabioſae arvenſis Flores, in ſolo glareoſo, juxta ſegetes & in pratis creſcentes, Julio colligendi. Flor. Dan. 447.

Spicae celticae. Celtisk Nardus. Celtischer Nardus.

Valerianae celticae Flores, ſeu potius Caudices, in alpibus Helvetiae & Valeſiae provenientes. In hortis coluntur.

Stoechadis arabicae. Stochasblomster. Stöchasblumen. Welscher Lavendel.

Lavendulae Stoechadis Flores, ex Gallia & Italia advecti.

Stoe-

STOECHADIS CITRINAE. Evighedsblomster. Matten-kraut. Steinblume. Schabenkraut. Immerschön. Reinblume. Flußblumen.

Gnaphalii arenarii FLORES, Junio & Julio florentes, in hortis provenientes.

TANACETI. Reinfand. Ormekrud. Tandsue. Reufan. Ringefan. Roskonge. Roud Rollik. Reinfahren.

Tanaceti vulgaris COMA florens, in aggeribus proveniens, Julio colligenda.

TILIAE. Lindblomster. Lindenblüthe.

Tiliae Europaeae FLORES recentes. Flor. Dan. 553.

TUNICAE. Nellikerblomster. Nelkenblüthe.

Dianthi Caryophylli FLOS ſpadiceus.

VERBASCI. Kongelys. Staaderlys. Wollkraut. Königskerzen.

Verbaſci Thapſi FLORES, in glareoſis, ſterilibus creſcentes, Julio & Auguſto colligendi.

VIOLAE MARTIAE. Marts-Fioler. Blaue März-Viole.

Violae odoratae FLOS recens. Flor. Dan. 309.

ULMARIAE. Modurt. Giedeskiæg. Mollurt. Sotgræs. Mourt. Miourt. Miurt. Maggræs. Korsgræs. Kallgræs. St. Hansgræs. Geißbart.

Spiraeae Ulmariae FLORES recentes, in pratis uliginoſis, umbroſis provenientes, Julio colligendi. Flor. Dan. 547.

CANONES GENERALES.

I. Flores decerpantur nuper expanſi, certe antequam antherarum pollinem exploſerint, eo tempore ubi radii ſolis rorem diſſipaverint.

II. Coma florens colligenda dum flos explicari incipit.

III. Siccentur ut herbae, & quidem quam fieri poteſt citiſſime.

VI. SEMINA.

Abelmosch. Desmerkorn. Biſamkörner.

Hibiſci Abelmoſch Semina reniformia; odoris ex Moſcho Ambraque compoſiti, ex America auſtrali allata.

Acetosae. Syrefroe. Saur'ampfer-Saamen.

Rumicis Acetoſae in paſcuis provenientis Semen nigrum, parvum, triangulare; punicei coloris.

Agni casti. Munkepeber. Keuſchbaum-Saamen.

Viticis agni caſti Semina rotunda, pipere minora; coloris cinerei; ſaporis acris, ſubadſtringentis.

Ammeos veri. Ammyfroe. Cretiſcher Ammy-Saamen.

Siſonis Ammeos Semen ex Aegypto advectum, parvum, ſtriis longis praeditum, e ruffo ſpadiceum; ſaporis acris, amaricantis; odoris aromatici. Subſtituitur ſubinde Semen *Petroſelini*. (*Ammeos majoris*).

Amomi vulgaris. Amomfroe. Allehaande. Gemeiner Amom-Saamen.

Siſonis

Sisonis Amomi, Angliae indigeni, in hortis culti, SEMEN parvum, ſtriatum, figurae ovalis; coloris ruffi. Tinctura ſpirituoſa viridem exhibet colorem.

AMYGDALAE DULCES & AMARAE. Søde og bittre Mandler. Süſſe und bittre Mandeln.

Amygdali communis NUCLEI, ex Europa auſtrali allati. Recentes ſint, ſiccae, fragiles, toroſae; pellicula tenui, aequali, non rugoſa, e gilvo cinnamomei coloris tectae.

ANETHI. Dildfrøe. Dillſaamen.

Anethi graveolentis SEMEN recens, toroſum, tribus ſtriis notatum; coloris dilute fuſci. Herba in agris ſeritur.

ANGELICAE. Angelikfrøe. *Vid. Radix.* Angeliken-Saamen.

Angelicae Archangelicae in montoſis & hortis creſcentis SEMEN albicans, latum, compreſſum; ſaporis acris. Flor. Dan. 206.

ANISI. Anisfrøe. Anies.

Pimpinellae Aniſi SEMEN recens, oblonge rotundum, ſtriatum, toroſum; coloris viridiuſculi, graveolens. In Saxonia ſuperiori ſeritur.

ANISI STELLATI. Stiern-Anis. Stern-Anies.

Illicii aniſati (aliis *Badiani ſerae*) CAPSULAE SEMINALES in orbem digeſtae, coriaceae, e cinereo ſpadiceae, cum ſeminibus ovatis glabris. Quo majores ſunt, magisque odorae, eo ſunt meliores.

APII. Selerifrøe. Garten-Eppich. Seleri-Saamen.

Apii graveolentis in hortis culti SEMINA parva, ſtriata, Petroſelini ſeminibus minora.

Aquilegiae. Blaaklokkerfrøe. Akeleyefrøe. Ackeley-Saamen. Klockenblumen-Saamen.

Aquilegiae vulgaris, in nemoribus ſaxoſis creſcentis, Semen nigrum, parvum, ſplendens.

Bardanae. Agerburre-Frøe. *Vid. Radix.* Kletten-Saamen.

Arctii Lappae in cultis ruderatis creſcentis, Semen oblongum, fuſcum, nigris ſtriis interſtinctum; ſaporis amaricantis.

Cannabis. Hampfrøe. Hanf-Saamen.

Cannabis ſativae Semen.

Cardui benedicti. Kardebenedikt-Frøe. Cardobenedicten-Saamen.

Cnici benedicti in hortis culti, Semen oblongum, teres, ſtriatum; ſaporis amari.

Cardui mariae. Marie Tidſel-Frøe. Simpertine-Korn. Mariendiſtel-Saamen.

Cardui Mariani, Angliae & Italiae inquilini, in hortis culti, Semen oblongum, aliquantum compreſſum, fuſcum; ſaporis amaricantis.

Carthami. Vild Safran-Frøe. Wilder Safran-Saamen.

Carthami tinctorii Semina, ex Germania auſtrali advecta, alba, oblonga, angularia, dulcia.

Carvi. Kummen. Danſk Kummen. Carve. Karvi. Feld-Kümmel.

Cari Carvi Semen parvum, ſtriatum, oblongum, tenue, fuſcum, paululum incurvum. In pratis herba offenditur.

Cata-

CATAPUTIAE MAJORIS. Purgeerkorn. Purgier-Körner.

Ricini communis SEMEN, ovalis figurae quodammodo compressum, Fabae minoris magnitudinis; coloris albi & cinericii, ex nigro variegati; sub putamine tenui, nucleum condens album; saporis acris. In hortis colitur & sponte provenit in India utraque.

CICHOREI. Vægvard. Jernurt-Froe. Wegwarten-Saamen.

Cichorei Intybi, ad margines agrorum & viarum provenientis, SEMINA parva, oblonga, angularia, fusca.

CINAE. SANTONICI. ZEDOARIAE. Orm-Froe. Wurm-Saamen. Zitwer-Saamen. Seversaat.

Artemisiae Santonicae vel *Judaicae* SEMEN, e gilvo viridescens, crasse granulatum; saporis acris amaricantis; odoris Zedoariae validi. Rejiciatur impurum, discolor, & longiore seminum specie intermixtum. Ex Oriente & Africae ora maritima adfertur, & saepius adulteratum est.

CITRULLI. Angurien-Band. Meloner-Froe. Angurien-Saamen. Wassermelonen-Saamen.

Cucurbitae Citrulli in hortis cultae, SEMEN recens, non rancidum.

COCHLEARIAE. Skeeurt-Froe. *Vid. Herba.* Löffelkraut-Saamen.

Cochleariae officinalis, ad littora marina habitantis, SEMEN parvum, ex russo fuscum, rotundum; saporis acris, amaricantis. Flor. Dan. 135.

COCOGNIDII. Kielderhals. Tived. Tutved. Tyrved. Kiusved. Tisbast. Kiusbas-Froe. Kellerhals. Seidenbast. Purgier-Körner.

Daph-

Daphnes Mezerei, in ſylvis borealibus habitantis, SEMEN rotundum, Pipere paulo majus, fuſcum, urentis ſaporis. Flor. Dan. 268.

COLOCYNTHIDIS. Koloquint=Froe. Coloquinten=Saamen.

Cucumeris Colocynthidis in hortis culti, SEMEN albicans, oblongum, compreſſum

CORIANDRI. Coriander=Froe. Coriander.

Coriandri ſativi SEMEN recens, rotundum, ponderoſum; odoris grati. Leve, pulverulentum, a vermiculis exeſum rejiciatur. Herba Italiae inquilina, in hortis colitur.

CUCUMERIS. Agurken=Froe. Gurken=Saamen.

Cucumeris ſativi SEMEN.

CUCURBITAE. Græskar=Froe. Kürbiß=Saamen.

Cucurbitae Peponis SEMINA, e pomo quotannis recentia comparanda.

CUMINI. Kummen. Kümmel.

Cumini Cymini SEMEN recens, oblongum, ſtriatum, toroſum, purum, graveolens, vermiculis non exeſum. In hortis herba provenit.

CYDONIORUM. Quedekorn. Quittenkerne.

Pyri cydoniae SEMINA, quae quo magis nitida ſunt & e ſpadiceo fuſca, eo meliora habentur. Rejiciantur vetuſta, nigra, ſordida.

CYNOSBATI. Hyventorn=Froe. Engeltorn=Froe. Hagenbutten=Saamen.

Roſae eglanteriae ad ſepes habitantis, SEMEN, probe a lanugine liberandum.

DAUCI

DAUCI SYLVESTRIS. Vilde guule Rodder-Froe. Derrerods-Froe. Derreurts-Froe. Wilder Möhren-Saamen.

Dauci Carotae ſylveſtris SEMEN ſtriatum, quod Dauci hortenſis Semine efficacius eſt. Herba in campis exaridis offenditur.

ENDIVIAE. Endivie-Froe. Endivien-Saamen.

Cichorei Endiviae in hortis culti, SEMEN parvum, oblongum.

ERUCAE. Hviid Senneps-Korn. Weiſſer Senf-Saamen.

Braſſicae Erucae in hortis cultae, SEMEN rotundum, parvum, flaveſcens; ſaporis acris.

FABAE. Bonner. Bohnen.

Viciae Fabae SEMINA, pro farina.

FOENICULI. Fennikel-Froe. Fenchel-Saamen.

Anethi Foeniculi in hortis culti, SEMEN ponderoſum, oblongum, ſubviride, ſtriis eminentibus ſpadiceo-albicantibus, aut pallide flaveſcentibus diſtinctum, oleo dives, gratique odoris.

FOENUGRAECI. Fonugræk-Bukshorn-Froe. Bocks-horn-Saamen.

Trigonellae Foenugraeci SEMINA, e Gallia, Germania auſtrali & Italia advecta; coloris lutei; figurae rhomboideae; odoris fortis, ingrati; ſaporis mucilaginoſi.

FRAXINI. Aſke-Froe. Eſchbaum-Saamen.

Fraxini excelſioris SEMEN fuſcum; ſubacris & amari ſaporis.

GRANATORUM. Granat-Froe. Granat-Saamen.

Punicae Granati SEMINA.

HORDEI. Byg. Gerſte.

Hordei vulgaris SEMEN.

HORDEI PERLATUM. Perle-Gryn. Perlen-Graupen.

HORMINI. Skarleye-Skarlage-Froe. Scharlach-kraut-Saamen.

Salviae Hormini in hortis cultae SEMEN; ſuaviſſimi odoris.

HYOSCYAMI. Fandens Noſſer-Froe. *Vid. Herba.* Bilſen-Saamen.

Hyoſcyami nigri in ruderatis pinguibus creſcentis, SEMEN exiguum, ſubcinereum, ſubrotundum, rugoſum, compreſſum.

LACTUCAE. Lactuk-Froe. Lattuk-Saamen. Lattich-Saamen.

Lactucae ſativae in hortis cultae SEMEN pappoſum, parvum, utrinque acuminatum, oblongum, compreſſum; cinerei coloris.

LAPATHI ACUTI. Skreppe-Froe. Mengel-oder Grind-wurtz-Saamen.

Rumicis Lapathae in ſucculentis provenientis SEMEN fuſcum, triangulare.

LEVISTICI. Lobſtick-Froe. Lubſtilk-Froe. Lieb-ſtöckel-Saamen.

Liguſtici Leviſtici in hortis culti, SEMEN oblongum, planum, ſtriatum, membranaceum, coloris pallidi; odoris fragrantis; ſaporis aromatici.

LINI

LINI SATIVI. Hør-Frøe. Lein-Saamen.

Lini usitatissimi SEMEN.

LUPULI CONI. Humle. Hopfen.

Humuli Lupuli SEMINA.

MANNAE. Mannagræs-Gryn. Suppegræs-Gryn. Manna-Grütze.

Festucae fluitantis, in fossis & paludibus habitantis SEMEN. Flor. Dan. 237.

MELISSAE. Melisse-Frøe. Melissen-Saamen.

Melissae officinalis, in hortis cultae, SEMEN exiguum, fuscum.

MELONUM. Melon-Kierne. Melonen-Saamen.

Cucumeris Melonis, in hortis culti SEMEN.

MESPILORUM. Mespil-Frøe. Mispel-Saamen.

Mespili germanicae, in hortis cultae, SEMEN planum, subnigrum.

MILII SOLIS. Steenbræk-Frøe. Stein-Saamen. Perlen-Hirse.

Lithospermi officinalis, in ruderatis habitantis, SEMEN rotundum, glabrum, splendidum, album.

NAPI. Ræpe-Frøe. Stechrüben-Saamen.

Brassicae Napi, in arenosis, maritimis provenientis, SEMINA parva, rotunda, ex rubro nigra; saporis acris, amaricantis.

NASTURTII HORTENSIS. Karse-Frøe. Kressen-Saamen.

Lepidii Sativi SEMEN parvum, oblongum, ex flavo fuscum; saporis acris.

NIGELLAE. Sort=Coriander. Sort Kummen. Schwartz Kümmel.

Nigellae ſativae SEMEN toroſum, probe maturum; odoris gravis, parum aromatici. Herba inter olera & in agris provenit. Circumforanei Daturae Semen immiſcent, quod ſtudioſe vitandum.

ORYZAE. Riiſen=Froe. Reiß.

Oryzae ſativae, in Indiae paludoſis cultae SEMINA.

PAEONIAE. Pæonien=Froe. Gicht=Roſen=Saamen. Päonien=Saamen.

Paeoniae officinalis, in hortis cultae SEMEN nigrum, piſi magnitudinis.

PAPAVERIS ALBI. Hviid Valmue=Froe. Weiſſer Mohn. Mohn=Saamen.

Papaveris ſomniferi albi SEMEN; *Nigri* CAPSULAE SEMINALES recentes pro Syrupo Diacodii parando inſerviunt.

PETROSELINI. Perſille=Froe. Peterſilien=Saamen.

Apii Petroſelini SEMEN recens, oblongum, ſtriatum, parvum, graveolens. Sufficit Noſtras, & recens praeſtat prae vetuſto *Petroſelini Macedonici* (*Bubonis Macedonici*) Semine.

PHELLANDRII. vulgo FOENICULI AQUATICI. Skarntyde=Froe. Waſſer=Schierling=Saamen. Peer=Saat.

Phellandrii aquatici, in foſſis provenientis SEMEN oblongum, ſtriatum. Vid. Lange de Remediis domeſticis Brunsvic. pag. 222.

PLANTAGINIS. Veibred=Froe. *Vid. Herba.* Wegerich=Saamen.

Plan-

Plantaginis majoris, ad vias creſcentis SEMINA minutiſſima, longiuſcula, fulva; ſaporis mucilaginoſi. Flor. Dan. 461.

PORTULACAE. Portulack-Froe. Portulac-Saamen. Burtzelkraut-Saamen.

Portulacae oleraceae, in hortis cultae SEMEN valde exiguum, nigrum; ſaporis oleoſi.

PSYLLII. Loppe-Froe. Flöh-Saat.

Plantaginis Pſyllii, aut *Cynopos* SEMINA, ex Europa auſtrali allata, puliciformia, fuſca.

RAPARUM. Roſve-Froe. Rüben-Saamen. Weiſſer Rüben-Saamen.

Braſſicae Rapae, in agris cultae SEMEN.

RICINI VULGARIS. *Vid. Cataputiae majoris* SEMINA.

RUTAE. Rude-Froe. Weinrauten-Köpfe.

Rutae graveolentis, in hortis cultae CAPSULAE SEMINALES, nigrae, parvae, figurae ſemilunaris, quae foliis praeſtantiores ſunt.

SABADILLI. Luuſe-Froe. Cavadill. Läuſe-Saat.

E ſpecie *Aconiti*, aut *Delphinii* in regno Mexicano collectum, & in Capſulis oblongis, gibboſis, quaſi corniculatis, trilocularibus allatum SEMEN, figura & colore nigricante Muſcerdam referens. Praeſtat Semine *Staphiſagriae.*

SILERIS MONTANI. Seſel-Froe. Bierg-Kummen. Seſel-Saamen. Berg-Kümmel.

Laſerpitii Sileris SEMINA, e Gallia Narbonenſi & Provincia allata. Sint viridiuſcule pallida; ſaporis acris, aromatici & ſucci plena. Pro Theriaca requiruntur.

SINAPI. Seneps=Korn. Senf=Saamen.

Sinapi nigrae SEMEN recens; ſaporis acris, fervidi.

SOPHIAE CHIRURGORUM. Bartſkiærs Viisdom=Barbeer=Forſtand=Froe. Sophienkraut-Saamen. Habicht=Saamen.

Siſymbrii Sophiae, in muris tectisque creſcentis SEMINA minutiſſima, oblonga, ruſſa; ſaporis acris. Flor. Dan. 528.

TANACETI. Reinfand=Froe. Ormekrud=Froe. Reinfaren=Saamen. Gemein Wurmſaat.

Tanaceti vulgaris in aggeribus creſcentis SEMEN, cum Cinac Semine conveniens.

THLASPI CRETICI. Cretiſk Thlaſpi=Froe. Cretiſcher Thlaſpi=Saamen.

Iberidis umbellatae SEMINA.

THLASPI VULGARIS. Pengeurt=Froe. Pengegræs=Froe. Bauern=Senf. Beſenkraut=Saamen.

Thlaſpi arvenſis in agris reperiundi SEMINA oblonge rotunda, parva, fuſca; ſaporis viſcoſi, acris.

THYMI. Thymian=Froe. Thymian=Saamen.

Thymi vulgaris in hortis culti SEMINA oblonga, fuſca.

VIOLARUM. Marts=Fioler=Froe. Blauer Violen=Saamen.

Violae odoratae in nemoribus & paſcuis provenientis SEMEN albicans, rotundum, ſplendidum; ſaporis oleoſi ſubacris. Flor. Dan. 309.

URTICAE MAJORIS. Brændenælde=Froe. Brenneſſeln=Saamen.

Urticae dioicae in ruderatis creſcentis SEMEN parvum, compreſſum, ſpadiceum; ſaporis ſubacris.

URTI-

URTICAE ROMANAE. Romiſk Nælde-Froe. Römiſche Neſſeln-Saamen.

Urticae piluliferae in hortis cultae SEMINA fuſca, ſplendentia, Lini ſemine minora; ſaporis ſubacris.

CANONES GENERALES.

I. SEMINA colligantur perfecte matura, antequam ſponte excidant, locoque ab aëre perflato probe ſiccentur, ſine ignis adminiculo.

II. QUAE capſulas, involucra &c. retinent Semina, ea his munita ſerventur.

III. PLERORUMQUE autem Seminum delectus ita inſtituendus eſt, ut aquae immittantur, & quicquid ſupernatat abjiciatur; quod vero fundum petit iterum ſiccetur.

VII. FRUCTUS.

ACACIAE BACCAE. Slaa-Kreigebær. Schleen.

Pruni ſpinoſae BACCAE immaturae pro Roob.

ALKEKENGI BACCAE. Boborel. Jødiſke Kirſebær. Juden-Kirſchen. Boborellen.

Phyſalidis Alkekengi BACCAE, in vineis & ſylvis umbroſis Galliae & Germaniae provenientes.

AMOMUM. PIPER JAMAICENSE. PIMENTA. Allehaande. Allermanns-Gewürtz.

Myrti Pimenti Jamaicenſis BACCAE rotundae, e ſubruffo nigricantes, immaturae; odoris & ſaporis aromatici, ex Cinnamomi, Myriſticae & Caryophyllorum ſapore confuſi, proxime tamen ad Caryophyllorum accedentis. Eligatur non admodum

leve

leve aut rugoſum, graveolens, grandius. Rejiciatur quod vetuſtate in fruſta pulveremque dilabitur.

AURANTIA MALA. Pomeranzer. Pomeranzen.

Citri Aurantii BACCAE immaturae, *Aurantia Curaſſavenſia* dictae; atque maturae, quarum etiam *Cortex* externus ſub *Flavedinis* nomine ſervatur.

BACCAE NORLANDICAE. Ackerbær. Su.

Rubi arctici FRUCTUS, prae reliquis omnibus odore fragrante, ſuavi ſapore, ac vi analeptica pollens, & laete in hortis germinans.

BERBERUM BACCAE. Berberisbær. Berberis-Beeren.

Berberidis vulgaris BACCAE recentes, pro Gelatina aut Syrupo.

CACAO. Cacobonner. Cacau. Chocolade-Frucht.

Theobromatis Cacao FRUCTUS ex America auſtrali allatus.

CARDAMOMMUM MINUS. Cardamomen. Cardamomen.

Amomi Cardamomi FOLLICULI ventricoſi, triquetri, triloculares, continentes Semina anguloſa, e ſubruffo fuſca ſi recentia, quae præferenda; temporis mora vero e cinero ferruginea, multum aromatica, notabilis Camphorae odoris.

CARICAE. FICUS. Figen. Feigen.

Ficus Caricae RECEPTACULUM FRUCTIFICATIONIS carnoſum. Eligantur pingues, i. e. recentes, ponderoſae, molles, grandes, toroſae, parenchymate melleo, tenaci, flavo; ſeminibus flavis turgentes. Rejiciantur nigrae, durae, ſordibus vermiſis inquinatae.

CASSIA FISTULA. Caſſie. Caſſie.

Caſſiae

Cassiae fistulae SILIQUA teres, cylindracea, cubitalis, sub putamine lignoso-nigro, interne dissepimento interstincto, continens semina compressa, fulva, & pulpam subdulcem, nigredinis splendentis. Seligatur recens, ponderosa, a scarabaeis non exesa, concussa sonum a seminibus non edens, medulla dulci scatens, non valde acida aut amariuscula, neque odorem spargens mucidum. *Indica*, quae vere afficax est, rarissime ad nos pervenit. Accedit ad eam *Alexandrina*: vilior est *Americana* in Americae insulis luxurians. Prior cortice laevi, tenuiore, obscurioris coloris tecta est, & pulpam continet dulciorem, parum nauseosam. Posterior externe rugosa, aspera, crassior, pulpam fovet acidam magis & nauseosam. Quidam e deteriore Cassiae specie pulpam melle syrupisque conditam extrahunt, sub *Floris Cassiae* nomine, quae vero mora temporis mucorem & acredinem noxiam contrahit.

CERASA ACIDA. Kirsebær. Kirschen.
Pruni Cerasi DRAPA, cujus Caro recens ad Roob adhibetur.

CITREA MALA. Citroner. Citronen.
Citri medicae MALA, Succus, Cortex siccatus.

COCULI INDICI DE LEVANTE. Kocke-Kierner. Kockel-Körner. Fisch-Körner.
Menispermi Cocculi FRUCTUS reniformis, fuscus, rugoso Cortice tectus, venenatus. Ad necandos pediculos, & pisces captandos, exposcitur.

COLOCYNTHIDIS POMA. Coloquinder. Coloquinten.
Cucumeris Colocynthidis POMA, ex Oriente allata, candida, levia, fungosa, peramara, integra, cortice duro ex albo luteo cincta.

Cubebae. Cubeber. Cubeben. Schwindelkörner.

Ignoti Vegetabilis e *Piperitarum*, ut videtur, familia, quod Hederae arboreae more arbores cingit, Baccae petiolatae, ex Indiis advectae. Eligendae ſunt maturae, toroſae, ponderoſae, oleoſae, neque ſenio, neque immatura aetate emaciatae aut corrugatae; fragrantis, aromatici odoris; ſaporis acris atque aromatici.

Cucumeris asinini. Aſen-Agurke. Eſels-Gurken.

Momordicae Elaterii Pomum recens, cujus ſuccus pro Elaterio conficiendo adhibetur.

Cydonia mala. Queder. Quitten.

Pyri Cydoniae Fructus, pro Gelatina aut Roob.

Cynosbata. Nyper. Haubutten.

Roſae caninae Fructus, pro Roob.

Ebuli baccae. Attickbær. Attichbeeren.

Sambuci Ebuli Baccae recentes.

Faba pichurim. Pecuris. Pecairo.

Copaiferae officinalis Fructus, Amygdalae majoris per longitudinem diſſectae & excavatae ſimilitudinem referens; coloris nigricantis, tenui epidermide tectus, longitudinis unius, latitudinis dimidii pollicis; intus coloris fuſci inſtar Nucis Moſchatae; odoris & ſaporis ex Nucis Moſchatae & ligni Saſſafras mixti. Ex Braſilia & inſula Marahan adfertur.

Faba sancti ignatii. Ignatius-Bonner. Ignatius-Bohnen.

Ignoti Vegetabilis Fructus orbiculares, magnitudinis Avellanae, externe nitentes, nodoſi, inaequales; coloris ex murino glauci ſemipellucidi; compaginis durae, corneae; ſaporis

ris intenſe amari. Semen continetur Pomo, Cucurbitae non abſimili, *Catalongay* indigenis Philippinarum inſularum, ubi provenit, dicto. Eligantur recentes, ponderoſae, grandiores, quamvis & ipſis carioſis non deſit virtus.

Fraga. Jordbær. Erdbeeren.

Fragariae veſcae Fructus recentes, pro Aqva ſtillatitia & Syrupo.

Grana paradisi. Cardamomum maximum. Paradis-Korn. Paradies-Körner.

Amomi Grana Paradiſi Fructus ex India orientali allatus, Ficus magnitudinis, interne in tres cellulas diviſus, in quarum ſingula duo ordines exiguorum ſeminum, inſtar Cardamomi continentur. Pro Theriaca requiritur.

Granatorum mala. Granat-Ebler. Granat-Aepfel.

Punicae Granati Fructus & Cortex.

Juglandis fructus. Valnoder. Wallnüſſe.

Juglandis regiae Drapa immatura, pro Condito & Extracto vermifugo.

Juniperi baccae. Enebær. Wachholder-Beeren.

Juniperi communis Baccae grandes, nigrae, reſinoſae, ponderoſae; odoris gravis.

Lauri baccae. Laurbær. Lorbeeren.

Lauri nobilis Baccae recentes, nigricantes, oleo divites; odoris ac ſaporis gravis, aromatici; non flaccidae nec carioſae.

Liliorum convallium baccae. Lilleconvall-Bær. Mayenblumen-Beeren.

Convallariae majalis Baccae.

Macis. Muſkat-Blommer. Muſchaten-Blumen.

Myristicae Drupae inter duplicem nucem, super nucleum expansus Cortex interior, reticularis, laciniatus. Sit recens, tenax, fragrans, oleo dives; coloris nitidi, e cinnamomeo aurei, magnis frustis & laciniis conspicuus. Qui e laciniis parvis compositus fragilis est, albicans aut dilutius flavescens, rejiciatur.

Mespila exsiccata. Mespiler. Mispeln.
Mespili Germanicae Fructus exsiccati.

Momordicae fructus. Balsam-Æbler. Balsam-Aepfel.
Balsaminae Momordicae Fructus recens, in hortis cultus, verrucosus, tuberculatus, parum carnosus.

Mora. Morbær. Maulbeeren.
Mori nigrae Baccae, pro Roob aut Syrupo.

Myrtilli exsiccati. Blaabær. Boller. Bollerris. Heidelbeeren.
Vaccinii Myrtilli Baccae, Julio & Augusto colligendae.

Nux moschata vel myristica. Muskat-Nod. Muschaten-Nuß.
Myristicae Drupae e duplici nuce Nucleus, ex insulis Oceani Indici advectus. Nux rotunda, vulgo femina, præstat oblongae, vulgo mari, non adeo efficaci. Sit grandis, ponderosa, extus e murino fusca, intus e fusco & ruffo variegata, fragrans multum, & acu puncta multum olei exsudans. Rejiciatur cariosa & vilior species, Rümpfe, Germanis vocata.

Nux vomica. Krants-Øien. Krähen-Augen. Krans-Augen.
Strychnos Nux Vomica. Est Nucleus compresse ovatus, cinereus, corneae duritiei; ex Malabaria advectus.

Pas-

PASSULAE MAJORES. Rosiner. Rosinen.

Vitis viniferae UVAE ſolem paſſae & ſiccatae. Eligantur longae, pauca continentes ſemina, toroſae, pingues, tenera cuticula tectae, lumini admotae pauxillum pellucidae, in fictilibus ſub denominatione Pottrosiner allatae. Damaſcenae & Syriacae praeſtant prae Hiſpanicis & Italicis.

PIPER ALBUM. Hviid Peber. Weiſſer-Pfeffer.

Eſt PIPER nigrum maceratum & Cortice ſpoliatum. Sunt qui deteſtabili fraude, Piper decorticatum nec dum ſiccatum, in magmate ex Amylo & Ceruſſa volutant, ut majora, candidiora & ponderoſiora evadant grana.

PIPER LONGUM. Lang Peber. Langer Pfeffer.

Piperis longi BACCAE immaturae, amentorum more congeſtae, ex India orientali advectae. Rejiciantur carioſae, a vermibus exeſae.

PIPER NIGRUM. Sort Peber. Schwartzer Pfeffer.

Piperis nigri, *Sirium Rumphio* dicti, ex India orientali allatae BACCAE monoſpermae. Eligantur grana magna, compacta, ponderoſa, non rugoſa.

PISTACIAE EXCORTICATAE. Piſtaſer. Piſtacien.

Piſtaciae verae FRUCTUS, ex Perſia, Syria, nec non Hiſpania & Italia advecti, anguloſi, oblongi, Avellanae magnitudinis, ſub putamine tenui, ruffo, nucleum virideſcentem, oleoſum, ſaporis ſubdulcis, grati, includentes. Eligantur recentes, ponderoſae, non rancidae.

POMA BORSDORFIANA. Borsdorfer Æbler. Borsdorfer Aepfel.

Pyri mali Borsdorfiani POMA recentia, pro Tinctura, ſi lubet, Martis.

PRUNA. Blommer. Pflaumen.

Pruni domesticae DRAPAE ſiccatae, toroſae & carnoſae, ſine ingrato a fumigatione odore.

PRUNEOLA. Brüneller. Prunellen.

Pruni Brignolenſis DRAPAE a nuce ſeparata Caro. Sint recentia, ſemipellucida; coloris e buxeo ſpadicei, mollia, humidula. Afferuntur e Gallo provincia.

RIBESIA RUBRA. Røde Ribs. Rothe Johannis Beeren.

Ribis rubrae BACCAE, pro Roob aut Gelatina.

RUBI CHAMAEMORI BACCAE. Multebær. Myrebær. Laamanak. Latoch. Laddok. Pautkenbeeren.

Rubi Chamaemori FRUCTUS, ex Norvagia ſaccharo conditi advecti. Flor. Dan. 1.

RUBI IDAEI BACCAE. Hindbær. Hinbeeren.

Rubi Idaei BACCAE recentes, pro Syrupo.

SAMBUCI BACCAE. Hyldbær. Fliederbeeren.

Sambuci nigrae BACCAE recentes.

SILIQUA DULCIS. St. Hans Brod. Johannis Brod.

Ceratoniae Siliquae SILIQUA, callo laevi, dulci, e ſpadiceo ferrugineo tecta; ſemina continens e fuſco ſpadicea, compreſſa, pulpamque coloris e fuſco buxei, duram, ſubdulcem. Sit recens atque toroſa. Ex Hiſpania, Italia ac Oriente advehitur.

SPINAE CERVINAE BACCAE. Korsbær. Brietorn. Viebær. Hiortebær. Jyttelbær. Creutzbeeren. Weichdornbeeren.

Rhamni cathartici BACCAE, ſemine triangulari & ſucco ex purpureo virideſcente ab aliis baccis admiſtis diſtinguendae.

TA-

TAMARINDI. Tamarinder. Tamarinden.

Tamarindi Indicae ex ſiliquis depromta PULPA, e fuſco nigricans, viſcida & quaſi ſubpinguis, filamentis lignoſis ac ſeminibus compreſſis, duris, quadratis, ſpadiceis, ſplendidis permixta; ſaporis acidi, vinoſi, pungentis, parumper nauſeoſi, quibus notis facile a Prunorum pulpa, ubi larga manu admiſta fuerit, dignoſcitur. Eligatur recens, tenax, ſpiſſa, ex ſubruffo nigricans; ſaporis acrioris. Vitanda eſt, quae in cellis locisque humidis diu fuit recondita, quod patebit ex ſuperficie externa uda, ſeminibusque emollitis, tumidulis, neque adeo ſplendentibus. Quidam ſicciorem pulpam Aceto madefactam Saccharo condiunt, quod ex minus ſequaci viſco & ſapore mitiore pateſcit. Carnem ſiliquae exemtam, Indi Arabesque cum aqua & aceto in vaſis cupreis in pulpam, vulgo in officinis proſtantem, redigunt, quae vero ut noxia rejicienda. Praeſtaret igitur e ſiliquis ipſis conficere Pulpam. Eſt vero haec ſiliqua Legumen, duplici ſiliqua conſtans, interna & externa. Externa eſt e ſpadiceo fuſca aut virideſcens, protuberantiis, iis in locis, ubi ſemina latent, notata. Interna virideſcit. Ambas inter recondita eſt pulpa cum ſemine & filamentis tenacibus, quae ab alterutro leguminis apice ad alterum decurrunt. Quae in variis Americae regionibus colitur Arbor, non adeo generoſae indolis pulpam ſuppeditat. Dignoſcitur Siliquae patria ex ſeminum numero, quae ſena ſunt aut ſeptena in Orientali, non niſi terna aut quaterna in Occidentali.

VANILLAE. Vaniller. Vanilien.

Epidendri Vanillae FRUCTUS, ſive Siliquae compreſſae, ſemipedem longae, calami ſcriptorii majoris craſſitiei; coloris ex atro fuſci; ſaporis aromatici; odoris grati; pulpam ſeu medul-

medullam cum minutiſſimis acinis pinguem continentes. Ex America & inprimis nova Hiſpania advehuntur. Eligendae ſunt Siliquae mediae magnitudinis, pingues, recentes, aromatici ſaporis atque odoris.

Vitis idaeae. Tyttebær. Krosingbær. Krošlinger. Tytebær. Tytling. Preiſſelbeeren. Kranbeeren.

Vacciniae Vitis idaeae Fructus ſaccharo conditi, e Norvagia ad nos pervenientes. Flor. Dan. 40.

CANON.

Fructus non niſi maturi decerpantur, ſi excipias *Acaciae* & *Aurantii* Fructus, de quibus ſupra.

VIII. SUCCI VEGETABILIUM ARIDI.

Aloe Hepatica. Succotrina. Aloe. Aloe.

Aloës variegatae Guineenſis; *Aloës perfoliatae* Chinenſis & Barbadenſis; *Aloës perfoliatae Succotrinae*, Alexandria advectae Succus, e foliis collectus, gummoſo reſinoſus. *Caballina* impura Hippiatris relinquatur, & quae ex hac fraudulenter parata Aloë pura ſplendensque pro Succotrina venditur, ingrato, nauſeoſo ſapore atque odore ſe prodit. *Succotrina* proba ſplendens eſt, pellucida, e ſpadiceo fuſca, comminuta coloris ex aureo fulvi, calore manus flexilis, ſaporis multum amari, non ingrati tamen & paulum aromatici, odoris Myrrham mentientis, gummoſae magis indolis quam *Hepatica*, quae obſcurior eſt, opaca, compactior. Hujus nobilior ſpecies in putaminibus cucurbitarum ex Indiis & China;

vilior

vilior in Cadis ex inſulis Americanis, praecipue Barbados inſula adfertur.

Ammoniacum gummi. Ammoniak. Gummi Ammoniac.

Plantae ferulaceae Succus gummoſo-reſinoſus, ex India orientali & Ægypto adductus; externe obſolete flavus, interne ex albeſcente, rubente & obſolete flavo variegatus, lentus, & calore manus molleſcens; odoris mirum nauſeoſi, alliacei multum, caſtoreati pauxillum ſpirantis; ſaporis nauſeoſi, amaricantis; ſeminibus, Anethi non abſimilibus, ſabuloque plerumque interpolatus. Pro uſu interno non niſi *Electum*, puriſſimum, *Thrauſma* Veteribus dictum, adhibeatur, i. e. vel Ammoniacum in granis puris emtum, vel grumi candidiores, variegati, ſubſplendentes, e Maſſa ſelecti. Quod jam Colatum venditur, ſuſpectum eſt, cum nonnunquam Peucedani ſuccum, aliaque viliora admiſta habeat.

Anime. Anime. Anime.

Hymenaeae Courbariae Resina, ex America auſtrali, Guajana & Braſilia inprimis allata. A Luſitanis advectum Anime Æthiopicum, nunc raro occurrit. Eligitur ex albo citrinum, pellucidum; odoris ad ſtoracinum accedentis; ſaporis grati, parum fervidi.

Asa foetida. Dyvelsdreck. Stinkender Aſand. Teufelsdreck.

Ferulae Aſae foetidae, *Kaemfero Hingiſch* dictae, *Gummireſina*, e radice ſauciata potiſſimum elicita, ex Perſia Indiisque allata; odoris foetidi, tetri, ex alliaceo viroſi. Eligatur graviſſimo odore praedita, inſtar cerae flexilis & lenta, plurimisque maſſulis albentibus, luteis, roſeis, murinis, amethyſtinis, cum ſplendore aliquo variegata.

Balsamus tolutanus. Balſam af Tolu. Balſam von Tolu.

Tolviferae Balſami Succus reſinoſus, ex Americae provincia Tolu (*Honduras*) in putaminibus cucurbitarum allatus; coloris e laete flavo fulvi, variegati, conſiſtentiae primum viſcoſae, ſequacis, dein durae fragilisque; odoris fragrantis, ad Benzoës Citrique proxime accedentis; ſaporis dulcis, grati. Eligatur recens, putaminibus non exemtus, prementi digito cedens, & ſi forte induruerit, ore detentus non fragilis, ſed Maſtichis inſtar in paſtam tenacem coaleſcens. Rejiciantur fruſta vetuſtiora, e putaminibus exemta, utpote nullius virtutis. Supplet abunde hic Balſamus locum Opobalsami sicci, *Piſtaciae Lentiſci* ut volunt, ſobolis, nec non Balsami de Mecca, *Amarydis Opobalſami Gileadenſis*, vel plane non obvii vel adulterati.

Bdellium. Bdellium Gummi. Gummi Bdellium.

Arboris incognitae, aut nondum deſcriptae, in Guinea, Arabia, Media & India naſcentis, Lachryma; coloris ferruginei, nigricantis, in guttas ſeu grana concreta, ſapore ac odore ad Myrrham accedens. Saepius cum Myrrha in ciſtis permiſtum reperitur. Praefertur amarum, translucidum, dum frangitur pingue ac odoratum.

Benzoe. Benzoe. Benzoe.

Lauri Benzoinae Resina ex Indiis allata, fere opaca, facile fragilis, fragrans; coloris e flavo, ruffo alboque variegati. Quo magis abundat maſſulis ejusmodi albicantibus, flaventibus, *Amygdaloides* tunc dicta, eo eſt praeſtantior. Rejiciatur fuſca, impura.

Camphora. Campher. Campher.

Lauri

Lauri Camphoriferae CONCRETUM resinoso-oleosum, volatile, in glebis deformibus sordidis e Japonia, per Batavos allatum, & ab iisdem nova, uti videtur, sublimatione, ope Calcis vivae per se exstinctae ac dilapsae, depuratum, & in panes seu massas orbiculares coactum. Quum ocyssime in auras avolet, vesicae ope ab aëris accessu custodienda est.

CARANNA. Caranna Gummi. Caranna.

Ignotae Arboris GUMMI RESINA tenax & dura, quae recens picis instar ductilis, inveterata vero fragilis est & dura; coloris ex viridi nigricantis; saporis amari ingrati; odoris fragrantis, praesertim dum accenditur. Ex nova Hispania in frustis cylindraceis, foliis Junci involutis, advehitur.

CATECHU. TERRA JAPONICA. Japonisk Jord. Catechu.

Arecae Catechu, e Palmarum familia, *Pinanga* Rumphio dictae, in Indiis germinantis, Fructuum seu Druparum Succus, maximam partem gummosus. Optimum Catechu, sed rarum, coloris est spadicei, purissimum, lamellatim dispositum; lenissime adstringentis primum, dein subdulcis gratique saporis. Vulgare bonae notae Catechu, coloris est e badio nigri, interne pauxillum laetioris & cum splendore nitidi, saporis non ingrate adstringentis, totumque in ore deliquescit, nullis relictis foecibus. Nigrum, adustum, cum nidore ingrate sapidum & acerbum, recrementis terreis spurcatum, in aqua non omne solubile, rejiciatur.

CERASORUM GUMMI. Kirsebær Gummi. Kirschen Harz. Kirschen Gummi.

Pruni Cerasi RESINA, locum Gummi Arabici supplens.

COLOPHONIUM. Harpix. Spiegel-Harz. Geigen-Harz. *Vid. Oleum Terebinthinae.*

COPAL. PANCOPAL. Copal. Gummi Copal.

Rhois copalini RESINA duriuſcula, diaphana, ex albo flaveſcens; dum carbonibus inſpergitur odorata, ex nova Hiſpania allata, in uſus pictorios praecipue adhibita.

ELEMI. Elemi. Elemi.

Amyridis Americanae RESINA. Celebratum olim ELEMI AETHIOPICUM, coloris ex albo lutei & languide viridis variegati, externe durum, interne tenax, molle; odoris Foeniculi, arundine involutum, non niſi rariſſime invenitur. Sed ejusdem fere virtutis eſt ELEMI VULGARE *Amyridis*, modo probum ſit, ejusdem ac Aethiopicum coloris, fere pellucidum, ſiccum & fragile, ſed calefactum tenax & ſequax; odoris ſubvinoſi, fragrantis. Rejiciatur friabile, fuſcum, cinereum. Sunt qui Reſinam flavam cum Oleo Spicae & Terebinthina commiſcent, indeque *Elemi* artificiale componunt, quod facile ignis calore, quo odor Terebinthinae pateſcit, detegitur. E *Factitio Elemi* paratum Unguentum Arcaei, mox in ſuperficie contrahit pelliculam aridam, duriuſculam, gilvam: probum vero Elemi cum reliquis aequabiliter commiſtum manet.

EUPHORBIUM. Euphorbium-Gummi. Scharfes Euphorbium-Gummi.

Euphorbii Officinarum GUMMI RESINA, concreta in Guttas vel lacrymas ex pallido flaveſcentes, aut coloris aurei ſplendidas, modo rotundas, modo oblongas, ramoſas & cavernoſas; ſaporis acerrimi, exurentis, nauſeoſi; odoris expers. Affertur ex Africae regionibus.

GALBANUM. Galbanum. Galbanum.

Bu-

Bubonis Galbani Gummi resina, e Syria advecta, recens ex albo lutea; vetuftior ex luteo fubruffa, aqua folubilis & ad ignem flammam concipiens. Eligatur Gummi recens, ficcum quidem, fed calore manus lentefcens & ductile, impenfe & naufeofe fpecifice olidum. Praefertur in granis allatum, quamvis variis interdum quisquiliis interpolatum. Neque tamen quod in maffis ad nos pervenit, rejiciendum eft, modo copiofas particulas albicantes, parum fplendentes, fpiritum vini aureo colore tingentes contineant. Abjiciatur vero impurum, coloris luridi, fufci, craffitudinis cereae. Adulteratur variis vilioribus refinis, Ammoniaco aut Gummi fubruffo *Ferulae Galbaniferae*, quae in Sicilia crefcit, variisque ramentis vegetabilibus additis, quod e debiliore odore & defectu fplendoris, colorisque variegati patefcit. Depurationem indicat Pars II.

Glycyrrhizae succus. Lakritz-Saft. Liquiritien-Saft.

Glycyrrhizae glabrae Succus expreffus infpiffatus. Praefertur vulgo Hifpanicus, fed aeque admittendus Germanicus, modo fit e ruffo fufci, dum frangitur nigri fplendentis, & ubi in fila diftrahitur, nitide aurei coloris; faporis vero dulcis, radice ipfa gratioris; odoris fuavis, non empyreumatici; linguae impofitus omnis deliquefcens, & aqua folutus paucas faeces in fundo relinquens.

Guajaci. Guajac-Gummi. Guajac-Harz.

Guajaci officinalis e ligno Resina, ex America allata, fragilis, friabilis; faporis acris, pungentis; odoris nullius, grati vero fi prunis injiciatur; coloris externe ex viridi pulli aut obfcure ruffi, interne albicantis, fubrubelli. Adulteratur additione aut Colophonii, aut Balfami Sulphuris Smalcaldici. Fraus detegitur facile fuper igne, qui fulphuris odorem extricat.

GUTTA. GUTTA GAMBA. CAMBOGIA. Gummigut. Gummigutt.

Cambogiae Guttae GUMMI RESINA, e China atque Siam allata, opaca; coloris aurantii. Rejiciatur impura, ſordida & nigricans.

HEDERAE. Heddende=Gummi. Epfeu=Harz.

Hederae Helicis RESINA, e fulvo, caſtaneo aut viridi ferruginea; fragilis, pellucidula, interne ſubruffa, maculis ferrugineis variegata; ſaporis acris, ſubadſtringentis, aromatici; odoris nullius, ſuper igne vero grati cum vivida flamma. Affertur maximam partem ex Indiis, ſubinde etiam e Gallia Narbonenſi.

HYPOCYSTIDIS.

Aſari Hypocyſtidis SUCCUS inſpiſſatus, e Turcia, Creta, Gallia Narbonenſi nobis advectus; ſiccus, niger, ſplendens; aliquid odorati habens; intenſe amarus, adſtringens.

LADANUM. Ladanum Gummi. Ladanum.

Ciſti Ladaniferae GUMMI RESINA, in Creta maximam partem collecta. Optima, ſed rarior eſt, quae pelliculis involuta, in maſſis coloris e ruffo fere nigri, Emplaſtri in modum ductilis, lentaque, gratiſſimi odoris, adfertur. Vulgaris in ſpiras contorta, cereorum inſtar dura eſt, e murino aut olivari pulla, arena nigra ſcatens. Eligatur ſabulo non nimium abundans, facile a manus calore molleſcens, ſpiritu vini maximam partem ſolubilis & fragrans.

MANNA. Manna. Manna.

Fraxini Orni, dum junior eſt, aut LACRYMA ſponte ſtillans, aut SUCCUS ex arbore vulnerata elicitus, gummoſo melleus, maximam partem e Calabria ac Sicilia advectus. Multa circa Mannam fraudulenter aguntur. Laudatur vulgo *Cannulata*

lata (*en Marons*), reliquisque jure praefertur; ſed in ipſa Mannae patria rarior eſt & pretioſa, & quae nobis ſub hoc titulo obtruditur, factititia eſſe ſolet, e Manna ſordida, exoleta, Amylo, Saccharo & Scammoneo in varias formas efficta. Ejusdem farinae venditur *Tabulata*, quae e variis compacta, non niſi pondere majore a ſincera dignoſcitur; & merito repudiatur. Rejiciatur itidem omnis Manna in glebis majoribus iisque ſordidis allata; nec non quae craſſitudinis melleae (*Manne graſſè*), aut impura eſt, pinguis, tenax, coloris ruffi, fuſci, (*Manne rouſſe*). Adulteratur enim variis ſupra dictis, melle, Glauberi Sale, variis ſuccis purgantibus, e Tithymali vel Eſulae ſpeciebus depromtis, quibus *Manna* imprimis *Brigantina* (*Manne de Briançon*) ſcatere dicitur, quae ſi ſincera, Lacryma eſt Laricis, Mannae aemula, virtutis laxantis. Eligatur autem, ſi non *Bombycina* alba, dura & in vermium figuram contorta, ſed rarior; certe *Maſtichina*, in granulis, lacrymis aut grumis majoribus, minoribusve (*Manne en larmes*), pallide lutei coloris, allata. Sit vero recens, diffracta pauxillum Mannae liquidae, Mellis inſtar, exſudans, levis, pura, parum pellucida, ab attactu in grumos minores diſſiliens, non tenax aut ſequax; ſaporis dulcis ſpecifici; ſuper lingua plane deliqueſcens. Sicco calidoque ſervetur loco; in humidis enim diffluit in tabum ingratum, inertem.

Mastix. Maſtix. Maſtir.

Piſtaciae Lentiſci cicuris & ferae, in Europa auſtrali & Archipelagi inſulis creſcentis, in Chio praecipue cultae, Lacruma, ex ſauciato cortice ſtillans, reſinoſa. Eligantur *Grana*, coloris albi, citrini, pellucida, fragrantia, ſplendentia. Dentibus tentata Maſtix fragilis eſt, cerae inſtar lenteſcit, & preſſione in paſtam compingitur. In terram ſtillans reſina ſordes con-

contrahit, unde his abundantes grumi, *Maſtix in ſortis* dicti, merito rejiciuntur, aut ſaltem puriora ex his fruſta ſtudioſe ſeliguntur. Suſpecta pariter eſt, quae in ſic dictis Panibus affertur, cum ex vulgari impura, Aqua bulliente, ut candidior fiat, ſoluta, compingatur. Addunt etiam verae Maſtichi, quam *Maſculam* incolae vocant, *Foemininam*, quae eſt lacryma *Piſtaciae verae* & *Terebinthi* opaca, viſcoſa, Terebinthinae non abſimilis. Haec cum vera Maſtiche confuſa, ſiccos externa ſpecie panes refert, qui vero diffracti, non perſpicuis particulis, viſcoſa indole, & mollitie fraudem patefaciunt.

MYRRHA. Mirre. Myrrhen.

Plantae nondum cognitae, in Aethiopia creſcentis GUMMI RESINA. Laudant *Stactem*, ſive ſponte exſudantem, quae vero rariſſime, ſi unquam, occurrit. Optima eſt quae in Granis ſive lacrymis affertur. Eligatur vero pura, fulva, aut e fulvo ferruginea, ſpiritu afflato magis rubeſcens, levis, fragilis, tactu pinguis, pellucidula, ſplendens, fracta ſtrias ſemicirculares, albas, caeſias exhibens, in ore omnis fere deliqueſcens; ſaporis multum amari, aromatici; odoris validi, ſpecifici, non adeo ingrati. Rejiciatur fuſca, nigra, tenax, tota reſinoſa, albicans, impura, & odore nauſeoſo praedita.

OLIBANUM. THUS. Wirog. Weihrauch.

Juniperi Thuriferae, ex Oriente vel Aegypto allata RESINA, ex albo ſublutea, ſemipellucida, dente tentata friabilis, dein lenta, ſequax, non tamen, uti Maſtix, in paſtam conglutinata; ſaporis amari, non ingrati; odoris fragrantis; ſuper igne non liqueſcens, ſed cum luculenta flamma deflagrans. Opacum, ruffum, impurum, ramentis corticoſis & quisquiliis intermixtum, rejiciatur. Adulteratur reſina Pini & Laricis, inprimis Lacryma *Pini Piceae*, quae *Thus vulgare* vocatur.

Eſt

Eſt vero haec coloris e flavo & ruffo variegati; ſaporis amari non adeo grati; & ſuper igne explorata Terebinthinam redolet.

Opium. Opium. Mohnsaft.

Papaveris orientalis Succus gummeo reſinoſus. Primaria ex inciſis Papaverum capitibus exſudans lacruma, verum Antiquorum Opium, *Affion* inquilinis dictum, ac ſolis calore in maſſulas obſcure fulvas ruffasque coactum, ad nos non pervenit. Affertur vero Succus poſthac expreſſus, aut e capitibus contuſis ecoctus, & ignis ope in maſſas majores inſpiſſatus, quem tamen ab admiſtis ſuccis heterogeneis, affinis inprimis *Glaucii* & *Papaveris corniculati*, (Chelidonii Glaucii & corniculati) non plane immunem eſſe perhibent. Forma glebae aut panis foliis involuti, externe fuſci, ſubinde pulli coloris, advehitur. *Thebaicum* vulgo expoſtulatur *Opium*; ſed perinde eſt, qua patria gaudeat, Aegypto, Perſia an Anatolia, quae prae reliquis eſt papaverifera; modo ſequentibus ſe commendet dotibus. Sit denſum, ponderoſum, coloris externe e fulvo, ruffo vel ſpadiceo fuſci, fractum particulis ſplendentibus micans, comminutum coloris fulvi, digito diutius tractatum pauxillum tenax, purum, odoris validi, tetri, viroſi; ſaporis amari, acris, fervoris aliquo ſenſu fauces adurentis; promte flammam concipiens; integre fere aqua ſolubile & rubicundam exhibens tincturam. Quod variis vegetabilium fragmentis, ſabulo & quisquiliis ſcatet, colorem obſolete pullum, aut e murino pullum exhibet, & odoris aduſti vel exigui eſt atque friabile, rejiciatur.

Opopanax. Panax=Gummi. Panax=Gummi.

Paſtinacae Opopanacis Gummi resina oppido rara, & pretioſa, in Syria, Boeotia & Macedonia proveniens, e granulis piſi magnitudinis externe ruffis, interne fulvis aut albi-

cantibus, parum viſcidis & fragilibus; ſaporis amaricantis, acris, ingrati; odoris gravis nauſeoſi, conſtans. Rejiciatur fuſcum, nigrum, durum, molle, multis quisquiliis intermixtum, in majoribus pollicis craſſitiei fruſtis allatum; in aqua non ſolubile & lacteſcens.

RESINA FLAVA. Guul Beeg. Gelb Harz. Kübel-Harz.

Pini ſylveſtris aut piceae LACRUMA, e ſauciato cortice deſtillans, coctione in Reſinam flavam, aut e cinereo variegatam, fragilem inſpiſſata. Seligatur nitide flava. Surrogatur merito in locum PICIS, quae eadem eſt Reſina, ſed ignis ope elicita, impurior, empyreumate & fuligine lignorum abietinorum contemerata. Neque a Reſina multum differt ſic dictum COLOPHONIUM, quod eſt Pix liquida, prima coctione in aridam, altera, aceto addito, in aridiſſimam, fragilem, e fuſco ruffam maſſam mutata. Vices pariter PICIS BURGUNDICAE abunde ſupplere poſſe videtur.

SAGAPENUM. Sagapen Gummi. Sagapen.

Ferulae cujusdam GUMMI RESINA, in Media, Perſia & aliis orientalibus regionibus proveniens. Eligatur granulatum, translucidum; foris fulvi aut ruffi coloris, intus dilutioris; ſaporis acris ad porrum accedentis. Rejiciantur glebae concretae & veluti fuſae; coloris obſcuri, ſordidi.

SAGU. Sago. Sago.

Cycadis circinalis, quae e Palmarum familia eſt, vel potius, ſecundum *Rumphium*, *Sagus* MEDULLA granulata, ſiccata.

SANDARACH. JUNIPERI. Enebær Gummi. Wachholder-Harz. Firniß.

Ju-

Juniperi vel *communis* vel *Oxycedri* Resina, ab ora Africae advecta. Eligantur grana pura, albicantia, ex albo citrina, ſplendida, pellucida, odoris grati, maſtichini.

Sanguis draconis. Drage-Blod. Drachen-Blut.

Dracaenae Resina, ex Indiis & Africae inſulis allata. Glebae oviformes, minores, arundine involutae (in lacrumis), majoribus difformibus praeferendae ſunt, quippe puriores magisque compactae. Eſt vero genuinus Sanguis Draconis aequaliter fragilis cum laevi utrinque ſuperficie, luci ſolis admotus ſubpellucidus, coloris obſcure badii, in pulvere eleganter kermeſini. Liqueſcit ſuper igne, & totus inflammabilis eſt cum odore paulum ſtoracino, nec niſi in Spiritu Vini ſolvitur. Sunt qui factitium Sanguinem Draconis *in tabulis* componunt, e variis Gummi-reſinis, ſanguine hirci aut pigmentis terreis confuſis, ligno Braſilienſi aut Draconis reſina tinctis, & Gummi Arabici ſuccedaneorum ope conglutinatis. Hic vero ex parte aqua ſolvitur, in igne ſcintillat & crepitat, flammam luculentam haud concipit, nec facile in ſubtilem teritur pulverem.

Sarcocolla. Kiobliim-Gummi. Fleiſchleim-Gummi.

Pineae Sarcocollae Granula gummosa, parva, ex albo ruffeſcentia, friabilia; ſaporis amaricantis, acris, ſubdulcis; odoris nullius, e Perſia allata. Eligatur recens, (vetuſta enim ruffeſcit), coloris pallidi, ſaporis amari, ſubſtantiae poroſae, glutinoſae.

Scammoneum. Scammonium. Scammonium.

Convolvuli Scammonei Succus gummoſo reſinoſus, ex Oriente allatus. Rejiciatur *Smyrnaeum*, e variis aliis Convolvuli ſpeciebus plantisque lacteſcentibus, Eſulae, Tithymali, Apocyni, Periplocae &c. ſobole coactum, impurius, gravius,

 nigri-

nigricans, non adeo friabile, parum olidum. Eligendum vero Scammoneum *Aleppense* levius, ſpongioſum, friabile; e gilvo aut murino pullum cum ſplendore aliquo; in pulverem redactum ex albo cinereum; aqua aut ſaliva ſolutum, ex obſolete viridi aut cumatili lacteſcens; odoris ingrati viroſi; ſaporis acris nauſeoſi. Sed neque hoc caſtum ſemper purumque, verum callidis artibus ita adulteratum adfertur, ut contracta labes cognoſci nequeat. Hoc ſolum ſcimus, nonnunquam interponi *Scammoneum Monſpeliacum* (*Cynanchi Monſpeliaci* ſuccum lacteſcentem, coctione inſpiſſatum), paulo gravius, magisque nigrum; ſed virtutis catharticae debilioris.

Senegal. Gummi arabicum, Arabiſk Gummi. Arabiſch Gummi.

Mimoſae Senegal, e Guinea & ora Nigritarum in fruſtis conſpicuae molis, foris aſperis, allatum Gummi, quod utpote minoris pretii, ejusdem tamen virtutis, in officinis proſtat loco *Gummi Arabici* (*Mimoſae* ſive *Akakiae* Aegyptiacae & *Arabicae*) pallide lutei, fragilis, fractum ſplendentis, pellucidi. Bdellii fruſtula, Senegal Gummi nonnunquam interpolata, odore ſe produnt.

Storax calamita. Storax. Storax.

Styracis officinalis Gummi resina, e Syria & vicinis locis allata, cujus optima ſpecies, arundine excepta, *Cannulata* vel *Calamita* dicta, rariſſime proſtat & valde pretioſa eſt. Noſtris in officinis vulgo illa tantum ſpecies occurrit, quae e lignorum ramentis ac ſerragine, Styracis ope conglutinatis conſtat, & *Scobs ſtoracina* dicitur, cui vero Styracis paucum ineſt, cum jam maximam partem expreſſa, pro conficienda *Storace granulata* ad nos perveniat. Pro uſu medico praeferenda Storax in granis ſive lacrumis albicantibus,

bus, luteis, rubentibus, variegatis, ſuaveolentibus, compagis denſae, in ore tenacibus pinguiusculis; ſaporis grati pungentis, in grumos vel maſſas e flavo rubroque fuſcas coalitis, nulla tamen ſerragine intertextis. *Storax liquida vera*, lacruma arboris nativa, ad nos non pervenit, ſed e Storace vino aut oleo ſoluta, cum Terebinthinae additione effingitur.

Tacamahaca. Hak og Tak. Hack und Tack.

Populi balſamiferae, Americae meridionalis ac ſeptentrionalis & Sibiriae indigenae, Lacruma reſinoſa, in putaminibus cucurbitarum collecta & advecta, coloris pallide lutei aut ſubruſſi, languide viridis ſeu olivaris. Sit recens, non dura & arida, ſed digito prementi cedens, tenax; odoris fragrantiſſimi, lavendulam ambramque ſpirantis, putaminibus ſupradictis contenta. Deterior eſt, & vix ulla virtute praedita, quae in grumis glebisque adfertur, aut quae fuſcum, e cinereo pullum colorem acquiſivit. Nonnunquam aliis reſinis, ut *Chibou*, quae ex *Amyridis* aliqua ſpecie deſtillat, interpolata offenditur. Datur & alia Tacamahaca spuria, e leguminoſo fructu *Fagarae octandrae* Linnaei, *Elaphrii tomentoſi* Jacquini, parata.

Tragacantha. Tragant. Dragant.

Aſtragali Tragacanthae ex Oriente, Graeciaeque inſulis advectum Gummi, vermiculorum inſtar contortum, purum, candidum. Rejiciatur flaveſcens, obſcurioris coloris, in maſſis impuris ſordidis allatum, ſuper lingua non deliqueſcens.

IX. SUCCI VEGETABILES LIQUIDI.

Acetum vini. Viinedike. Weineſſig.

E Vino, nova fermentatione, fermento acido addito, in regionibus viniferis paratur. Praeſtat limpidum, purum, acidum, gratum. Quod minori quam quadrageſima ſui parte ſalis alcalini ſaturatur, effoetum eſt. Admixtum acidum Vitrioli cognoſcitur, ſi librae uni Aceti ad unciam unam evaporatae, adjiciatur ſalis alcalini fixi in aqua uncia ſoluti, drachma una, & ad drachmas duas reſidui exhalent. Si cryſtalli inde natae Tartaro vitriolato aemulae fuerint, nec in ſpiritu vini ſolvantur, ſignum eſt commixti cum Aceto acidi vitriolici. Idem innoteſcet, ſi terrae calcareae in aceto forti ſolutio, aceto mangonii ſuſpecto, inſtillatur. Limpidum inde perſiſtit, quod purum eſt; lacteſcit vero, turbatur & ſedimentum album deponit, quod acidum vitriolicum admixtum habet.

Balsamus copahu, de copaiva. Copaiva=Balſam. Copaiva=Balſam.

Nondum definitae arboris, indigenis *Copayba* dictae, in America auſtrali germinantis, Lacruma oleoſo-reſinoſa. Praeſtat Balſamus limpidior dilutiorque, tum conſiſtentia, tum colore, fragrantior nec ingrate amarus, qui ſucceſſu temporis tenax evadit & craſſitudinem melleam adipiſcitur. Rejiciatur opacus, non tenax, ſubturbidus, gravi odore deſtitutus, cujus in fundo deprehenditur liquor aquoſus turbidus. Adulteratur Terebinthina, oleo expreſſo unguinoſo, uti Amygdalarum, nupta. Innoteſcit hoc partim e colore non adeo lacte aurantio, aut flaveſcente, parum opaco & ſubglauco, ſapore non adeo amaro, & odore minus fragrante; partim vero ex admixta Tinctura Tartari, a qua ſincerus Balſamus omnis fere ſolvitur, limpidusque evadit; oleo expreſſo vero adulteratus lacteſcit, turbidamque oſtendit mixturam.

Balsamus de mecha. Balſam fra Mecha. Balſam von Mecha.

Opobalſami Resina liquida, albicans aut leviter flaveſcens, odoris fragrantis, ad Citri odorem accedentis, ſaporis acris & aromatici. Rariſſime genuinus ad nos pervenit. Signum bonitatis eſt, ſi guttula ex duorum pollicum altitudine aquae inſtillata, in rotundam expanditur cuticulam, & colorem flaveſcentem in albicantem ſplendidum mutat. Cuticula haec poſt quadrantem horae adeo tenax evadit, ut cultri apice attolli poſſit.

Balsamus peruvianus niger. Peruvianſk Balſam. Peruvianiſcher Balſam.

Ex non deſcriptae arboris in America auſtrali creſcentis cortice, coctione paratus Succus oleoſo-reſinoſus. Albus enim, ſpontaneo exſudans ſtillicidio, vix ad nos pervenit. Sit e ſpadiceo nigricans, craſſitudinis melleae, ponderoſus; ſaporis acris, aromatici; odoris fragrantis, quaſi e Caryophyllis, Benzoë & Balſamo Tolutano confuſi; ſuper carbonibus gratum ſpargens odorem; opacus; inter digitos tractus fila ſubtilia pellucidula exhibens; frigidae guttatim inſtillatus, fundum petens; bullienti vero, in pelliculam oleoſam penetrantis ſaporis, aquae innatantem, & in partem graviorem, crudiorem, fundum petentem, dehiſcens. Chartae inſtillata gutta nigra manens & adhaerens, probi; rubicunda vero promteque defluens factitii ſignum eſſe dicitur. Olei, interveniente cera, commixtio cum Balſamo Peruviano, pateſcit ſuper ignem lenem, ubi quid balſami ſinceri ineſt, ſecedit & fundum petit. Conficitur etiam Balſamum ſpurium ex Populi gemmis cum oleo ſecundario Benzoës digeſtis. Mentitur hic Balſamus quidem veri odorem, ſed minus ſuavis eſt & validus. Alii Benzoës

partes

partes quatuor, ſtyracis unam, cum oleo coquunt & Aſphalto tingunt; quae fraus in alcohole Vini facile detegitur, in quo Balſamus verus omnis ſolvitur. Alii denique Benzoës oleo ſecundario & ſtyracis pauxillo, vilioris pretii Balſamum de Copahu admiſcent; quod ſi non ex odore, ſaltem experimento cum oleo Vitrioli inſtituto, quocum Balſamus Copahu commiſtus, agitatus, inſignem ebullitionem fumosque foetentes, cum colore rubicundo edit; Peruvianus vero ſine calore in mixturam rubicundiſſimam coccineam coit, pateſcit.

Betulae succus. Birkeſaft. Birkenwaſſer.

Betulae albae Lacruma, e vulnerato trunco aut ramis ſponte ſtillans. Eliciatur verno tempore, antequam frondeat arbor, & ſtudioſe vitris inditus, ſuperfuſo pauxillo olei Olivarum, contra aëris acceſſum defendatur.

Oleum behen. Behenolie. Behenöl.

Guilandinae Moringae e nucleis, *Balani Myrepſicae* dictis, expreſſum Oleum eleganter flavum, quod exiguo frigoris gradu figitur, omniumque difficillime ranceſcit. Quare tum ad defendendos ſuccos vegetabiles expreſſos, tum ad extrahendos ſuaves fragrantium, ut *Jasmini* aliorumque florum odores adhibetur. Nuclei ex Aegypto ad nos perveniunt.

Oleum bergamottae. Bergamot-Olie. Bergamot-Oel.

Citri medicae e ſpecie *Bergamotta* dicta, expreſſione elicitum Oleum eſſentiale, ex Italia advectum.

Oleum betulinum. Rusci. Brusci. Schwarzer Degen-Birkentheer.

Be-

Betulae albae e cortice exuſto per deſcenſum deſtillans Oleum empyreumaticum, e Lithuania maximam partem allatum, corium bubulum Ruſſicum (Juchten) redolens; qvo odore dignoſcitur a ſuppoſititio, e cortice Juniperi aliisque deſtillato.

Oleum Cajeput. Cajeput-Olie. Cajeput-Oel.

Cardamomi majoris ſiliquati, *Trevio* teſte, e granis Oleum eſſentiale, odoris Cardamomi, pellucidum, coloris laete virentis, ex India allatum.

Oleum de Cedro. Citron-Olie. Citronen-Oel.

Citri medicae e Fructibus Oleum eſſentiale, expreſſione aut deſtillatione obtentum, ex Italia allatum. Sit flavum, pellucidum, graveolens, non turbidum.

Oleum jasmini. Jasmin-Olie. Jesmin-Oel.

Jasmini officinalis Florum Oleum infuſum, aliunde ad nos perveniens. *Vid. Oleum Behen.*

Oleum juniperi. Enebær-Olie. Wachholder-Oel. Krummholtz-Oel.

Juniperi vulgaris e ligno & cortice deſtillatum Oleum, e ſylva Hercinia allatum, non raro Oleo Pini & Terebinthinae adulteratum. *Vid. Canones pro Oleis eſſentialibus in Parte II.*

Oleum laurinum. Lorbær-Olie. Lor-Oel.

Lauri nobilis e Baccis contuſis, affuſaque aqua coctis expreſſum Oleum, ex Italia, maximam vero partem e Gallia auſtrali allatum. Plerumque adipe ſuilla, Terebinthina & colore viridi (Saftgrün vocant) adulteratum ad nos pervenit.

Oleum lini. Liin-Olie. Lein-Oel.

Lini uſitatiſſimi Oleum expreſſum recens. *Vid. Pars II.*

OLEUM MOMORDICAE. Balsam-Aepfel-Oel.

Balsaminae momordicae Fructuum OLEUM infusum, ex Hollandia advectum.

OLEUM NUCIS MOSCHATAE. Muskat-Olie. Muscat-Oel.

Myristicae Drupae OLEUM expressum, ex Indiis allatum, fragrantissimum, consistentiae melleae; coloris ex aureo cinnamomei. Rejiciatur durum, pallide coloratum, non admodum fragrans, varia pinguedine interpolatum. *Vid. Pars II.*

OLEUM NUCUM JUGLANDIUM. Walnoot-Olie. Nuss-Oel.

Juglandis regiae Fructus OLEUM expressum recens, non rancidum.

OLEUM OLIVARUM. Bom-Olie. Baum-Oel.

Oleae Europaeae in Europa australi cultae, e fructibus expressum OLEUM. Praestat e Lusitania, Italia & Gallo-provincia allatum, ex albo leviter viridescens, sine amurca, absque sapore aut salso, aut rancido, & inodorum. Quod secunda obtinetur expressione, magis flavescit, & cum sordibus mucilaginosi quid praecipitat, unde facilius rancescit. Sunt, qui detestabilis lucri causa, olea Raparum aut Lini, ab ingrato & nidoroso odore additis praeparatis saturninis liberata, loco olei Olivarum vendunt. Tetra fraus detegitur commixto liquore vini probatorio, i. e. Auripigmenti Uncia, Calcis vivae Unciis duabus, Aqua pluvialis Unciis duodecim infusis & digestis, quae tinctura oleo, aut vino addita, illa quae plumbeis contaminata sunt praeparatis, fusco tingit colore.

OLEUM PALMAE. Palm-Olie. Palm-Oel.

Palmae

Palmae foliorum pediculis ſpinoſis, fructu pruniformi, luteo oleoſo, Sloane, OLEUM e nucleis fructuum expreſſum e Jamaica & Barbados inſulis advectum, ſpiſſum, coloris aurantii; odoris fortis non ingrati; ſaporis vix ullius. Rejiciatur album, vetuſtum.

OLEUM RAPARUM. Roe-Olie. Rüb-Oel.
Braſſicae Rapae OLEUM e ſeminibus expreſſum, recens, non rancidum.

OLEUM SPICAE. Spik-Olie. Spick-Oel.
Lavendulae Spicae OLEUM ſtillatitium, ex Hollandia allatum.

OLEUM TEREBINTHINAE. Terpentin-Olie. Terpentin-Oel.
Oleum Terebinthinae eſſentiale deſtillatione prolicitum, locum *Olei Templini* ſive *Pini* ſupplens. Non raro adulteratur oleo Pini, quod tum odore, tum experimentis cum concretis reſinoſis variis, uti Sandarach, Copal &c. quae non niſi in vero Terebinthinae oleo ſolvuntur, innoteſcit.

PIX LIQUIDA. Tiær. Theer.
E variis *Pini* ſpeciebus, lento tectoque igne concrematis, obtentum MAGMA, unctuoſum, ſalino-oleoſo-reſinoſum empyreumaticum, ex Norvagia, aut Suecia potiſſimum advectum.

SPIRITUS VINI. Brændeviin. Branntwein.
Spiritus inflammabilis deſtillatione e Vino, Vini faecibus, Cerealibus, Syrupo de Saccharo defluente &c. prolicitus. Ad tincturas aliaque medicamenta paranda, non niſi Spiritus Vini Gallicus, isque probe rectificatus, adhibeatur.

STYRAX LIQUIDA. Styrax-Balſam. Styrax-Balſam.

 Liqui-

Liquidambaris ſtyraciſluae LACRUMA reſinoſa, e nova Hiſpania & America ſeptentrionali advecta. Quod in Officinis Storacis liquidae titulo inſignitum proſtat, magma eſt factitium, e cinereo ſpadiceum, aut pullum, opacum unctuoſum, e Terebinthina, oleo vinoque compoſitum, cui Storacis ſiccae pauxillo addito, ambroſiacus hujus odor conciliatus fuit: Sincera & nativa Storax liquida antiquis celebrata, nunquam ad nos pervenit. Colligitur in maris rubri inſula Cobros, Moccamque adfertur, quo ipſo loco & rara eſt & praecara. Eſt vero pellucida, coloris rubelli, aut e murino fulvi, & valde fragrans. In hac genuinae Storacis inopia, Americana accipitur, limpida, coloris ad lucem aurei, & fragrantiſſima.

TEREBINTHINA. Terpentin. Terpentin.

Piſtaciae Terebinthin LACRUMA, coloris albi, ſplendidi, argentei, varie in ſubglaucum, flavum viridemque, pro varia verſus lucem collocatione mutabilis. *Cypria*, ſive *Chia* ſincera, gratioris magis amaritiei, tenacior, prunis inſperſa odorem ſpargens maſtichinum, rariſſime ad nos pervenit. Praefertur paulo opaca, craſſior, tenacior. Quae *Veneta* dicitur, ex America ſeptentrionali adfertur, aut in Germania auſtrali, Sabaudia, Helvetia, Delphinatu & vicinis colligitur locis, atque in utribus e pellibus hircinis conſutis ad nos pervenit. Sunt vero Terebinthinae duae ſpecies, *larigna* (*Pini Laricis*) Lerchen = Terpentin, & *abiegna* (*Pini Abietis*) Tannen = Terpentin, quae ſequentibus diſtinguuntur notis: abiegna limpidior eſt, & magis pellucida; larigna pallide magis flavet: abiegna non adeo tenax eſt; larigna ſaporis eſt acrioris, pungentis, ingrati, oleo tamen ditior: abiegnae ſapor magis amarus eſt, grate citrinus; odor gratior, citrum redolens, nec prunis injecta foetet uti larigna. Eſt autem abi-

abiegnae ſpecies, quam alii *Pini Balſamicae*, alii *Laricis Canadenſis* lacrumam eſſe perhibent, gratiſſima quidem Terebinthina, Britannis, Gallisque ſub titulo *Balſami Canadenſis*, ſive *de Gilead* uſitata. *Terebinthina communis* dicta (*Pini Taedae*) Föhrenfien-Terpentin, coloris fuſci, non adeo pellucida, ingrati odoris ac ſaporis, non raro etiam impura, pro uſibus medicis non adhibeatur.

VINUM. Viin. Wein.

Vitis viniferae ex uvis SUCCUS expreſſus, calore temperato fermentatus, & a faecibus decantatus. In Pharmacopoliis praeſto ſint: VINUM GALLICUM ALBUM vetuſtius; GALLICUM RUBRUM, lignis tinctoriis, aut Myrtilli baccis non imbutum; HISPANICUM nobilius; RHENANUM vetuſtius, gratum, non acidi crudique ſaporis. Syruporum aut mellis cum Vino commixtio noto cognoſcitur experimento, ubi vino repletum anguſtioris colli vitrum, ſuper vaſe aqua pleno invertitur, unde dulcem aqua nanciſcitur ſaporem. Rejiciantur pariter vina ſuffitu nimio ſulphurato temerata, quod tam odore, quam inſtillata ſolutione argenti in Aqua forti, unde ſubniger, aut fuſcus vino conciliatur color, pateſcit. Deleteria vero illa, a praeparatis ſaturninis, Bismutho, ipſoque Arſenico Vino inducta labes, detegitur, aut inſtillatis Vini binis unciis, Olei Vitrioli optimi guttis ſenis, unde lacteſcet & calcem in fundum demittet; aut immiſto liquore vini probatorio, ſub *Oleo Olivarum* deſcripto; aut addita denique Tinctura Sulphuris Hoffmanni, a quibus Vinum adulteratum nigricantem induit colorem.

X. *SALIA VEGETABILIA.*

CINERES CLAVELLATI. Pott-Aske. Pott-Asche.

Sal Alcali impurum, e crematis arboribus durioribus, Fagis inprimis paratum. Plerumque continent ſal medium, Tartari vitriolati, aut Salis marini aemulum. Quare nova in aqua frigida ſolutione, & filtratione & exſiccatione, ad Alcali purum obtinendum, indigent. Germanici Cineres, quo puriores ſunt, magisque albentes, levesque, (Perlaſche vocant,) eo purius largiuntur Alcali. Ad mechanicos vero uſus praeſtant Cineres Ruſſici, in maſſis grandibus, duris, obſcurioris coloris, non facile humidum ex aëre attrahentibus, allati, ob interpolata inter cremandum ſegmenta abiegna, acido vegetabili ſcatentes, & revera diverſum a vero Alcali ſal exhibentes.

FULIGO. Spejl. Soed. Ruß.

Concretum ſalino-oleoſum empyreumaticum e fumo lignorum combuſtorum.

SACCHARUM. Sukker. Zucker.

Sacchari officinalis SAL eſſentiale ex America allatum. Crudum, neque repetito depuratum *Thomaceum;* farinaceum, Puder-Sukker, Muſcovade; repetita ſolutione addito lixivio alcalino cryſtalliſatum: *Canarienſe* Fiin fiin; in grandiores denique cryſtallos redactum *Candum flavum*, Sukker-Candies, vocatur.

SACCHARUM LACTIS. Melk-Sukker. Milch-Zucker.

Seri, quod ſponte e lacte ſeceſſit, SAL eſſentiale, ex Helvetia plerumque allatum.

SAL ACETOSELLAE. Skovſyre-Salt. Sauerklee-Salz.

Oxa-

Oxalidis Acetosellae SAL essentiale acidum. Sincerum hoc sal aliunde advectum, pulverem exhibet non adeo subtilem, in lamellulas dispositum, ex albo gilvi, aut subfusci coloris. Saepius vero crystallis Tartari & acido vitrioli remixtum deprehenditur; quod ex saporis differentia, & solutione in aqua, quae admistas Tartari crystallos praecipitat, patescit.

SAPO ALICANTINUS. Spansk Saepe. Spanische Seife.

Ex Oleo Olivarum atque lixivio quod e binis Sodae; una calcis vivae partibus paratur, coctione inspissatus SAPO, maximam partem Massiliae confectus. Sit albicans, durus, levis, digitos pinguedine non inquinans, neque ingrato rancidoque odore corruptam pinguedinis adhibitae indolem prodens. Rejiciatur variegatus, nec unquam usibus internis inserviat, quippe Auripigmenti non exiguam quantitatem admistam habens. Praestat vero Sapo Alicantinus prae Veneto.

SODA HISPANICA. Sode. Sode. Glaß, Schmaltz. Asch-Saltz.

Sal ex Alcali vegetabili & minerali, cum aliqua salis communis portione constans, e Plantarum marinarum ac salsarum, *Chenopodii* inprimis *maritimi* ac *salsi*, *Salicorniae Europaeae*, *Salsolae Kali* ac *Sodae*, *Fucorum* etiam, praecipue *Fuci vesicularis* cineribus in foveam collectis, in quibus in massam duram, gryseam, glaucam coalescit, conflatum. Paratur in Aegypto, ora Africae, Hispania, Gallia, Italia, nec non in regno Astracan. *Alexandrina* non nisi ad Venetos perveniens, ad artem vitrariam adhibetur. Optima quae nobis adfertur, Alicantina est, & prae reliquis species illa, quae *de Berilla*, sive *la Bariglia* vocatur. Mediae bonitatis censetur *Carthaginensis*, ex Hispania advecta; obscurioris coloris, multum tamen Alicantinae postponenda. Vilior omnium est,

ideo-

ideoque rejicienda, quae ex aliis regionibus adfertur, inprimis ea, quae *de Bourdine*, aut *de Barech* vocatur; Saponariorum magis quam Medicorum accommodata. Proba autem Alicantina sit dura, sicca, tinniens, multis foraminibus conspicua, coloris e gryseo glauci, particulis parvis albentibus, majoribus nigricantibus remixta. Sodae frustulum saliva madefactum, odorem spargat violaceum & parum urinosum volatilem. Adfertur etiam genuina Alicantina in frustis minoribus, silicum magnitudinis, *Cailloti* vocatis. Quae vero in doliis junco involuta divenditur, plerumque vilior est. Rejiciatur humida, pinguis, facile in aëre madescens; capillis & sabulo scatens; e nigro virescens aut albicans; madefacta ingratum, uliginosum & paludosum foetorem edens; saporem eumdem, aut salsum non lixiviosum linguae inprimens; cum acidis haud promte effervescens, & foraminibus non conspicua.

TARTARUS. Viinsteen. Weinstein.

Sal essentiale Musti, fermentationem vinosam experti. Tartarus *crudus* albus est aut ruber. Praestat e Rhenano Vino albus, plus salis continens. Sit autem purus, ponderosus, solidus, non spongiosus, externe crystallis multis puris resplendens. Crystalli Tartari secundum regulas in Parte II. praescriptas parandae, non aliunde arcessendae sunt. His enim saepius aut Alumen admistum est, aut Nitrum. Prius addito Gallarum infuso, unde pulvis albus praecipitatur; posterius detonatione detegitur.

III.



III.

E REGNO ANIMALI.

I. TERRAE ANIMALES.

CANCRORUM LAPIDES, five OCULI. Krebs=Steene. Krebs = Augen.

Cancri macrouri, roſtro ſupra ſerrato, baſi utrinqve dente ſimplici LAPIDES, ventriculo accreti, e lamellis ſibi ſuperincumbentibus vel ſtriis compoſiti; qua nota ab adulteratis, factitiisque dignoſcuntur.

CERVI CORNU. Hiorte=Takke. Hirſch=Horn.
Cervi elaphi CORNU.

CONCHAE. Musling=Skaller. Muſchel=Schaalen.
Vermium teſtaceorum bivalvium TEGMENTA calcarea.

CORALLIA ALBA. Hvide Coraller. Weiſſe Corallen.
Madrepora oculata in mari Siculo, ac Tyrrheno habitans.

CORALLIA RUBRA. Rode=Coraller. Rothe Corallen.
Madrepora rubra, ſtellis parvis, obſoletis, lateralibus. Lithophytum in mari Numidico reperiundum. Eligatur pulchre rubens, a ſordibus liberum.

O MATER

MATER PERLARUM. Perle=Moer. Perle=Mutter.

Oſtreae Ephippii TESTA, in mari Aſiatico reperiunda.

OSTREARUM TESTAE. Østers=Skaller. Auſtern=Schaalen.

Oſtreae edulis TESTAE ad calcem parandam.

SEPIAE OS. Fiſke=Been. Fiſch=Bein.

Sepiae octopodae Os dorſale corneum.

II. *VERMES ET INSECTA.*

CANTHARIDES. Spanſke=Fluer. Spaniſche Fliegen.

Meloë veſicatorius, in regionibus calidioribus, Hiſpania, Gallia, Germania &c. abundans; Fraxinum, Liguſtrum, Populum albam, Sambucum, praecipue amans. Praeferuntur minores, recentes, integrae non pulverulentae.

COCCINELLA. Carmeſin=Orm. Cuzzinell.

In *Cocci cacti coccinelliferi* Surculis collecta INSECTA, certa encheireſi in grana abeuntia. Advehuntur e nova Hiſpania, & regno Mexicano. Sint integra, granulata, externe albicantia; trita vero purpurea, ponderoſa.

FORMICAE. Myrer. Ameiſen.

Formicae ruffae.

GALLAE. Galdæbler. Galläpfel.

Cynipis Quercus a puncturis inſectorum natae EXCRESCENTIAE fungoſae, ex Aleppo & Smyrna allatae.

HIRU-

HIRUDO. Blodigel. Blutigel.

Hirudo medicinalis depreſſa, fuſca, lineis flavis dorſalibus ſex, intermediis immaculatis, ſubtus cinerea, nigro-maculata.

KERMES. Kermeskorn. Carmoſin- oder Scharlachbeern.

Cocci quercus cocciferae EXCRESCENTIAE, a puncturis & depoſitione ovulorum inſecti cujusdam natae, ex Monſpelienſi agro advectae. Eligantur grana e rubicundo fuſca, integra.

LUMBRICUS. Jordmaddik. Regenwurm.

Lumbricus terreſtris.

MILLEPEDES. Kielderorm. Eſelorm. Kellereſel. Mauereſel.

Oniſci Aſelli.

MUSCUS CORALLINUS. Strand-Moes. Corallen-Moos.

Corallina officinalis trichotoma. ZOOPHYTON in Oceano Europaeo habitans, integrum, ſabulo & conchis variis non remixtum.

SCARABAEUS UNCTUOSUS MAJALIS.

Meloë Proſcarabaeus, apterus, corpore violaceo, in apricis campis habitans, vivus melli immerſus.

SCORPIO. Scorpion. Scorpion.

Scorpio Europaeus, pectinibus octodecim dentatis, manibus ungulatis, pro Scorpionum oleo parando.

SPONGIA. Svampe. Schwamm.

Spongia officinalis. ZOOPHYTON in mari mediterraneo magna quantitate reperiundum, album, foraminibus exiguis pervium, leve.

STINCUS MARINUS. Soe-Stintz. Meer-Stinkz.
Lacertis simile ANIMAL, cum dorso latiore, magis glabro, in Nilo fluvio & mari rubro degens.

VIPERA. Odderslange. Viper.
Coluber Vipera ex Italia advecta.

III. SUCCI ANIMALES ARIDI ET FLUIDI.

AXUNGIA CANIS. Hunde-Fitt. Hunds-Schmaltz.
Canis familiaris PINGUEDO eliquata recens.

AXUNGIA LEPORIS. Hare-Fitt. Hasen-Fett.
Leporis timidi PINGUEDO recens.

AXUNGIA LUCII PISCIS. Giedde-Fitt. Hecht-Schmaltz.
Esocis Lucii PINGUEDO recens.

AXUNGIA PORCI. Svine-Fitt. Schwein-Schmaltz.
Suis scrofae PINGUEDO recens.

AXUNGIA VIPERAE. Odderslange-Fitt. Vipern-Schmaltz.
Colubri Viperae PINGUEDO recens.

AXUNGIA URSI. Biorne-Fitt. Bären-Schmaltz.
Ursi PINGUEDO recens.

CASTOREUM. Bevergeel. Biebergeil.
HUMOR pinguis, oleaginosus, in folliculis propriis, juxta anum *Castoris*, *Fiber* dicti, secretus. Aestumatur Dantisca-

tiſcanum, Pruſſicum, Polonicum, durum, ponderoſum, ruſſum, tenuibus membranulis intermixtum; odoris penetrantis ingrati, ſaporis amari ſubnauſeoſi. Inferioris quidem notae, ſed bonum ſatis eſt Caſtoreum Ruſſicum, ut & Anglicum ex America allatum, ſiccius, minus fortis odoris, minoribus magisque nigris contentum ſacculis. Saepe etiam corrumpitur Ammoniaco, Sagapeno, arenis, melle; odore & ſapore fraus detegitur.

CERA. Vox. Wachs.

Apis melliferae e florum ſtaminibus & nectariis collecta & elaborata SUBSTANTIA GLUTINOSA, ex favis, expreſſo prius omni melle, igne liquatis, adjecta aqua lotis, & in panes fuſis, parata, ſub *Cerae flavae* nomine, quae repetita ad ignem fuſione purificata, lota, aëre, ſole, aliisque artificiis dealbata *Ceram albam* exhibet.

CERVI SEBUM. Hiorte-Tælle. Hirſch-Talg.

Cervi elaphi PINGUEDO eliquata recens.

CETI SPERMA. Hvalraff. Wallrath.

Phyſeteris Macrocephali e ventriculis cerebri LIQUOR UNCTUOSUS, coctione aridus redditus. Eligatur album, dulce, recens. Flavum rancidum eſt.

FEL LUCII PISCIS. Giedde-Galde. Hecht-Galle.

Eſocis Lucii BILIS inſpiſſata.

FEL TAURI. Oxe-Galde. Ochſen-Galle.

Bovis Tauri BILIS ad inſpiſſandum.

GUMMI LACCAE. Gummi-Lak. Gummi-Lac.

Gummireſina ceracea, a formicis volantibus Indiae ex arboribus collecta; accenſa odorem primo gratum, dein foe-

 tidum,

tidum, animalis ſubſtantiae ſpargens, colorem rubrum a Chryſalidum exuviis adipiſcens. Quae *Lacca in Granis* dicitur, deterior eſt tota, & inſecto orba. Ejusdem cenſus eſt *Lacca in Tabulis*, e granulata fuſa & a faecibus purgata confecta, e flavo rubens, pellucida & fragmentis Vitri Antimonii ſimilis: Praeſtat LACCA IN BACULIS, ſive in ramulis, ſubamara adſtringens, ſalivam colore purpureo tingens.

HIRCI SANGUIS. Bukke-Blod. Bocks-Blut.

Caprae Hirci, herbis vulnerariis per tempus paſti & mactati, SANGUIS in clibano ſiccatus.

HIRCI SEBUM. Bukke-Tælle. Bocks-Talg.

Caprae Hirci PINGUEDO recens.

ICHTHYOCOLLA. COLLA PISCIUM. Huus-Blas. Haus-Blaſen.

EX *Acipenſeris Huſonis* pinnis, inteſtinis, corio excoctum GLUTEN, quod refrigeratum in pelliculas deductum & in ſpiras contortum proſtat. Advehitur maximam partem ex Moſcovia. Eligatur alba, ponderoſa, ſolida, facile ac tota diſſolubilis.

MEL. Honning. Honig.

Apis melliferae e nectare & polline florum PRODUCTUM reſinoſo-mucilaginoſum, ſpiſſioris conſiſtentiae; ſaporis dulciſſimi; odoris grati; coloris vel albicantis, vel pallide flaventis; vel etiam ſaturatioris. Praeter plantarum, ex quibus mel colligitur,

tur, diverſitatem, unde ſalubritas, odoris ſaporisque differentia pendent, adhuc magnum ratione coloris, conſiſtentiae, puritatis, bonitatis diſcrimen patitur. Optimum eſt Virgineum, Jomfrue-Honning, Jungfern-Honig, nulla adhibita arte ex favis diffractis, craticulae impoſitis, defluxum. Delicatius deprehenditur Mel Narbonense, ubi Rosmarinus, aliaeque nobiliores plantae occurrunt. Deterius eſt *expreſſum*, ceram redolens; deterrimum elutum, coctum. Adulteratum farina magis albidum eſt, vix odorum, glutinoſum. Conſiſtentia, color, odor, ſapor, aliarum fraudum criteria ſunt. Mel despumatum, Klaret Honning, geläuterter Honig, in vaſe fictili, moderato calore, lente parandum eſt.

Moschus. Desmer. Biſam.

Substantia unctuosa, ambroſiaca, e folliculis prope umbilicum *Moſchi moſchiferi* collecta. Optimus ſed rarus eſt *Tunquinius;* Ordine bonitatis ſuccedit ex *Bengalia* & *Agria* allatus; peſſimus eſt *Moſcoviticus.* Optima Moſchi ſpecies affertur in veſicis tenuibus, rotundis, magnitudinis ovi columbini, crinibus ruffis brevibus tectis, integre repletis. Muſcus ipſe ſiccus eſt, parum unctuoſus, obſcure rubri, ruffi aut e ferrugineo nigricantis coloris; in parvis rotundis granis, perpaucis duris nigris fruſtulis intermixtus, ſine ulla, aut ſabuli, aut aliarum ſubſtantiarum admiſtione. Manducata aut cultro abraſa fruſtula, particulis quaſi reſinoſis micantia, flaveſcunt; ſaporem amaricantem odoremque fragrantem produnt; & laminae candenti impoſita tota evaporant, relicto ci-

neris

neris gryſei pauxillo. Adulteratus enim eſt Moſchus, qui aliquid carbonis inſtar aduſtum relinquit.

Sal Ammoniacus. Salmiac. Salmiac.

Sal e fuligine ſtercorum animalium concrematorum, ex acido ſalis ſalſi & alcali urinoſo conflatus. Ex Aegypto advehitur; nunc vero Brunsvigae etiam non ſecus ac in Scotia paratur, & forma conorum, inſtar ſacchari adfertur. Eligatur candidum & purum, quod addito ſale alcali ſtatim odorem ſalis volatilis ſpargit.

PARS II.

COMPOSITA
ET
PRAEPARATA.



COMPOSITA ET PRAEPARATA.

ACETUM BEZOARDICUM.

Recipe. Radicum Petaſitidis,
Valerianae,
Angelicae ana drachmas ſex,
Zedoariae ſemunciam,
Foliorum Rutae,
Salviae,
Scordii ana unciam unam,
Florum Lavendulae,
Roſarum rubrarum ana ſemunciam,

Baccarum Juniperi uncias duas,
Flavedinis Corticum Citri unciam unam,
Myrrhae electae drachmas duas.

Incisis & contusis affundantur
Aceti Vini optimi non destillati librae quatuor.

Relinquantur leni digestioni, donec Acetum probe fuerit impraegnatum.

Colaturae filtratae, si placet, addi poterit
Camphorae Spiritu Vini solutae semuncia.

ACETUM LITHARGYRII.

R. Lithargyrii subtiliter triti libram unam,
Aceti Vini optimi libras tres.

In vase figulino probe vitreato coquantur lento igne ad dimidiae partis consumtionem, sub continua cum spatula lignea agitatione. Acetum saturatum per chartam filtretur.

ACETUM ROSARUM.

R. Rosarum rubrarum siccarum unciam unam,
Aceti Vini optimi uncias octo.

In vase vitreo bene obturato per duas, aut tres septimanas solis calori exponantur, postea colentur & fortiter exprimantur.

ACETUM RUTAE.

Paretur e Foliis siccis, perinde ac Acetum Rosarum.

ACETUM SAMBUCI.

Paretur e Floribus recenter siccatis, eodem modo ac Acetum Rosarum.

ACETUM SCILLITICUM.

R. Scillae praeparatae & ſiccatae uncias octo.
Minutim inciſis affundantur
Aceti Vini albi acerrimi librae octo.
Per plures dies macerata colentur.

ACETUM VINI CONCENTRATUM.

Hyeme Acetum in vaſe terreo, vel ligneo, intenſo exponatur frigori, donec forte tertia, vel quarta pars congelaverit. Quod ſupereſt fluidi in medio contenti, perfracta glacie effuſum, deſtillationi e Retorta vitrea ſubjiciatur.

ACETUM VINI DESTILLATUM.

R. Aceti Vini fortis quantum libet.
Deſtilletur e Retorta magna vitrea lento igne. Prodit primo Phlegma, quod abjiciendum. Quod ſequitur, Acetum eſt. Continuetur deſtillatio, donec e duodecim, vel quindecim libris vix ſeſquilibra ſuperſit; ne Aceto ad ſiccitatem abſtracto empyrevma contrahatur. Quod ſi, ad majorem Aceti quantitatem obtinendam, e Cucurbita cuprea fiat deſtillatio, Alembicus Veſicae collum tegens, vitreus ſit, non cupreus.

AES VIRIDE CRYSTALLISATUM.

Vid. FLORES VIRIDIS AERIS.

AES USTUM.

R. Cupri in laminas redacti quantum libet.

In Crucibulo probe ignito fiat cum Sulphure communi ſtratum ſuper ſtratum, & calcinentur, donec laminae friabiles reddantur, quae in pulverem terantur.

AETHIOPS ANTIMONIALIS.

R. Antimonii crudi puriſſimi, ſuper porphyritem triti unciam unam,
Mercurii vivi puriſſimi ſemunciam.
Terantur exactiſſime, donec omnes globuli mercuriales evanuerint.

AETHIOPS MINERALIS.

R. Mercurii vivi puriſſimi,
Florum Sulphuris ana partes aequales.
Miſceantur intime in mortario vitreo, vel lapideo, cum piſtillo vitreo, lapideo, aut ligneo mundo, donec Mercurius diſparuerit.

AETHIOPS SULPHURIS ANTIMONII.

Vid. Pulvis Alterans.

ALOE DEPURATA.

R. Aloës ſuccotrinae libram unam.
Solvatur in
Aquae fontanae calidae libris quinque,
Succi Citri depurati unciis ſex.
Committatur ſolutio vaſi vitreo per unum alterumque diem, ut reſinoſa ſubſtantia cum faecibus fundum petat. Tunc clarum a ſpiſſo per decantationem atque colationem ſeparatum, lento igne ad extracti conſiſtentiam evaporet.

ALU-

ALUMEN USTUM.

R. Aluminis crudi quantum volueris.

Calcinetur in olla fictili nova, donec totum efferbuerit, neque amplius ſpumam emittat, ſed leve atque poroſum evaſerit.

ANIMA RHABARBARI.

Vid. Tinctura Rhabarbari.

ANTIMONIUM CRUDUM PRAEPARATUM.

Antimonium Hungaricum in mortario ferreo tritum laevigetur ſuper porphyritem, donec particulae micantes disparuerint. Dein cum multa Aqua permiſceatur ac agitetur; quae turbata decantetur & vaſi idoneo committatur. Superſtiti materiae iterum affundatur aqua, quae nova tritura etiam turbida facta, priori addatur. Atque ſic omni materia alcoholiſata exhauſta, aquae illae denuo decantentur, & Antimonium fundum petens exſiccetur.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

R. Antimonii crudi praeparati libram unam,
Nitri depurati ſicci libras tres.

Exacte mixta, in pulverem trita & per cribrum trajecta, ſucceſſive, mediante cochleari ferreo, immittantur crucibulo capaci ignito, & agitando detonent, cavendo ne quidquam pulveris carbonum incidat in crucibulum. Peracta detonatione Flores Antimonii lateribus crucibuli adhaerentes, ſollicite ſpatulae ope ſeparentur. His factis maſſa adhuc mollis, cochlearis ferrei ope caute, ne a floribus inquinetur, e

cruci-

crucibulo exhaufta, laminae metallicae impofita & frigefacta, aquae injiciatur, ubi in pulverem fatifcit, qui fundum petens, copiofa Aqua affufa diluatur, ut commovendo fubtilior pars cum ea decantari poffit, quae edulcorata atque ficcata ufui fervetur.

Nota. De ANTIMONIO DIAPHORETICO NON EDULCORATO, fi defideretur, hoc obfervandum, quod & faepius recens parandum fit, & in vafe vitreo bene obturato fervandum, ne temporis mora, aut humiditatem contrahat, aut acrimoniam.

ANTIMONII BUTYRUM atque CINNABARIS.

R. Mercurii fublimati corrofivi libras tres,
Antimonii Hungarici electi libram unam.

Seorfim primum in pulverem redacta, exactiffima tritura commifceantur in mortario lapideo, vel vitreo, cavendo a vaporibus exhalantibus. Immittantur Retortae vitreae lati brevisque colli, cujus tertia faltem pars vacua remaneat. Adaptato ac lutato recipiente, primum lenis, tum fortior ignis adminiftretur gradus, donec liquor, retortae collo glaciei inftar adhaerens, penitus expulfus fuerit, qui nimium concrefcens, collique oppilationem minitans, pruna interdum caute admota liquefactus, in vas recipiens propellatur. Quamprimum vero vapores rubri adfcendunt, recipiens mutetur. Tum juncturis non lutatis, fortiffimus adhibeatur ignis, ut CINNABARIS ad latera Retortae fublimetur, compactaque adhaereat, quae omnibus refrigeratis, fracta Retorta a fordibus feparetur, in pulverem teratur, aqua abluatur, atque iterum ficcata, fublimatione rectificetur.

Buty-

Butyrum ſeorſim ſervandum, repetita rectificatione liquorem praebet limpidum, ab aëris acceſſu probe arcendum.

ANTIMONII VITRUM.

R. Antimonii in pulverem triti quantum libet.

In patina terrea non vitreata leni igne calcinetur, ſub jugi cum tenui piſtillo vitreo agitatione, ne grumeſcat Maſſa. Calcinatio vero protrahatur, donec aſſurgere fumi deſinant. Quodſi in grumos abierit maſſa, denuo in pulverem redigatur & calcinetur, usque dum in calcem gryſei coloris, ſulphur non redolentem, mutata fuerit. Haec fortiſſimo igne in crucibulo fundatur, ac pauxillo Antimonii crudi maſſae difficulter fluenti adjecto, in patinam effundatur, colorem pellucide hyacinthinum exhibens.

ANTIMONII VITRUM CERATUM.

R. Cerae flavae drachmam unam.

In vaſe ferreo liquefactae injiciatur

Vitri Antimonii in pulverem triti uncia una.

Detineantur ſuper lenem ignem ad horam dimidiam, ſpatula aſſidue agitando. Dein effundatur materia in chartam, atque frigefacta in pulverem redigatur.

AQUAE DESTILLATAE.

CANONES.

1. HERBAE Floresque, quorum virtutes facile exhalant, recentes ſint atque integri. Huc referimus *Acaciae* Flores, *Hyſſopum*, *Majoranam*, *Mentham piperitidem*, *Pulegium*, *Sambucum*, *Scordium*, *Tiliae* Flores.

Q 2. VE-

2. Vegetabilia, quorum virtutes non adeo facile avolant, in umbra ficcata atque concifa adhibentur. Huc pertinent *Chamomilla Romana*, *Lavendula*, *Mentha crifpa Meliffa*, *Ruta*, *Salvia*.

3. Quaedam praeftat addito fale macerationi fubjicere, uti Flores *Naphae* & *Rofarum*.

4. Affundatur Aquae fontanae fextupla quantitas. Octupla & major requiritur pro ficcioribus. Deftillatio fiat e Vefica cuprea, ftanno probe obducta, alembico ftanneo munita, atque lutatis optime juncturis protrahatur, quamdiu Aqua fapida, aut odora prodit, cavendo ab empyrevmate.

5. Olei guttulae, quae fupernatant, diligenter abftrahantur.

6. Quae ad Aquas compofitas adhibentur Vegetabilia, macerationi prius fubjiciantur. Brevior haec requiritur pro fucculentis atque principio volatili praeditis; diuturnior pro ficcioribus.

7. Facta maceratione, affundatur Aquae quantum ad praecavendam empyrevma fufficit, ea proportione, ut dimidium Aquae ad Spiritum Vini adhibeatur.

8. Quae Oleum effentiale ponderofius continent ingredientia, debilius requirunt menftruum, uti Spiritum Vini Aqua temperatum. Ubi Spiritus Vini Gallicus praefcribitur, crudus intelligitur.

Ex magno Aquarum fimplicium numero fervantur fequentes.

AQUA

AQUA ACACIAE FLORUM.

R. Florum Acaciae recentium libras octo,
Aquae fontanae libras quadraginta octo.
Leni destillatione protrahantur Aquae stillatitiae librae viginti quatuor.

Eadem norma inservit pro

Aqua Hyssopi.
Majoranae.
Menthae piperitidis.
Pulegii.
Sambuci florum.
Scordii.
Tiliae florum.

AQUA CHAMOMILLAE FLORUM.

R. Florum Chamomillae Romanae in umbra siccatorum & incisorum libras octo,
Aquae fontanae libras septuaginta duas.
Leni destillatione proliciantur librae quadraginta quatuor.

Eadem ratione destillantur.

Aqua Lavendulae Florum.
Melissae.
Menthae crispae.
Rutae.
Salviae.

AQUA ROSARUM.

R. Florum Rosarum sale conditorum libras duodecim,
Aquae fontanae libras quadraginta octo.
Leni destillatione proliciantur librae viginti quatuor.

Eadem norma inſervit pro
Aqua Naphae Florum.
Quae e Corticibus, Fructibus ac Seminibus deſtillantur, ſeorſim infra deſcribuntur.

AQUA ANHALTINA.

R. Maſtichis uncias duas,
Herbae Rosmarini uncias tres,
Rutae,
Seminis Anethi ana ſescunciam,
Spiritus Vini Gallici libras quinque.
Deſtillentur inde librae tres, quibus addantur
Olei Terebinthinae unciae duae.

AQUA ANISI.

R. Seminis Aniſi ſtellati libram unam.
Minutiſſime contuſa macerentur per noctem in
Aquae fontanae libris novem.
Mane deſtillentur inde librae ſex.

AQUA ANTHOS VINOSA.

R. Florum Rosmarini uncias ſex,
Spiritus Vini Gallici,
Aquae fontanae ana libras quatuor.
Facta infuſione deſtillentur librae quatuor.

AQUA AROMATICA.

R. Cinnamomi uncias duas,
Flavedinis Corticum Citri,
Seminis Angelicae ana unciam unam,

Macis

Macis ſemunciam,
Menthae piperitidis uncias tres,
Spiritus Vini Gallici libras duodecim.
Deſtillatione inde eliciantur librae octo.

AQUA AURANTIORUM CORTICUM.

R. Flavedinis Corticum Aurantiorum ſiccatae libram unam,
Aquae fontanae libras novem.
Deſtillentur inde librae ſex.

AQUA BENEDICTA RULANDI.

R. Croci Metallorum in pulverem triti unciam unam,
Vini Rhenani uncias viginti quatuor.
Per diem noctemque digeſta filtrentur per chartam.

AQUA CALCIS VIVAE.

R. Calcis vivae libram unam,
Aquae fontanae libras octo.
Agitentur ſubinde, & ſubſidente Calce liquor clarus effundatur.

Nota. Quae ad uſum internum adhibetur, ex Teſtis Oſtrearum recenter calcinatis paranda eſt.

AQUA CARMELITANA.

R. Foliorum Meliſſae recentium ſesquilibram,
Flavedinis Corticum Citri recentis uncias quatuor,
Nucis moſchatae,

Seminis Coriandri ana uncias duas,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi acuti ana unciam unam,
Incifis & contufis affundantur
Spiritus Vini rectificati librae fex,
Aquae Meliffae librae tres.
Digerantur per triduum: dein deftillatione proliciantur librae fex.

AQUA CERASORUM.

R. Cerasorum nigrorum recentium libram unam.
In mortario lapideo cum nucleis probe contufa relinquantur per noctem; mane addantur
Aquae fontanae librae fex.
Deftillentur inde librae quatuor.

AQUA CINNAMOMI SIMPLEX.

R. Cinnamomi acuti libram unam,
Aquae fontanae libras novem.
Macerentur per diem unum, aut alterum: dein deftillentur inde librae fex.

AQUA CINNAMOMI VINOSA.

R. Aquae Cinnamomi fimplicis,
Spiritus Vini, ana partes aequales.
Mifceantur.

AQUA CITRI CORTICUM.

Paratur ut *Aqua Aurantiorum Corticum.*

AQUA ſive BALSAMUM EMBRYONUM.

R. Radicum Galangae,
Zedoariae ana ſemunciam,
Herbae Menthae,
Meliſſae ana unciam unam,
Florum Stoechadis Arabicae drachmas quinque,
Seminis Sileris montani,
Foeniculi Cretici ana ſemunciam,
Nucum moſchatarum unciam unam,
Cinnamomi drachmas ſex,
Corticum Aurantiorum recentium,
Citri recentium ana ſemunciam.
Inciſa & contuſa infundantur
Vini albi libris decem.

Poſt digeſtionem viginti quatuor horarum, deſtillatione proliciantur librae quinque.

AQUA FOENICULI SEMINIS.

Paratur ut *Aqua Aniſi.*

AQUA FORTIS.

R. Vitrioli Goslarienſis ad flavedinem calcinati & ſiccati,
Nitri depurati ana libras quatuor.

Probe mixta deſtillentur e retorta capaci, commiſſuris clauſis, igne reverberii gradatim adhibito, in vas recipiens amplum, cui Aquae fontanae librae duae infuſae ſint.

AQUA FRAGORUM.

R. Fragorum recentium libras octo,
In mortario lapideo contuſis affundatur

Vini

Vini albi Gallici libra una.
Per biduum maceratis addantur
Aquae fontanae librae viginti.
Leni igne destillentur inde librae duodecim.

AQUA HUNGARICA.

R. Florum Anthos libram unam,
Lavendulae uncias quatuor,
Spiritus Vini Gallici libras sex.
Infundantur per noctem, & destillentur inde librae tres.

* AQUA LAXATIVA.

R. Foliorum Sennae electorum sescunciam,
Passularum minorum drachmas sex,
Seminis Coriandri drachmas duas,
Tartari solubilis drachmas quinque.
Incisa & contusa infundantur
Aquae fontanae bullientis unciis viginti quatuor.
Per aliquot horas digesta bulliant leniter ad colaturae expressae uncias quatuordecim, in qua solvantur
Mannae Calabrinae unciae quinque.
Iterum colentur.

AQUA MELISSAE COMPOSITA.

Vid. Aqua Carmelitana.

AQUA OPHTHALMICA ALBA.

R. Aquae Rosarum libram unam,
Vitrioli albi drachmam unam,

Sacchari

Sacchari Saturni ſemidrachmam,
Camphorae Spiritu Vini ſolutae ſcrupulum unum.
Miſceantur.

AQUA OPHTHALMICA COERULEA.

R. Aquae Calcis vivae libram unam,
Salis Ammoniaci drachmam unam,
Florum Viridis Aeris grana quinque.
Solvantur.

AQUA PETROSELINI SEMINIS.

Paratur ut *Aqua Aniſi.*

AQUA PHAGAEDAENICA.

R. Aquae Calcis vivae libram unam,
Mercurii ſublimati corroſivi ſemidrachmam.
Solvantur.

AQUA REGIA.

R. Aquae fortis uncias quatuor,
Salis Ammoniaci puriſſimi in pulverem triti unciam unam.
Digerantur ad ſolutionem.

AQUA RUBI IDAEI FRUCTUS.

Paratur ut *Aqua Fragorum.*

AQUA SCLOPETARIA, ſive VULNERARIA.

R. Foliorum recentium Agrimoniae,
Betonicae,
Salviae ana uncias octo,
Tanaceti,
Foeniculi,
Hyſſopi,
Menthae ana uncias ſex,
Rosmarini,
Scordii,
Majoranae,
Florum Lavendulae,
Millefolii ana uncias quatuor.
Inciſis affundantur
Vini generoſi librae viginti quinque.
Per biduum digeſta, deſtillentur lento igne ex Veſica ad dimidias.
Nota. Si *Spirituoſa* deſideretur, loco Vini, eadem quantitas Spiritus Vini Gallici adhibenda eſt.

AQUA STYPTICA.

R. Aluminis rupei,
Vitrioli coerulei ana uncias tres,
Aquae fontanae libras duas.
Coquantur ad ſolutionem: liquori filtrato addantur
Olei Vitrioli Anglici drachmae duae.

ARCANUM DUPLICATUM.

R. Caput mortuum Aquae fortis e Vitriolo & Nitro paratae.
Affu-

Affuſione Aquae bullientis copioſae extrahatur inde omnis ſalſedo. Solutiones confuſae quieſcant, ut portio Terrae metallicae ſolutae ſubſideat. Tum liquor, inclinatione vaſis in aliud vas transfuſus, evaporetur ad cuticulam fere, cui adhuc tepido ſenſim affundatur ſolutio Cinerum clavellatorum aqua parata, donec ceſſaverint efferveſcentia & ſibilus. Addita tunc Aquae calidae quarta, vel quinta parte, liquor iterum refrigerationi & ſubſidentiae committatur, filtretur, evaporetur & ad cryſtalliſationem in loco frigido reponatur. Cryſtallis ſupernatans liquor decantetur, iterumque evaporatus, perfectae relinquatur cryſtalliſationi. Collectae cryſtalli, ſuper inverſum cribrum ſtratim poſitae, leniter exſiccentur.

ARCANUM TARTARI.

Vid. Terra foliata Tartari.

ASELLORUM PRAEPARATIO.

Vid. Millepedum Praeparatio.

AURUM FULMINANS.

R. Auri puriſſimi drachmas duas,
Aquae regiae uncias duas.
Solutis affundantur
Aquae fontanae unciae ſex,
quibus ſucceſſive inſtilletur
Spiritus ſalis ammoniaci aquoſi quantum ſufficit,
ut Solutio coaguletur. Iterum additis
Aquae fontanae unciis decem
ſubſidentiae committantur. Liquor limpidus decantetur, quo ad uncias ſex evaporato, tentetur, inſtillando Spiritum ſalis

Ammoniaci aquoſum, an adhuc ſervaverit particulas ſolares. Praecipitatum repetita affuſione Aquae fontanae ſtudioſe edulcoretur, & poſt filtrationem per chartam emporeticam albam exſiccetur aëris calore tepido, probe vitando ſolis & ignis acceſſum.

BACILLI LIQUIRITIAE.

Vid. Liquiritia cocta.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

Vid. Balsamum cephalicum.

BALSAMUM ARCAEI.

R. Terebinthinae Venetae,
Elemi,
Sevi Hircini ana uncias ſex,
Olei Hyperici uncias duas,
Cerae citrinae drachmas ſex,
Pulveris Santali rubri ſemunciam.

Mixta leni igne ſolvantur & colentur.

BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.

R. Olei Nuciſtae expreſſi, ope Spiritus Vini odore ſuo privati drachmas tres,
Caryophyllorum drachmam unam.

Liquefacta & mixta tingantur
Pulveris Caryophyllorum ſufficiente quantitate.

BALSAMUM CATHOLICUM.

Vulgo *Baume du Commandeur.*

Vid. Balsamum traumaticum.

BAL-

BALSAMUM CEPHALICUM.

R. Olei Nucis moſchatae expreſſi unciam unam.
Immiſceantur
Olei ſtillatitii Caryophyllorum,
Lavendulae,
Rosmarini ana ſemidrachma,
Succini ſcrupulus dimidius,
Balſami Peruviani drachma una.
Nota. Qui velit, addat Moſchi Spiritu Vini triti grana decem.

BALSAMUM CINNAMOMI.

Paratur inſtar *Balſami Caryophyllorum.*

BALSAMUM EMBRYONUM.

Vid. AQUA EMBRYONUM.

BALSAMUM GUAJACINUM.

R. Gummi Guajaci libram unam,
Balſami Peruviani drachmas tres,
Spiritus Vini rectificati libras duas cum dimidia.
Digerantur ad ſolutionem gummi & colentur.

BALSAMUM LAVENDULAE.

Paratur ut *Balſamum Caryophyllorum.*

BALSAMUM LOCATELLI.

R. Cerae flavae libram unam.
Lento igne liquefiat in
Olei Olivarum optimi ſesquilibra.

 Dein

Dein addantur
Terebinthinae Chiae, vel Argentoratenſis ſesquilibra, ac tandem ab igne remotis
Balſami Peruviani unciae duae,
Sanguinis Draconis in pulverem triti uncia una, agitando aſſidue ad refrigerationem usque.

BALSAMUM NUCISTAE.

R. Olei Nuciſtae expreſſi ſemunciam,
ſtillatitii ſcrupulos quatuor.
Miſceantur.

* BALSAMUM OPHTHALMICUM RUBRUM..

R. Butyri recentis non ſaliti & ab omni lactis ſero liberati uncias tres,
Cerae albae drachmas ſex.
Liquefactae ſuper patinam Cerae admiſceatur Butyrum. Invicem liquatis, & in mortario exacte mixtis addantur
Mercurii praecipitati rubri in ſubtiliſſimum pulverem triti drachmae duae & grana quindecim.
Exactiſſime ac diu terantur, donec perfecte refriguerint.

BALSAMUM SAPONACEUM.

R. Spiritus Vini rectificati libras quatuor,
Saponis albi Hiſpanici uncias decem.
Leni igne ad ſolutionem digeſtis addantur
Camphorae tritae unciae duae,
Olei ſtillatitii Rosmarini,
Origani ana ſemuncia.
Miſceantur agitando.

BAL-

BALSAMUM five EXTRACTUM SATURNI.

R. Minii quantum lubet,
Aceti Vini acerrimi quadruplum.
Coquantur leni igne, donec Acetum dulcedinem contraxerit, & filtrentur. Liquor evaporetur ad confiftentiam Extracti liquidi.

BALSAMUM SULPHURIS SIMPLEX.

R. Florum Sulphuris partem unam,
Olei Lini partes quatuor.
Coquantur leniffimo igne ad confiftentiam Balfami fpiffioris.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

R. Balfami Sulphuris fimplicis quantum libet,
Olei deftillati Anifi quintuplum, vel fextuplum.
Digerantur ad folutionem.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

R. Balfami Sulphuris fimplicis partem unam,
Olei Terebinthinae partes octo ad decem.
Digerantur & folvantur.

BALSAMUM TRAUMATICUM.

R. Gummi Benzoes triti uncias tres,
Balfami Peruviani uncias duas,
Aloes hepaticae tritae femunciam,
Spiritus Vini rectificati libras duas.
In Balneo arenae per triduum digerantur & colentur.

BALSAMUM VITAE AD MODUM HOFMANNI.

R. Olei ſtillatitii Lavendulae,
Majoranae,
Caryophyllorum,
Macis,
Cinnamomi,
de Cedro ana Scrupulum unum,
Succini albi,
Rutae ana guttas decem,
Balſami Peruviani Drachmam ſemis,
Spiritus Roſarum rectificatiſſimi uncias decem.
Tingantur Radice Alcannae, committantur digeſtioni frigidae, & filtrentur per Goſſypium.
Nota. Quibus AMBRATUM placet, addant
Ambrae gryſeae grana quindecim,
Moſchi grana decem.

BALSAMUM VITAE EXTERNUM.

R. Saponis Veneti ſiccati & triti,
Olei Terebinthinae ana libram unam,
Salis Tartari ſescunciam.
Miſceantur.

BALSAMUM UNIVERSALE.

R. Olei Raparum recenter expreſſi ſesquilibram,
Cerae citrinae ſemilibram,
Invicem ſolutis & frigefactis addantur ſub continua agitatione
Balſami Saturni unciae tres.
Nota. Si deſideretur, addi poſſunt
Camphorae drachmae quatuor cum dimidia.

BUTY-

BUTYRUM ANTIMONII.

Vid. Antimonii Butyrum.

BUTYRUM MAJORANAE.

R. Foliorum Majoranae recentium libram unam.
Contuſa coquantur lentiſſimo igne cum
Butyri recentis inſulſi libra una.
Conſumta humiditate colentur & exprimantur. Paulo refrigeratis addatur
Olei deſtillati Majoranae ſemidrachma.

BUTYRUM POTABILE RUBRUM.

Vid. Unguentum potabile.

CALOMELAS.

Vid. Mercurius dulcis sexies sublimatus.

CASSIA EXTRACTA.

R. Fiſtularum Caſſiae ponderoſarum quantum lubet.
Eximatur medulla cum ſeminibus, ac ſolvatur in
Aquae calidae ſufficiente quantitate.
Trajiciatur per cribrum ſetaceum, lentoque igne ad mellis conſiſtentiam redactae addantur librae uni
Sacchari albi unciae quatuor.
Coquantur ad juſtam conſiſtentiam.

CERA AD ARBORES.

R. Reſinae,
Cerae ana libras duas cum dimidia,

Terebinthinae uncias duodecim.
Colliquando miſceantur.

CERA AD LABIA.

R. Butyri recentis inſulſi uncias novem,
Paſſularum majorum exacinatarum uncias duas,
Pomorum Borsdorſianorum in taleolos diſſectorum numero octo.
Leni igne coquantur & humiditate fere abſumta addantur
Radicum Anchuſae groſſiuscule contuſarum unciae duae.
Poſt lenem ebullitionem in ipſis liquentur
Cerae albae unciae quatuor.
Ab igne remotis & colatis inſtillentur
Olei Ligni Rhodii,
de Cedro ana guttae viginti.
Effundantur demum in chartam, Oleo Amygdalarum dulcium illitam.

CERA RUBRA.

R. Cerae albae uncias ſedecim,
Terebinthinae uncias duas.
Liquatis admiſceantur
Cinnabaris ſactitiae praeparatae unciae duae cum dimidia.
Effundantur deinde more conſueto.

CERA VIRIDIS.

R. Cerae citrinae libram unam,
Reſinae Pini uncias ſex,
Terebinthinae uncias quatuor,
Viridis Aeris triti ſemunciam.
Liquentur invicem, colentur & effundantur more ſolito.

CERA-

CERATA.

Vid. Emplastra.

CHALYBS PRAEPARATUS.

R. Chalybis Solingenſis, in laminas tenues cuſi quantum volueris.

Laminae valde candefactae exſtinguantur in Aqua frigida, ac tundantur in mortario ferreo.

Nota. Si Scobs Chalybis ex officinis monetariis haberi poſſit, commodius perficitur opus, illa ſcilicet pariter candefacta & Aqua exſtincta.

CHALYBS SULPHURATUS.

Ad Chalybis Solingenſis Virgam valde candentem applicetur fruſtum Sulphuris citrini. Hujus acceſſione Chalybs liquefactus deſtillabit in Aquam ſuppoſitam. Grana haec tundantur in pulverem ſubtiliſſimum, Aqua eluendum.

CHELAE CANCRORUM PRAEPARATAE.

Apices nigri Chelarum Cancrorum coquantur in Aqua, & abluti ac in mortario ferreo triti ſuper lapide laevigentur ſubtiliſſime, addendo ſenſim Aquam.

CINNABARIS ANTIMONII.

Vid. Antimonii Butyrum.

CINNABARIS FACTITIA.

R. Florum Sulphuris libram unam.

In vaſe ferreo capaci leni igne fluentibus addantur paulatim

 Hydrar-

Hydrargyri calefacti librae tres cum dimidia.

Spatula ferrea assidue agitando misceantur. Mox adaptetur operculum ligneum, ne flammam concipiat materia, quae nondum frigefacta teratur in pulverem, & sublimetur.

CONCHAE CITRATAE.

R. Concharum Ostrearum mundatarum & in subtilissimum pollinem tritarum libram unam.

Saturentur successive

Succi Citri depurati sufficiente quantitate.

In patina vitrea exsiccentur, leni calore, terantur & cribrentur.

CONCHAE PRAEPARATAE.

Testae Ostrearum in Lixivio alcalino, vel cum Sale Alcali, vel cum Cineribus parato, depurentur, Aqua fontana excoquantur, optime mundatae exsiccentur, in mortario ferreo contundantur & cribrentur.

CONDITUM AURANTIORUM CORTICUM.

Cortices Aurantiorum recentium macerentur per biduum in Aqua fontana, interdum mutanda; aliquoties dein ebulliant, donec mollescant. Nova iterum Aqua calida abluantur & supra inversum cribrum positi a superfluo madore liberentur. Tum vasi vitreo, aut figulino impositis, superfundatur ponderis duplum Sacchari albi, in brodio superiore a coctione corticum superstite soluti, despumati, colati, ad Tabulati fere consistentiam cocti & paullatim refrigerati.

CON-

CONDITUM CALAMI AROMATICI.

Radices Calami aromatici recentes, mundatae ac incifae, eodem modo ac *Cortices Aurantiorum* condiuntur.

CONDITUM CITRI CORTICUM.

Paratur uti Conditum *Corticum Aurantiorum.*

CONDITUM CYDONIORUM.

Fructus Cydoniorum, demto cortice exteriore, excifis feminibus eorumque capfulis, absque praevia maceratione ad mollitiem coquantur, & dein condiantur uti *Cortices Aurantiorum.*

CONDITUM NUCUM JUGLANDIUM.

Nuces Juglandes immaturae, feftuca perforatae, in Aqua frigida, quotidie mutanda, per fex, vel octo dies macerentur, ad mollitiem coquantur, & Saccharo clarificato, ad Tabulati confiftentiam cocto immergantur.

CONFECTIO ALKERMES INCOMPLETA.

R. Succi Pomorum Borsdorfianorum,
Sacchari albi ana uncias fedecim.
Coquendo redigantur in Syrupum fpiffioris confiftentiae, cui addantur
Succi Granorum Kermes fpiffioris unciae fedecim.
Unica ebullitione commixtis & per linteum colatis, adhuc calentibus, admifceantur fubtiliffime trita,
Cinnamomi acuti fescuncia,
Coccinellae drachmae tres.
Addantur demum

Folia Auri puriſſimi numero quinquaginta.
Agitentur ſpatula lignea ad auri foliati comminutionem.

Nota. Qui velit, addat
Ambrae gryſeae optimae cum drachmis duabus Sacchari albi tritae ſcrupulum unum,
Moſchi in Aqua Roſarum ſoluti grana decem.

CONFECTA SACCHARATA.

Semina, aut alia Saccharo incruſtanda, immittantur Aheno confectorio. Tepefacta humectentur Sacchari ad tabulati conſiſtentiam cocti aliquot Cochlearibus, probe intermiſcendo, donec ſicca appareant. Tunc partes pulverulentae per cribrum ſeparentur, & mundato aheno iterum incruſtentur. Quod toties repetendum, donec omnia Saccharo rite fuerint obducta.

Ad hanc normam parantur

Confectio Anisi.
Cubebarum.
Cynae Seminis.

CONSERVAE.

Canon.

Folia e pediculis, Floresque e calycibus decerpantur; tum ſingula in mortario marmoreo cum piſtillo ligneo contundantur in pulpam, cui per cribrum trajectae admiſceatur duplum Sacchari albi in pulverem triti. Pro herbis ſucculentioribus triplum Sacchari requiritur. Conſervae ſerventur in vaſe murrhino, aut vitreo.

Ad

Ad hanc normam parantur

CONSERVA ABSYNTHII.
ANTHOS FLORUM.
COCHLEARIAE.
MENTHAE.
ROSARUM RUBRARUM.

CONSERVA MILLEPEDUM.

R. Millepedum vivorum libram unam,
Sacchari albiſſimi libras duas cum dimidia.

Contundantur in mortario lapideo, cum piſtillo ligneo, & parumper calefacta ſerventur in vaſe vitreo, aut murrhino.

CORALLIA ALBA ET RUBRA PRAEPARATA.

In mortario ferreo in pulverem tuſa, ſuper porphyritem affuſa interdum aqua ſubtiliſſime laevigentur, donec nullum edant inter dentes ſtridorem, & exſiccentur.

CORNU CERVI SINE IGNE PRAEPARATUM.

Cornua Cervorum in majora fruſta ſecta, coquantur in aqua fontana donec molleſcant. Medulla & Cortex nigricans cultro ſeparentur, cornua iterum abluta ſiccentur, & in mortario ferreo in ſubtiliſſimum redigantur pulverem.

CORNU CERVI USTUM.

Cornu Cervi in majora fruſta diſſectum, aperto igne ad albedinem calcinetur, deinde in mortario ferreo contuſum, affuſa aqua ſuper porphyritem ſubtiliſſime laevigetur, exſiccetur & in pulverem teratur.

CRO-

CROCUS MARTIS APERITIVUS STAHLII.

Scoriae Reguli Antimonii martiales ſupernae ſeu primae, in fruſta contuſae, in patina aëri umbroſo exponantur, donec in pulverem fatiſcant, cui admiſceatur, bacillo agitando, aqua pura tepida. Aqua ſupernatante effuſa nova iterum affundatur reſiduo, iterumque decantetur, quod toties repetendum, donec aqua inde redeat limpida. Omnis tunc aqua decantata in quiete reponatur. Pulvis ſic elotus ab aqua filtro ſeparetur, ſiccetur & cum triplo Nitri ſicciſſimi ac puriſſimi in crucibulo rite deflagrando liquetur, poſteaque aqua pura edulcoretur.

CROCUS METALLORUM.

R. Antimonii crudi,
Nitri crudi, ana libram unam.

Separatim trita miſceantur, & vaſi ferreo, aut crucibulo injecta, pruna accendantur. Tum materia rubeſcens aqua calida edulcoretur, & ſiccetur.

CRYSTALLI ET CREMOR TARTARI.

R. Tartari albi aqua calida aliquoties abluti & triti libras duas,
Aquae fontanae libras viginti quatuor.

Coquantur in vaſe figulino & fervens adhuc decoctum per manicam Hippocratis trajiciatur in aliud vas terreum. Ubi refriguit, cryſtallos exhibet; in ſuperficie autem liquoris cruſtam, *Cremoris* nomine notam, qui cum Cryſtallis aqua frigida ablutus & exſiccatus, ſuper porphyrite in pulverem albiſſimum teratur.

* DECOCTUM ALBUM.

R. Cornu Cervi uſti,
Micae Panis albi ana unciam unam,
Gummi Arabici drachmas duas,
Aquae fontanae libras tres.
Coquantur ad libras duas: colaturae addantur
Sacchari albi drachmae duae.

DECOCTUM LAXATIVUM VIENNENSE.

Vid. Aqua Laxativa Viennensis.

DIACODIUM MONTANI.

Vid. Syrupus Diacodii.

DIAGRYDIUM PRAEPARATUM.

Scammoneum Aleppenſe in pulverem teratur, addendo interdum unam alteramve Amygdalam dulcem: per ſetaceum deinde trajiciatur.

ELAEOSACCHARA.

Fiunt terendo Sacchari albiſſimi unciam unam, cum Olei aetherei guttis viginti quatuor.

ELATERIUM.

R. Cucumerum agreſtium intra paucos dies collectorum quantum lubet.

Scindantur mucrone cultelli circa petioli inſertionem, ut matura ſemina e fructibus proſiliant; ſemen reliquum ac mucago ſupra cribrum proliciantur, poſteaque in mortario ope

lignei piſtilli contundantur, affuſo ſenſim liquoris tenuis e fructibus conciſis deſtillantis & aquae pluvialis tantillo, donec liquor pinguiculus e medulla ſeminis in pulpam contritus per ſetaceum novum ſubtiliſſimum transmitti poſſit, qui leniſſima evaporatione in Maſſam pilularem redigatur.

* ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

Paretur e Pulvere dentifricio & Melle Roſarum.

ELECTUARIUM DIASCORDIUM.

R. Extracti Opii Thebaici grana triginta ſex,
 Vini albi uncias tres.
Solutis addantur ſucceſſive
 Mellis deſpumati & calefacti unciae viginti.
 His continua agitatione probe ſubactis ſenſim admiſceantur in ſubtilem pulverem contrita,
 Radicum Gentianae,
  Biſtortae,
  Tormentillae,
 Herbae Dictamni cretici ana ſemuncia
  Scordii ſescuncia.
 Cinnamomi acuti uncia una,
 Zingiberis,
 Piperis longi ana drachmae duae,
 Styracis calamitae,
 Gummi Arabici ana drachmae quinque.
Tandem optime agitando in Electuarium redigantur cum
 Conſervae Roſarum rubrarum ſemilibra.

Nota. Quaelibet uncia continet Opii granum unum.

* ELECTU-

* ELECTUARIUM MUNDIFICANS.

R. Radicis Sarſaparillae optimae uncias tres,
Ligni Guajaci unciam unam,
Foliorum Sennae ſescunciam,
Rhabarbari drachmas duas,
Corticis Saſſafras,
Seminis Aniſi ana drachmam unam.
Singula in pulverem trita, redigantur in Electuarium cum Mellis diſpumati libra una.

* ELECTUARIUM PRO INFANTIBUS.

R. Magneſiae albae drachmas ſex,
Seminis Aniſi contriti ſemunciam,
Pulveris Croci drachmam unam,
Syrupi e Cichoreo cum Rhabarbaro quantitatem ſufficientem.
Miſceantur ut fiat Electuarium.

Nota. Locum ſupplet Electuarii, quod ſub *Requiei Nicolai* nomine ſaepe a mulierculis deſideratur, magno cum infantum detrimento.

ELECTUARIUM PRO PECORIBUS.

R. Radicum Gentianae,
Ariſtolochiae rotundae,
Baccarum Lauri,
Myrrhae ana uncias duas.
In pulverem redactis admiſceantur Mellis deſpumati librae duae.

ELIXIR APERITIVUM CLAUDERI.

R. Aloës ſuccotrinae,
Myrrhae electae ana unciam unam,
Croci orientalis ſemunciam,
Salis Tartari, vel Cinerum clavellatorum depuratorum uncias duas.
Inciſa & contuſa digerantur per aliquot dies in
Aquae Florum Sambuci unciis quindecim.
Exprimantur & filtrentur.

ELIXIR BALSAMICUM TEMPERATUM HOFMANNI.

R. Extracti Abſynthii,
Cardui benedicti,
Centaurei minoris,
Gentianae ana unciam unam,
Flavedinis Corticum Aurantiorum inciſae uncias quatuor.
Commiſtis affundantur
Vini Canarienſis librae duae,
Spiritus Corticum Aurantiorum unciae duae.
Per triduum digeſta colentur & exprimantur.

ELIXIR BALSAMICUM WERLHOFII.

R. Flavedinis Corticum Aurantiorum recentium,
Corticis Peruviani optimi ana ſemunciam,
Extracti Cardui benedicti,
Centaurei minoris,
Myrrhae electae,
Radicis Coſti dulcis ana drachmas duas,
Croci Orientalis drachmam unam,
Salis Tartari ſemunciam.

Inciſa

Incisa & contusa infundantur
Vini Canariensis librae uni.
Per triduum digesta decantentur.

ELIXIR PECTORALE RINGELMANNI, vulgo REGIS DANIAE.

R. Extracti Liquiritiae uncias sex,
Aquae Foeniculi libram unam,
Spiritus Salis Ammoniaci anisati libras tres.
Per viginti quatuor horas digesta colentur.

ELIXIR PECTORALE WEDELII.

R. Radicum Enulae,
Iridis Florentinae,
Scillae praeparatae ana unciam unam,
Liquiritiae,
Seminis Anisi ana semunciam,
Rasurae Ligni Santali rubri unciam unam,
Croci optimi drachmas tres.
Incisa & contusa digerantur per triduum vel quatriduum cum
Spiritus Vini rectificati unciis viginti octo.
Digerantur interea
Gummi Ammoniaci drachmae duae,
Myrrhae semuncia,
Benzoës drachmae sex,
Spiritus Vini rectificati unciae sex.
Liquores utraque digestione extracti colentur, exprimantur & commisceantur.

ELIXIR POLYCHRESTUM.

R. Extracti panchymagogi unciam unam,
Mixturae ſimplicis ſine Camphora uncias ſex.
Leni igne digeſta filtrentur.

ELIXIR PROPRIETATIS CUM ACIDO.

R. Aloës optimae,
Myrrhae electae ana uncias duas.
Tritis affundantur
Aceti Vini deſtillati librae duae.

In cucurbita vitreo leni ebullitione coquantur ad libram unam. Liquor colatus ac filtratus evaporetur ad uncias decem, cui denique admiſceantur
Tincturae Croci cum decuplo Spiritus Vini paratae unciae decem.
Parumper digeſta filtrentur.

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO.

R. Aloës optimae,
Myrrhae electae,
Croci ana unciam unam.
Contritis admiſceantur
Salis Alcali depurati unciae quatuor.

Vaſi vitreo plano commiſſa, in loco humido reponantur, ut liqueſcant. Tunc affundatur
Aquae fontanae ferventis ſemilibra.
Refrigeratis addatur
Spiritus Vini rectificatiſſimi libra una.
Leni calore per triduum digeſta exprimantur ac filtrentur.

ELIXIR

ELIXIR VITRIOLI.

R. Cinnamomi ſescunciam,
Zingiberis unciam unam,
Foliorum Menthae Piperitidis ſiccatorum ſemunciam,
Spiritus Vini rectificati libras duas.

In calore leniſſimo Balnei Arenae per triduum digeſtis inſtillentur paullatim

Olei Vitrioli Anglici unciae ſex.

Iterum per triduum digeſta filtrentur per infundibulum vitreum.

ELIXIR UTERINUM.

R. Aſae foetidae drachmam unam,
Salis Cornu Cervi ſemidrachmam,
Eſſentiae Caſtorei uncias tres.
Soluta colentur.

EMPLASTRA.

Canones.

I. Ordo miſcelae ſequens eſto: Ingredientia pinguia, tenacia, non facile deliqueſcentia, ſicut Sebum, Cera, Terebinthina, primum fundantur; quo facto admiſceantur Oleum, Mel, Extractorum ſolutiones, Decocta & Mucilagines (omnibus prius calefactis). Tum addantur Gummireſinae in Terebinthina, aut Aceto forti ſolutae. Peracta evaporatione humidi & patina ab igne remota, pulveres ſicci haud ſolubiles admiſceantur ſub continua agitatione. Emplaſtro ſere frigefacto addantur tandem Olea eſſentialia, aliaque concreta ſicca volatilia, ut Camphora, Crocus &c.

II. Diu-

II. Diuturniorem coctionem exigunt Emplaſtra, quae Saturnina ingrediuntur, ſcilicet ad perfectam horum ſolutionem, quae ſub continua agitatione & affuſo ſubinde pauxillo Aquae calidae tandem perficitur; quo facto, & evaporato humido, reliqua addantur ingredientia, ſecundum praeſcriptum ſub priore Canone ordinem, ea tamen differentia, ut Cera ultimo fere loco his admiſcenda ſit.

Nota. Quae noſtro in Diſpenſatorio retenta fuere Emplaſtra, cum cura, ſpeciminis gratia, prius confecta ſunt, adeo ut ingredientium proportio inter ſe exacte determinata hic deprehendatur.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

R. Olei Olivarum libras duas,
Ceruſſae libras quatuor.
Leni igne, ſub continua agitatione & jugi pauxilli Aquae inſtillatione coctis, addantur
Cerae albae unciae ſex.
Colliqueſcant, ut fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

R. Cerae citrinae,
Reſinae Pini,
Terebinthinae ana uncias quatuor.
Colliquatis & colatis addantur
Gummi Ammoniaci depurati unciae octo.
Fiat Emplaſtrum.

EM-

EMPLASTRUM ANTIHYSTERICUM.

R. Galbani uncias duodecim;
Tacamahácae tritae,
Cerae flavae ana uncias ſex,
Aſae foetidae,
Seminum Cumini contritorum,
Terebinthinae Venetae ana uncias quatuor.
Miſceantur ut fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM CATAGMATICUM.

Vid. EMPLASTRUM AD FRACTURAS.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

R. Tacamahacae,
Carannae,
Styracis calamitae,
Maſtichis ana unciam unam,
Opii ſcrupulos quatuor.
Contritis & leni igne liquatis admiſceantur
Terebinthinae Venetae drachmae duae,
Balſami Peruviani ſemuncia,
Olei Succini drachma una.

EMPLASTRUM DE CICUTA CUM AMMONIACO.

R. Cerae flavae libram unam,
Olei Hyoſcyami uncias quatuor.
Colliquatis, colatis ac paulo refrigeratis addantur
Succi Citutae inſpiſſati unciae ſex,

Gummi Ammoniaci in Decocto Cicutae ſoluti, iterumque inſpiſſati unciae octo.

Ad lenem ignem demum admiſceantur

Pulveris Cicutae unciae octo.

EMPLASTRUM CITRINUM.

R. Reſinae libram unam,

Cerae citrinae uncias octo,

Sevi cervini uncias quatuor,

Terebinthinae uncias duas.

Colliquatis & colatis addatur

Pulveris Curcumae ſemuncia.

EMPLASTRUM AD CLAVOS PEDUM.

R. Galbani in Aceto ſoluti ac iterum inſpiſſati unciam unam,

Picis navalis ſemunciam,

Emplaſtri diachyli ſimplicis drachmas duas.

Colliquatis addantur

Viridis Aeris triti,

Salis Ammoniaci ana ſcrupulus unus.

Fiat Emplaſtrum.

FMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

R. Lithargyrii libras duas,

Olei Olivarum libras quatuor.

Ad ſpiſſitudinem Emplaſtri fere coctis, addantur

Cerae flavae unciae quatuor.

Colliquatis demum admiſceantur

Terebinthinae Venetae,

Olibani triti ana unciae quatuor,
Colcotharis Vitrioli unciae ſex.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM VIRIDE.

R. Cerae citrinae uncias ſedecim,
Reſinae Pini ſemilibram,
Sevi hircini uncias quinque,
Terebinthinae Venetae uncias duas.
Colliquatis admiſceatur
Herbae Rutae in pulverem redactae ſemilibra.

EMPLASTRUM DIACHYLON COMPOSITUM.

R. Emplaſtri diachyli ſimplicis libras duas,
Cerae flavae uncias quatuor.
Colliquatis addantur debito ordine
Terebinthinae Venetae unciae duae,
Pulveris Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni ana uncia una,
Croci triti in Spiritu Vini macerati & diluti drachmae duae.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX.

R. Lithargyrii ſubtiliſſime triti libras duas,
Olei Olivarum clari libras tres.
Debita cum cautela coctis addantur
Mucilaginis Seminis Foenugraeci,
Lini,
Radicis Altheae ana libra una.
Continuata leni coctione fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DIAPALMAE.

R. Olei Palmae ſemilibram,
Olivarum veteris libras quinque cum dimidia,
Foliorum Quercus tenellorum ſescuncia,
Coctis & colatis addantur
Lithargyrii tenuiſſime triti librae tres,
Ab igne remotis admiſceantur
Vitrioli albi unciae quatuor.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

R. Olei Olivarum uncias duas cum dimidia,
Ceruſſae ſemilibram,
Aquae fontanae libram unam.
Leniſſimo igne ad unguenti ſpiſſioris conſiſtentiam coctis addantur
Cerae flavae unciae triginta.
Sub perpetua agitatione refrigeratis admiſceantur demum
Pulveris Plumbi uſti ſemilibra,
Pompholygos,
Olibani ana unciae quatuor.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

R. Balſami Sulphuris ſimplicis,
Cerae flavae ana uncias octo,
Colophonii uncias ſex,
Colliquatis admiſceantur
Myrrhae in pulverem tritae unciae octodecim.

EMPLASTRUM EMOLLIENS.

Vid. Emplastrum de meliloto.

EMPLASTRUM AD FRACTURAS.

R. Colophonii libras duas,
Terebinthinae ſemilibram.
Leni igne liquatis admiſceantur
Pulveris Radicis Biſtortae,
Conſolidae majoris,
Tormentillae ana unciae tres.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

R. Emplaſtri de Meliloto,
Diachyli ſimplicis ana uncias tres,
Cerae citrinae uncias duas,
Terebinthinae unciam unam,
Galbani in Aceto ſoluti ac iterum inſpiſſati uncias ſex,
Croci orientalis drachmas ſex.

Debito ordine colliquentur & commiſceantur ut fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM GRYSEUM.

R. Cerae citrinae uncias tres,
Sebi cervini uncias quatuor,
Terebinthinae,
Pulveris Lapidis calaminaris,
Lithargyrii ana ſescunciam,
Tutiae praeparatae,

Pulveris Maſtichis,
Olibani ana ſemunciam,
Camphorae cum Oleo tritae drachmam unam.
Colliquentur & commiſceantur ut fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE HYOSCYAMO.

R. Olei Seminis Hyoſcyami expreſſi ſemilibram,
Succi Herbae Hyoſcyami libram unam,
Ad conſumtionem humidi coctis addantur
Cerae flavae unciae quatuordecim,
Terebinthinae unciae duae.
Liquatis & paulo refrigeratis admiſceantur demum
Herbae Hyoſcyami in pulverem redactae unciae duae.

EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

R. Picis Burgundicae uncias quatuor,
Euphorbii triti ſesquidrachmam,
Terebinthinae Venetae drachmas ſex.
Colliquando miſceantur in Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE LABDANO.

Vid. Emplastrum Stomachicum.

EMPLASTRUM DE LAPIDE CALAMINARI.

R. Olei Olivarum ſesquilibram,
Lapidis calaminaris tenuiſſime triti libram unam,
Lithargyrii ſemilibram.
Debitis cum cautelis ſimul coquantur.

EM-

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

R. Sebi cervini libras quinque,
Olei Chamomillae cocti libram unam,
Refinae albae libras fex,
Cerae flavae libras tres,
Gummi ammoniaci,
Bdellii ana uncias quatuor,
Pulveris Herbae & Florum Meliloti libras duas,
Abfynthii libram unam.
Coquantur & commifceantur debito ordine.

EMPLASTRUM MERCURIALE.

R. Emplaftri diachyli fimplicis libram unam,
Hydrargyri Terebinthina exftincti fescunciam.
Mifceantur.

Nota. Locum fupplet *Emplaftri de Ranis cum Mercurio.*

EMPLASTRUM MIRACULOSUM.

R. Olei Olivarum libras tres,
Pulveris tenuiffimi Ceruffae,
Minii ana fesquilibram,
Saponis Veneti rafi uncias fex,
Camphorae cum Oleo Rofarum tritae drachmas fex.
Debitis cum cautelis coquantur & mifceantur.

EMPLASTRUM NORICUM.

R. Minii fubtiliffime triti libram unam,
Olei Rofarum cocti libras duas,
Aceti Vini femilibram.

Ad

Ad Emplaſtri mollioris conſiſtentiam & colorem ſubfuſcum coctis addatur
Cerae citrinae ſescuncia.
Nondum plane refrigeratis immiſceantur
Camphorae cum Oleo Roſarum tritae drachmae duae.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

R. Colophonii,
Cerae flavae ana libram unam,
Galbani ſemilibram,
Picis liquidae uncias tres,
Croci triti uncias duas.
Debito ordine colliquentur ac commiſceantur.

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO.

Vid. Emplastrum Mercuriale.

EMPLASTRUM SAPONATUM BARBETTE.

Vid. Emplastrum miraculosum.

EMPLASTRUM SATURNINUM.

Vid. Emplastrum Diapompholygos.

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

R. Cerae albae uncias quatuor,
Spermatis Ceti uncias duas,
Galbani depurati,
Terebinthinae ana unciam unam.
Colliquando miſceantur.

EM-

EMPLASTRUM DE SPERMATE RANARUM.

Hujus locum ſupplet EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

EMPLASTRUM STICTICUM CROLLII.

In ejus locum ſubſtituitur EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

EMPLASTRUM STICTICUM VULGARE.

R. Cerae citrinae,
Colophonii,
Picis nigrae ana libram unam,
Sebi hircini ſescunciam.
Liquata colentur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM, SEU DE LABDANO.

R. Thuris unciam unam,
Liquato admiſceantur
Labdani calore emolliti unciae tres,
Pulveris Cinnamomi,
Olei Macis expreſſi ana ſemuncia,
Menthae ſtillatitii drachma una,
In mortario tepido in Emplaſtrum redacta, in vaſe bene clauſo ſerventur.

EMPLASTRUM AD TEMPORA.

Vid. EMPLASTRUM CEPHALICUM.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

R. Cerae citrinae uncias octo,
Pulveris Gummi Euphorbii unciam unam,
Terebinthinae ſescunciam,
Olei Roſarum uncias tres cum dimidia,
Pulveris Cantharidum uncias ſex.
Colliquentur & commiſceantur.

EMPLASTRUM VIRIDE.

Vid. Cera viridis.

ESSENTIAE ET TINCTURAE.

Canones.

I. Vegetabilia ſint recenter & modice ſiccata, niſi recentia praeſcribantur. Incidantur etiam atque contundantur ante affuſionem menſtrui.

II. Si in Balneo digeſtio fiat, totum Opus abſolvitur moderando calorem, qui toto tempore lenis ſit.

III. Vas circulatorium, quod adhibetur, ampliſſimum ſit, ac incaleſcat antequam lutentur juncturae.

IV. Digestionis tempore agitetur vas crebro, quod inprimis valet, ubi Gummata extrahuntur.

V. Tincturae depurentur ſubſidentia, priusquam aut filtrantur, aut colantur.

VI. De Tincturis alcalinis notandum, quod pro Extractione requirant Spiritum Vini rectificatiſſimum & Sal Alcali fixum valde acre & cauſticum. Sal hocce calido menſtruo

menſtruo admiſceatur. Diuturna ſit digeſtio ſub frequenti agitatione.

VII. Quoad Eſſentias ſimplices, alia eſt proportio menſtrui pro herbis; alia pro radicibus, aromatibus & herbis aromaticis; alia denique pro Gummatibus.

ESSENTIA ABSYNTHII SIMPLEX.

R. Summitatum Abſynthii inciſarum uncias quatuor,
Spiritus Vini rectificati uncias duodecim.
Digerantur leni calore per triduum; fortiter exprimantur & filtrentur.

Ad hanc normam parantur:

Essentia Cardui Benedicti.
Centaurei minoris.
Chamomillae.
Fumariae.
Millefolii.
Scordii.
Tanaceti.
Trifolii Fibrini simplex.

Praeſtantiores, ſed & pretioſiores evadunt Eſſentiae ſimplices, ſi ad modum Eſſentiae Trifolii fibrini infra deſcriptum, cum ſpiritu proprio parantur. Tunc vero potius Elixirii nomen merentur.

ESSENTIA ANGELICAE.

R. Radicum Angelicae inciſarum uncias duas,

Spiritus Vini rectificati uncias decem.
Per quatriduum digesta exprimantur & filtrentur.

Ad eandem normam parantur:

ESSENTIA ARISTOLOCHIAE ROTUNDAE.
CALAMI AROMATICI.
CARYOPHYLLORUM.
CINNAMOMI.
CORTICIS CASCARILLAE.
PERUVIANI.
LIGNI SASSAFRAS.
CROCI.
ENULAE.
GALANGAE.
GENTIANAE.
LIGNI GUAJACI.
PIMPINELLAE.
POMORUM AURANTIORUM IMMATURORUM.
VINCETOXICI.

Cum Spiritu proprio abstractitio secundum similem normam parantur:

ESSENTIA MELISSAE.
MENTHAE.

ESSENTIA ASAE FOETIDAE.

R. Asae foetidae electae & comminutae uncias duas,
Spiritus Vini rectificati uncias duodecim.

Leni

Leni calore per triduum digeſta, exprimantur & filtrentur.

Secundum hanc normam parantur:

Essentia Ammoniaci Gummi.
Castorei.
Myrrhae.

Essentia, ſeu Tinctura Aloes.
Benzoes.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM.

R. Corticum exteriorum Aurantiorum, Curaſſavienſia dictorum uncias duas,
Spiritus Corticum Aurantiorum uncias decem.
Per quatriduum digeſta exprimantur & filtrentur.

ESSENTIA CORTICUM CITRI.

Paratur uti praecedens.

ESSENTIA ABSYNTHII COMPOSITA.

R. Summitatum Abſynthii uncias quatuor,
Centaurei minoris ſemunciam,
Herbae Cardui benedicti unciam unam,
Chamaedryos drachmas duas,
Radicum Zedoariae drachmas tres,
Gentianae unciam unam,
Angelicae drachmas ſex,
Coſti dulcis,

Corticum Citri ana ſemunciam,
Aurantiorum Curaſſavienſium drachmas tres,
Cardamomi,
Seminis Aniſi ana drachmam unam.
Inciſis & contuſis affundantur
Spiritus Vini rectificati librae quinque.
In Cucurbita vitrea optime clauſa per quatriduum digeſta exprimantur & filtrentur.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA STAHLII.

R. Radicum Angelicae,
Imperatoriae,
Helenii ana unciam unam,
Cardopatii ſemunciam,
Vincetoxici,
Pimpinellae albae ana ſescunciam.
Conciſis affundatur
Spiritus Vini rectificati libra una.
Per viginti quatuor horas digeſtis, expreſſis & filtratis addantur
Eſſentiae Scordii partes aequales.

ESSENTIA AMARA.

R. Herbae Trifolii fibrini,
Tanaceti,
Scordii ana libram unam.
Conciſis affundantur
Spiritus Vini rectificati librae novem,
Vitrioli drachmae duae.

Poſt

Poſt lenem digeſtionem quatuor dierum exprimantur, & addantur

Eſſentiae Caſcarillae,
Succini ana libra una.

Mixta filtrentur.

ESSENTIA AMBRAE.

R. Ambrae gryſeae drachmam unam,
Naphthae Vitrioli uncias quatuor,
Coccinellae grana decem.

Mixta ſerventur in vaſe optime clauſo, epiſtomio vitreo munito.

ESSENTIA ANISI STELLATI.

R. Seminis Aniſi ſtellati contuſi uncias duas,
Spiritus Vini rectificati uncias octo.

Digeſta per triduum exprimantur & filtrentur.

ESSENTIA BALSAMICA EXTERNA.

Vid. Balsamum Traumaticum.

ESSENTIA CARMINATIVA.

R. Radicum Zedoariae uncias duas,
Galangae minoris unciam unam,
Calami aromatici,
Florum Chamomillae Romanae,
Seminis Aniſi,
Carvi ana ſemunciam,
Baccarum Juniperi,

Herbae

Herbae Salviae,
Melissae,
Menthae ana unciam unam,
Cardamomi drachmas duas,
Flavedinis Corticum Aurantiorum semunciam.
Concisa & contusa digerantur per quatriduum moderato ignis calore in
Spiritus Corticum Citri libris tribus & dimidia.
Colatis & expressis admisceantur
Spiritus Nitri dulcis unciae quatuor.
Filtrentur.

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI HUXHAMII.

R. Corticis Peruviani optimi in pulverem triti uncias tres,
Flavedinis Corticum Aurantiorum sescunciam,
Radicis Serpentariae Virginiensis drachmas tres,
Croci scrupulos quatuor,
Spiritus Vini Gallici uncias viginti.
Digesta colentur.

ESSENTIA FABARUM S. IGNATII.

R. Fabarum Sancti Ignatii rasarum semunciam,
Spiritus Vini Gallici non rectificati uncias quatuor.
Leni calore per sex dies macerata colentur & filtrentur.

ESSENTIA FULIGINIS.

R. Fuliginis ex camino splendentis ac tritae uncias duas,
Liquoris praecipitantis uncias duodecim.

Tem-

Temperato calore per biduum digerantur in vitro exactissime clauso, deinde liquor optime saturatus filtretur.

ESSENTIA LIGNORUM.

R. Rasurae Ligni Sancti,
Sassafras ana semilibram,
Santali rubri uncias tres,
Spiritus Vini rectificati libras sex.
Per quatriduum digesta, colata & expressa filtrentur.

ESSENTIA PINI.

R. Extracti Summitatum Pini aquosi uncias duas,
Spiritus Cochleariae uncias decem.
Leni calore ad solutionem Extracti digesta filtrentur.

ESSENTIA RHABARBARI SPIRITUOSA.

R. Rhabarbari electi uncias duas,
Terrae foliatae Tartari semunciam.
Contusis affundantur
Spiritus Vini rectificati unciae sedecim.
Leni calore per quatriduum digesta, exprimantur ac filtrentur.

ESSENTIA STIBII.

R. Vitri Antimonii unciam unam,
Vini Gallici generosi libram unam.
In vase clauso locoque tepido per sex dies digesta, filtrentur.

ESSENTIA STOMACHICA.

Vid. Tinctura Stomachica.

ESSENTIA STOMACHICA WOLFII.

R. Summitatum Abſynthii vulgaris ſemilibram,
Centaurei minoris uncias quatuor,
Herbae Cardui benedicti uncias duas,
Chamaedryos unciam unam,
Radicis Gentianae rubrae ſescunciam,
Enulae drachmas ſex,
Angelicae unciam unam,
Galangae minoris,
Zedoariae ana ſemunciam,
Corticum Citri,
Aurantiorum ana ſescunciam,
Coſti dulcis,
Cardamomi minoris ana drachmas tres,
Spiritus Vini rectificati menſuras ſex.
Miſceantur & digerantur.

ESSENTIA SUCCINI CONCENTRATA.

R. Succini pellucidi libram unam.

In pulverem contuſum, in fictili vitreato ſupra lenem ignem admodum parum aſſetur, donec quaſi ſudare coeperit, tum calidum ingeratur in Phialam altam, & cum

Spiritus Vini rectificatiſſimi calentis libris quinque per quatriduum digeratur & filtretur.

ES-

ESSENTIA TRIFOLII CUM SPIRITU PROPRIO.

R. Herbae Trifolii fibrini uncias octo,
Spiritus proprii per fermentationem parati libras tres.
Per triduum digeftis ac expreffis addatur
Extracti Trifolii fibrini fescuncia,
Soluta filtrentur.

EXTRACTA.

Canones.

I. Partes conftituentes fimplicium ad paranda Extracta adhibendorum, differentiam menftrui indicant. Sic fubftantiae mere gummofae menftruum aqueum; mere refinofae menftruum fpirituofum; gummeo - refinofae vero menftruum mixtum, id eft aquofum & fpirituofum, requirunt.

II. Evaporatio atqve infpiffatio caute fiant in vafe amplo plano ftanneo, aut terreo vitreato, ad lenem Balnei Mariae calorem.

III. Cavendum, ne ad Extracta aquofa plus menftrui adhibeatur, quam neceffario requiritur.

IV. Quae ad Extracta fpirituofa adhibentur fimplicia, ficca fint.

V. Ad Extracta gummeo - refinofa menftrui proportio ea fit, ut Herbae librae uni, Aquae fex ad octo, & Spiritus Vini libra una affundantur, atque poft digeftionem viginti quatuor horarum evaporentur.

EXTRACTUM ABSYNTHII.

R. Summitatum Abſynthii vulgaris libram unam,
Aquae ſimplicis libras octo,
Spiritus Vini Gallici libram unam.

Digerantur per viginti quatuor horas, exprimantur, & abſtracto Spiritu evaporentur in Balneo Mariae, eam ad conſiſtentiam, ut manui impoſita maſſa calida eidem non adhaereat.

Ad eandem normam parantur:

EXTRACTUM ARTEMISIAE.
CARDUI BENEDICTI.
CENTAUREI MINORIS.
CHAMOMILLAE.
COCHLEARIAE.
ENULAE.
LILIORUM CONVALLIUM.
MARRUBII.
MILLEFOLII.
RHABARBARI.
TANACETI.
TRIFOLII FIBRINI.

EXTRACTUM ACONITI.

R. Herbae Aconiti, antequam pandantur flores collectae quantum volueris.

Exprimatur Succus, qui in vaſe terreo vitreato, leni igne atque ſub agitatione continua, ad ſpiſſi Extracti conſiſtentiam coquatur.

Secun-

Secundum hanc normam parantur:

EXTRACTUM CHAEREFOLII.
CICUTAE.
FUMARIAE.
HYOSCYAMI.
STRAMONII.
TARAXACI.

EXTRACTUM ANGELICAE.

R. Radicum Angelicae ſiccarum libram unam.
Inciſis affundantur
Spiritus Vini rectificati librae quatuor.

Digeſta per quadraginta octo horas exprimantur, atque ſpiritus per filtrum colatus ſervetur. Tum Radices denuo infundantur
Aquae fontanae libris ſex.

Digerantur, & poſt unam vel alteram ebullitionem exprimantur. Expreſſum Ovi albumine clarificatum, cum ſpirituoſo commiſceatur, lentoque igne, Spiritu per Alembicum abſtracto, ad Extracti conſiſtentiam inſpiſſetur.

Praeſcripto modo parantur:
EXTRACTUM ARISTOLOCHIAE.
CALAMI AROMATICI.
CORTICIS PERUVIANI GUMMEO-RESINOSUM.
GENTIANAE.
PINI.
VALERIANAE
ZEDOARIAE.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI AQUOSUM.

R. Corticis Peruviani incifi libram unam,
Aquae fontanae libras octo.

Coquantur ad extractionem omnis faporis. Expreffa poft fubfidentiam evaporentur ad confiftentiam Extracti fpiffioris.

Ad hanc normam parantur:

EXTRACTUM CASCARILLAE.
HELLEBORI ALBI.
NIGRI.
LIGNI GUAJACI.
NICOTIANAE.
SARSAPARILLAE.
SCILLAE.
SENNAE.

EXTRACTUM ALOES GUMMOSUM.

Vid. ALOE DEPURATA.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

R. Extracti Aloës gummofi unciam unam,
Hellebori nigri drachmas duas,
Colocynthidis drachmam unam,
Diagrydii praeparati drachmas tres.
Mifceantur.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

R. Pulpae Colocynthidis libram unam,
Spiritus Vini Gallici libras fex.

Digefta

Digeſta ad ſufficientem extractionem exprimantur & filtrentur. Reſidua pulpa cum Aqua fontana cocta, colata, expreſſa atque clarificata, cum Extractione ſuperiore ſpirituoſa commiſceatur & ad Extracti conſiſtentiam evaporetur.

EXTRACTUM CROCI.

R. Croci Orientalis uncias duas,
Spiritus Vini Gallici uncias ſedecim.

Digerantur loco tepido, vaſe optime clauſo, per triduum. Spiritus probe tinctus decantetur, affundatur alius, idque una cum digeſtione repetatur, donec omnis extracta fuerit tinctura. Commixtis tunc omnibus, abſtrahatur ſpiritus leni balnei calore, ad Extracti conſiſtentiam.

EXTRACTUM LIQUIRITIAE.

Vid. Succus Liquiritiae depuratus.

EXTRACTUM MYRRHAE.

R. Myrrhae rubrae in pulverem groſſiuſculum tritae ſemilibram.

Irroretur
Liquoris Nitri fixi uncia una.

Exacte cum ſpatula lignea agitata reponantur in cella per dies quatuordecim, quo Myrrha penitus ſolvatur. Tum affundatur aqua fervida atque agitetur maſſa. Dein quiete relinquatur, donec ſedimentum craſſius depoſuerit. Aqua ſupernatans tincta ſeparetur, idque repetatur, donec affuſa aqua tingi deſinat. Omnis demum aqua confuſa, moderatiſſimo calore ad Extracti conſiſtentiam evaporetur.

EX-

EXTRACTUM OPII.

R. Opii Thebaici uncias quatuor.

In frustula minuta concisae immittantur Cucurbitae vitreae & affundantur.

Aquae pluvialis librae quatuor.

Solutio per chartam emporeticam filtrata, lenissimo balnei calore ad Extracti spissitudinem evaporetur.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

R. Radicis Turbith resinosae drachmas decem,
Agarici mundati drachmas quatuordecim,
Pulpae Colocynthidis uncias duas cum dimidia,
Seminis Carthami unciam unam.

Incisis & contusis affundantur

Spiritus Vini rectificati librae tres cum dimidia.

Digerantur per quatriduum, & a Colatura expressa, atque filtrata abstrahatur Spiritus, donec libra una supersit, seorsim servanda. Residuo autem addantur

Foliorum Sennae sine stipitibus unciae quatuor,
Radicis Hellebori nigri uncia una,
Hermodactyli drachmae decem,
Rhabarbari optimi sescuncia.

Incisa & contusa macerentur in sufficiente quantitate Aquae bullientis per horas viginti quatuor, & leniter coquantur. In Colatura expressa solvatur

Aloës succotrinae semilibra.

Commixtae tunc utraeque extractiones leni igne evaporentur ad Extracti spissioris consistentiam; cui demum admisceantur

Diagrydii praeparati unciae duae.

EX-

EXTRACTUM SATURNI.

Vid. Balsamum Saturni.

FEL TAURI INSPISSATUM.

Fel bovinum leni igne evaporatur ad Extracti consistentiam.

FLORES BENZOES.

R. Benzoës quantum volueris.

Immittatur Ollae vitreatae, cujus orae adaptatus sit cucullus chartaceus coniformis, & leni igne sublimentur Flores. Repetatur Operatio quamdiu charta nullo inquinatur Oleo.

FLORES SALIS AMMONIACI SIMPLICES.

Vid. Sal Ammoniacum depuratum.

FLORES SULPHURIS.

R. Sulphuris citrini triti quantum libet.

Injiciatur ollae terreae, cui superimponantur plura capitella terrea, & sublimentur Flores leni admodum igne, ne Sulphur accendatur. Flores in superioribus capitellis collecti penna abstergantur, atque Aqua fervida probe abluantur.

FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

R. Florum Sulphuris uncias duas,
Aloës hepaticae,
Myrrhae electae ana unciam unam,

Z Croci

Croci ſcrupulum unum.
Subtiliſſime conterantur & miſceantur.

FLORES VIRIDIS AERIS.

R. Viridis Aeris contuſi quantum lubet.

Affundatur Aceti ſextuplum, & digerantur in Vitro ad ſufficientem extractionem. Liquor tinctus effundatur vaſe inclinato, novumque affundatur Acetum, & digerantur ad omnis coloris extractionem. Liquores confuſi ac filtrati, leni igne evaporentur ad cuticulam, & cryſtalliſationi repetitis vicibus committantur.

FLORES ZINCI.

R. Zinci quantum volueris.

Fundatur in crucibulo igne aperto: Flores ſuperficiei Metalli innatantes cochleari aeneo vel argenteo eximantur, donec omne Metallum conſumtum fuerit.

FUNGUS PRAEPARATUS.

Agaricus e caudice Quercus collectus, a cortice externo albo & duro, nec non fiſtuloſa ſubſtantia ſeparatus, diſciſſus, mallei ictibus ſubmittatur, donec adeo molleſcat, ut in minores partes diſcerpi queat.

GALBANETUM PARACELSI.

R. Galbani libram unam,
Olei Terebinthinae libras duas.

Digerantur ſimul per unum alterumve diem, deinde retorta abſtrahatur Oleum coloris ex rubro coerulei.

GALBANUM DEPURATUM.

Tempore gelido conteratur Galbanum, & per cribrum trajiciatur.

GELATINA LIQUIRITIAE vulgo REGLISSE ROYALE.

R. Radicum Liquiritiae exſiccatarum & excorticatarum unciam unam, vel ſi recentes haberi poſſint, uncias quatuor.
Inciſae macerentur per noctem in
Aquae fontanae fervidae libris quinque.
In colatura ſolvantur
Gummi Arabici electi librae quinque,
Sacchari albi librae tres.

Colata coquantur ad dimidias. Ablata ſpuma effundatur Gelatina in Capſulas lamineas, Oleo Amygdalino illitas, & leni calore exſiccetur.

GUMMI AMMONIACUM DEPURATUM.

R. Gummi Ammoniaci ſemilibram,
Aquae purae libram unam.

In vaſe fictili vitreato leniter coquantur. Soluta colentur & exprimantur, leniſſimoque calore exſiccentur.

Nota. Si loco Aquae, Acetum ſimplex, vel ſcilliticum fuerit adhibitum, vocatur GUMMI AMMONIACUM ACETO SIMPLICI, aut SCILLITICO DEPURATUM.

GUMMI GUTTAE CORRECTUM.

R. Gummi Guttae triti uncias tres.
Solvantur in
Aceti Vini albi unciis novem.

 Poſt

Poſt ſufficientem digeſtionem liquor clarus vaſe inclinato effundatur, atque leni calore in vaſe vitreo ad extracti conſiſtentiam evaporetur.

HEPAR ANTIMONII.

R. Antimonii crudi,
Nitri ana partes aequales.

Seorſim in pulverem trita probe commiſceantur, ollae magnae, ſeu mortario ferreo injiciantur, atque ſub dio pruna admota accendantur. Facta detonatione materia refrigerata in pulverem redigatur.

HEPAR SULPHURIS.

R. Florum Sulphuris, vel Sulphuris flavi puriſſimi uncias quatuor,
Fluentibus in vaſe figulino vitreato ſucceſſive admiſceantur
Salis Tartari ſicciſſimi unciae duae.

Diligenter agitentur ſpatula, donec maſſa rubeſcat, cavendo ne accendatur.

* HYDROMEL SIMPLEX.

R. Mellis deſpumati uncias duas,
Aquae fontanae libras duas.

Coquantur & deſpumentur donec ſesquilibra remanſerit; tum colentur.

INFUSUM LAXATIVUM VIENNENSE.

Vid. Aqua laxativa Viennensis.

* JULA-

* JULAPIUM e CAMPHORA.

R. Camphorae drachmam unam.
Cum aliquot Spiritus Vini guttulis tritae admiſceantur
Gummi Arabici in mucilaginem ope Aquae redacti drachmae duae.
Exacte miſtis paulatim affundatur
Aceti Vini libra una,
Addendo demum
Sacchari albi ſemunciam.

* JULAPIUM ROSATUM.

R. Sacchari albi uncias ſedecim,
Aquae Roſarum fragrantis uncias novem.
Soluta poſt unam alteramve ebullitionem colentur.

KERMES MINERALE.

R. Antimonii Hungarici in pulverem redacti libras tres,
Nitri fixi uncias triginta,
Aquae fontanae puriſſimae libras quindecim.

Coquantur in vaſe terreo vitreato per bihorium, deinde filtrentur. Qui liquori refrigerato atque quieſcenti excidit pulvis ruber, per chartam emporeticam ſeparetur, atque nova Aqua aliquoties ablutus, ſiccetur. Liquor filtratus nova Aqua auctus, reſiduo Antimonio iterum affundatur, iterumque coquatur, filtretur &c. quod repetendum, quamdiu ſimilis obtinetur pulvis.

LAC SULPHURIS.

R. Florum Sulphuris ſemilibram,
Salis Sodae ſesquilibram.

Coquantur cum Aqua ſimplici in vaſe terreo vitreato, donec major pars Sulphuris ſoluta fuerit. Solutioni calidae filtratae inſtilletur Acetum deſtillatum. Pulvis inde praecipitatus aqua pura abluatur atque ſiccetur.

LAC VIRGINIS.

R. Aluminis crudi uncias duas,
Aquae fontanae libram unam.
Solutis admiſceatur
Aceti Lithargyrii ſemilibra.

LAPIDIS CALAMINARIS PRAEPARATIO.

R. Lapidis calaminaris electi quantum volueris.

Repetitis vicibus in crucibulo candeſcat, & Aqua communi exſtinguatur. Deinde ſuper porphyritem admiſta Aqua laevigetur.

LAPIDES CANCRORUM CITRATI.

R. Lapidum Cancrorum Aqua calida optime ablutorum quantum placet.

Redigantur in pollinem ſubtiliſſimum, cui in vaſe vitreo paulatim affundatur

Succi Citri recentis depurati quantum ſufficit,

donec non amplius efferveſcant. Tum leni calore ſub continua agitatione plane exſiccentur & in pulverem terantur.

LAPIDES CANCRORUM PRAEPARATI.

Lapides Cancrorum Aqua fontana aliquoties abluti, & iterum ſiccati, in pollinem terantur, atque per linteum trajiciantur.

LAPIS DIVINUS.

R. Nitri puri,
Vitrioli coerulei,
Aluminis crudi ana uncias octo.
Contrita & miſta fluant in crucibulo, quibus ſub finem addatur
Camphorae tritae ſemuncia.
Rite agitata refrigerentur.

LAPIS INFERNALIS.

R. Argenti probe cupellati quantum volueris,
Spiritus Nitri concentratiſſimi triplum.
Facta in phiala balneo arenae commiſſa ſolutio, evaporetur ad tertias; tum ex crucibulo amplo leni igne exhalet humiditas. Maſſa dein immittatur tigillo capaci, & modico igne ulterius coquatur, donec ceſſante prima ebullitione, inſtar cerae fluat, quo facto ſubito in fiſtulas ferreas calefactas, panno laneo, pauxillo olei imbuto, inunctas effundatur, refrigerata exſiccetur, & contra aëris acceſſum muniatur.

LAPIDES PRUNELLAE.

R. Nitri puri libram unam.
Leni igne fluenti adjiciatur ſucceſſive

Sulphu-

Sulphuris citrini triti drachma una.

Facta deflagratione, Nitrum pellucide fluens in rotulas effundatur.

LAUDANUM LIQUIDUM.

R. Extracti Opii uncias duas,
Croci Austriaci semunciam,
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum aromaticorum ana drachmam unam.
In pulverem trita infundantur
Vini Hispanici librae uni.
Post triduum vel quatriduum colentur & exprimantur.

LIMATURA MARTIS PRAEPARATA.

Vid. Chalybs praeparatus.

LIQUIRITIA COCTA CITRINA.

R. Sacchari albi libram unam,
Pulveris Radicis Liquiritiae unciam unam,
Iridis Florentinae drachmas duas,
Croci drachmam unam.
Mixta redigantur in massam cum
Mucilaginis Gummi Tragacanthae sufficiente quantitate.
Formentur inde bacilli supra cribrum siccandi.

LIQUIRITIA PELLUCIDA.

Vid. Gelatina Liquiritiae.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

R. Spiritus Vini rectificatiſſimi libras quatuor.
Guttatim inſtillando admiſceantur
Olei Vitrioli glacialis unciae octo.

In balneo Arenae per quadraginta octo horas digeſta, deſtillentur leniſſimo igne, donec bullae in retorta conſpiciantur. Si ulterius protrahitur deſtillatio, liquori alias grato & fragranti, conciliabitur odor ſulphureus ingratus.

Nota. Compendioſius paratur hic Liquor, e Naphthae Vitrioli parte una, cum Spiritus Vini rectificatiſſimi partibus novem.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

R. Salis Succini depurati unciam unam,
Spiritus Cornu Cervi rectificati quantum ſufficit ad ſaturationem.

Digerantur & rectificentur,

LIQUOR, ſeu LIQUAMEN MYRRHAE.

Myrrha electa ſolvatur in Hydromellite, quantum admittit.

LIQUOR NITRI FIXI.

R. Nitri puri quantum volueris.
In crucibulo capaci fluenti cochleatim adjiciatur
Carbonum contritorum quantum ſufficit.

Deflagratione facta, materia refrigeretur, & ſacculo linteo incluſa in cella ſuſpendatur; liquor autem deſtillans in patina ſuppoſita excipiatur.

LIQUOR PRAECIPITANS.

R. Salis Alcali depurati uncias duas,
Ammoniaci unciam unam,
Aquae fontanae libram unam.
Solvantur & filtrentur.

LIQUOR TERRAE FOLIATAE TARTARI.

Terra foliata Tartari ſacculo linteo incluſa ſuſpendatur in cella, ſtillansque liquor vitro exceptus filtretur.

LIQUOR TERRAE FOLIATAE TARTARI SPIRITUOSUS.

R. Terrae foliatae Tartari uncias duas,
Spiritus Vini uncias ſex.
Soluta filtrentur.

* LOOH PULMONALE, vulgo DE PULMONE VULPIS.

R. Succi Liquiritiae, in Aqua Foeniculi ſoluti uncias octo,
Pulveris Herbae Capillorum Veneris,
Seminis Foeniculi,
Aniſi ana uncias quatuor,
Sacchari clarificati libras ſex.
Miſceantur.

* LOOH SANUM ET EXPERTUM.

R. Gummi Tragacanthae,
Arabici ana ſemunciam,

Radicum

Radicum Iridis Florentinae drachmas duas,
Liquiritiae excorticatarum drachmas tres,
Sacchari albi libras duas.
Mixtis & in pollinem tritis admiſceatur Emulſio ex
Amygdalarum dulcium excorticatarum uncia una,
Aquae Foeniculi,
Aniſi ana ſemilibra.
Redigantur leni calore in Looh.

LUMBRICORUM TERRESTRIUM PRAEPARATIO.

Lumbrici vivi, Vino probe abluti, filo ſuſpenſi, ſiccentur & in pulverem terantur.

MAGNESIA ALBA.

R. Salis cathartici amari quantum volueris.

Solvatur in Aquae ſimplicis quantitate ſufficiente. Solutioni filtratae inſtilletur lixivium Alcali fixi depurati filtratum, donec non amplius lacteſcat. Pulvis inde excuſſus abluatur aqua tum calida tum frigida, atque ſiccetur.

MANNA TABULATA.

R. Mannae Calabrinae libram unam,
Aquae fontanae uncias quatuor.

Soluta leni igne evaporentur ad Tabulati conſiſtentiam; ab igne remota aliquantulum agitentur & effundantur.

MANNA TARTARISATA.

R. Mannae Calabrinae libram unam,
Aquae fontanae uncias ſex.

Solutis & ad Tabulati conſiſtentiam evaporatis addatur

Cremoris Tartari ſescuncia.

Formentur inde Morſuli.

MEL DESPUMATUM.

Mel commune cum Aquae puriſſimae quarta parte coctum, atque probe deſpumatum, per laneum colum trajiciatur, & ad Syrupi conſiſtentiam coquatur.

MEL ROSATUM.

R. Mellis deſpumati quantum libet.

Cum Aquae Roſarum quarta parte coctum & deſpumatum, coletur & ad Syrupi conſiſtentiam coquatur.

MERCURIUS DULCIS VULGARIS ET PANACEA, ſeu CALOMEL.

R. Mercurii ſublimati corroſivi,

Vivi ana partes aequales.

Terantur exactiſſime & diutiſſime invicem, donec nulli Mercurii globuli conſpiciantur, & mixtura colorem cinereum referat. Immittantur cucurbitae, ut ejus fundum non ultra tres quatuorve digitos ſuperent; hinc balneo Arenae commiſſa ſublimentur. Ex ſublimato ea pars auferatur, quae tentamine perfecte dulcificata & pura deprehenditur, & ſervetur ſub titulo *Mercurii dulcis primae ſublimationis.* Reliqua pars in pulverem iterum trita, iterumque ſublimata, ſimili modo ſeparetur, donec tota maſſa in Mercurium perfecte dulcificatum mutata fuerit. Cognoſcitur autem perfecta dulcificatio, inſtillando Aquam Calcis vivae ſaturatam, unde corroſiva

rofiva portio flavefcit, dulcificata nigrefcit. Mercurius dulcis fex fublimationibus paratus, fervetur fub titulo CALOMELAS, aut PANACEAE MERCURIALIS.

MERCURIUS PRAECIPITATUS ALBUS.

R. Mercurii corrofivi fublimati,
Salis Ammoniaci ana partes aequales.

In Aqua fimul folutis ac filtratis inftilletur folutio Salis alicujus alcalini fixi; pulvis inde excuffus abluatur ad perfectam dulcedinem.

MERCURIUS PRAECIPITATUS LUTEUS.

Vid. TURPETHUM MINERALE.

MERCURIUS PRAECIPITATUS RUBER.

R. Mercurii vivi libram unam,
Spiritus Nitri libras duas.

Soluta ex retorta abftrahantur ad ficcitatem, igne poftremo in tantum aucto, donec Mercurius in fundo retortae aequaliter induxerit rubrum fplendidumque colorem.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

R. Mercurii vivi libras quinque,
Olei Vitrioli Anglici libras tres.

Abftracto per retortam liquore ad ficcitatem, maffae refiduae albae in mortario vitreo admifceantur

Salis marini decrepitati librae quatuor cum dimidia.

Sublimentur in Cucurbita capaci, alembico inftructa.

MILLEPEDUM PRAEPARATIO.

Millepedes panno cannabino rariori inclufi, fufpendantur in vafe claufo fuper fpiritum Vini calefactum, ut a vapore necati friabiles reddantur

MIXTURA RESOLVENS.

R. Tincturae Antimonii Tartarifatae,
Effentiae Pimpinellae albae,
Succini ana uncias duas,
Saponis Hifpanici femunciam.
Solvantur.

MIXTURA SIMPLEX CAMPHORATA.

R. Spiritus diatrion rectificati unciam unam,
Camphorae Grana decem.
Mifceantur.

MIXTURA SIMPLEX NON RECTIFICATA.

R. Spiritus theriacalis uncias decem,
Tartari rectificati uncias fex,
Olei Vitrioli concentrati drachmas fex.
Mifceantur.

MIXTURA SIMPLEX RECTIFICATA.

Vid. Spiritus diatrion.

MIX-

MIXTURA TONICO-NERVINA.

R. Tincturae Antimonii tartarifatae uncias duas,
Spiritus Cornu Cervi rectificati unciam unam.
Mifceantur.

MORSULI ANTIMONIALES.

R. Antimonii praeparati drachmas tres,
Amygdalarum dulcium excorticatarum femunciam,
Elaeofacchari Citri drachmam unam.
Immifceantur
Sacchari albi, in Aqua Cinnamomi foluti & ad debitam confiftentiam cocti unciis tribus cum dimidia.
Formentur inde Morfuli drachmae unius ponderis.

MORSULI ROSARUM PURGANTES.

R. Sacchari albi in Aqua Rofarum foluti uncias tredecim.
Ad confiftentiam Tabulati coctis, nec plane refrigeratis immifceantur
Pulveris Radicum Jalappae unciae duae,
Santali rubri femuncia,
Diagrydii praeparati drachmae duae.
Formentur inde Morfuli, ponderis drachmae unius.

MORSULI STOMACHICI.

R. Sacchari albi uncias fedecim.
Solvantur in Aquae Rofarum fufficiente quantitate, & coquantur ad Tabulati confiftentiam; ab igne remotis, fervore paululum remittente, commifceantur minutim concifa ac mixta,

Amyg-

Amygdalarum dulcium excorticatarum ſescuncia,
Piſtaciarum mundatarum ſemuncia,
Corticum Citri conditorum,
Pulpae Citri conditae ana uncia una,
Specierum pro Morſulis ſtomachicis ſemuncia.

MORSULI CONTRA VERMES.

R. Seminis Santonici,
Muſci corallini ana ſemunciam,
Aethiopis mineralis,
Radicis Jalappae ana drachmas tres,
Cinnamomi drachmas duas.
In pulverem redacta immiſceantur
Sacchari albi, in Aqua Roſarum ſoluti & ad conſiſtentiam Tabulati cocti unciis ſeptem,
& formentur inde Morſuli.

NAPHTHA NITRI.

R. Aquae fortis concentratae,
Spiritus Vini rectificatiſſimi ana partes, ad menſuram, non ad pondus, aequales.

Aqua fortis infundatur phialae epiſtomio vitreo munitae; tum inſtilletur Spiritus paulatim & caute ad marginem vaſis, adeo ut non invicem commiſceantur, ſed Spiritus ſupernatet. Relinquantur in loco frigido per quatriduum. Sic ſponte Naphtha inſtar Olei ſuperne prodens ſeparabitur, quae aquae ſuperfuſa & ſic ab acido liberata, in vaſe vitreo, obturaculo vitreo munito, ſervetur.

NAPHTHA

NAPHTHA VITRIOLI.

R. Olei Vitrioli glacialis,
Spiritus Vini rectificatiſſimi ana libras tres.

Oleum caute ac paulatim inſtilletur Spiritui; facta per biduum digeſtione, ex retorta leni igne deſtillentur primum unciae ſex, quae ſeorſim ſervatae, ad parandum Liquorem anodynum mineralem inſervire poſſunt, loco Alcoholis. Tum recipiente iterum adaptato continuetur deſtillatio caute ac leni igne, ne adſcendat maſſa, donec appareant ſtriae in recipiente & bullulae in retorta. Deſtillatus liquor commiſceatur cum dupla aquae quantitate; ſic ſeparatur Naphtha, quae Aquae ſuperfuſa ab Acido liberata, ſervanda eſt ſicut Naphtha Nitri. Si reſiduo in retorta dimidium additur Spiritus Vini, & idem proceſſus denuo inſtituitur, adhuc aliquid Naphthae Vitrioli obtineri poterit. Quod ſi Naphtha Vitrioli ſulphurei odoris tranſcendat, illa miſceatur cum parte circiter decima Spiritus Salis Ammoniaci aquoſi cum Alcali parati, agitetur ſaepius, donec empyrevma penitus fuerit ſublatum, quo facto ambo liquores a ſe invicem lege artis ſeparentur.

NITRUM ANTIMONIATUM.

Paratur Aquam, in qua Antimonium diaphoreticum poſt detonationem ſolutum fuit, per ſubſidentiam depurando, iteratis vicibus filtrando, ad lenem ignem evaporando & ad cryſtalliſationem reponendo.

NITRUM DEPURATUM.

Nitrum leni calore ſolvatur in Aqua fontana, ſolutio evaporetur ad cuticulam, coletur, & cryſtalliſationi relinquatur. Iterari poteſt evaporatio, ubi tamen notandum, quod primae cryſtalli, a ſale communi liberrimae, ſeorſim ſervandae ſint.

NITRUM FIXUM.

Paratur uti ſub titulo LIQUORIS NITRI FIXI dictum eſt.

NITRUM TABULATUM.

Vid. LAPIDES PRUNELLAE.

OFFA HELMONTII.

R. Spiritus Salis Ammoniaci cum Alcali parati concentratisſimi quantum libet.

Inſtilletur lentiſſime ac in loco frigido Spiritus Vini puriſſimi frigidi quantum ſufficit, ut naſcatur coagulum.

OLEA.

CANONES.

I. TEMPUS macerationis Vegetabilium ad *Olea eſſentialia* adhibendorum, varium eſt pro ratione texturae & compagis. Tenerrima vix ullam, tenuia molliaque duarum triumve dierum, viſcoſa longiorem requirunt macerationem.

II. MISCELA doloſa Oleorum eſſentialium cum Spiritu Vini, Oleo expreſſo aut Terebinthina, detegitur admiſta Aqua, unde lacteſcunt cum Spiritu Vini adulterata, & non praeci-

praecipitantur ſi Oleum expreſſum contineant. Terebinthina affuſo Spiritu Vini rectificatiſſimo praeceps data, ſe prodit.

III. Quoad *Olea empyrevmatica*, eorumque rectificationem, proceſſus *Olei animalis* Dippelii pro norma inſerviat.

IV. Oleorum *infuſorum & coctorum* parandorum methodus ſub *Oleo Abſynthii* traditur. Praeſtantiora evadunt, ſi poſt expreſſionem certa quantitas Olei eſſentialis ejusdem plantae adjiciatur.

V. Quae pro uſu interno deſiderantur *Olea expreſſa*, frigido ſubjicienda ſunt praelo. Semina vero Hyoſcyami, Lini &c. recentia & in aëre ſiccata pro expreſſione Olei adhibeantur, ea cum cautela, ut laminae ferreae, quibus ſubjiciuntur, aqua calida immerſae parum incaleſcant. De *Olei Amygdalarum* expreſſione, quae ſine calore peragitur, notandum, quod Amygdalae non affuſa aqua calida, ſed vel exſiccatione in aëre ventis perflato & tritura inter pannum rugoſum; vel plane non ab epidermide liberandae ſint.

OLEA ESSENTIALIA.

OLEUM ABSYNTHII.

R. Foliorum ac Florum Abſynthii in umbra fere ſiccatorum & inciſorum libras decem,
Aquae ſimplicis libras ſexaginta,
Salis culinaris uncias quatuor.

Per dies duodecim, aut quatuordecim macerata, deſtillentur e Veſica ad tertiam partem repleta, oleumque aquae innatans ſeparetur.

Eodem modo parantur:

OLEUM ANTHOS.

CHAMOMILLAE ROMANAE.

VULGARIS.

LAVENDULAE.

de quo notandum, quod Flores recentes, ſine praevia maceratione ſint adhibendi.

MAJORANAE.

MELISSAE TURCICAE.

MENTHAE.

MENTHAE PIPERITIDIS.

MILLEFOLII e FLORIBUS.

ORIGANI.

RUTAE.

SABINAE.

SALVIAE.

TANACETI.

THYMI.

OLEUM ANETHI.

R. Seminis Anethi contuſi libras quatuor,
Aquae ſimplicis libras ſedecim.

Per triduum macerata deſtillentur e veſica. Oleum ab aqua ſeparetur.

Simili ratione parantur:

OLEUM BACCARUM JUNIPERI.

SEMINUM AMOMI, ſeu PIPERIS JAMAICENSIS.

OLEUM

Oleum seminum Angelicae.
Anisi stellati.
Cardamomi.
Carvi.
Cumini.
Foeniculi.
Petroselini.
Piperis Vulgaris.

OLEUM CALAMI AROMATICI.

R. Corticum Radicum Calami aromatici, in umbra leniuſcule ſiccatorum, minutim conciſorum libras decem,
Aquae ſimplicis puriſſimae libras ſexaginta.

Per octiduum macerata deſtillentur e Veſica, oleumque aquae innatans ſeparetur.

Eadem encheireſi deſtillantur:

Oleum Corticis Ligni sassafras.
Ligni Juniperi.
Rhodii.
Nucis moschatae.
Radicis Zedoariae.

OLEUM CARYOPHYLLORUM.

R. Caryophyllorum aromaticorum contuſorum libras duas,
Salis communis uncias quatuor,
Aquae ſimplicis libras duodecim.

In loco calido per quatriduum macerata deſtillentur per retortam. Poſt quietem aliquot dierum, Oleum in fundo haerens ſeparetur cauta aquae effuſione.

Nota. Ad deſtillationem hujus olei valde gravis & in Aqua ſubſidentis, paulo fortior requiritur ignis gradus. Praeſtat igitur non adeo magnam portionem pro tempore deſtillationi ſubjicere, ne diuturniore ignis adminiſtratione pars olei deſtruatur. Neque unica deſtillatione omne oleum exhauritur. Bis igitur, vel ter repeti poteſt, ſuperfundendo aquam, de qua oleum ſeparatum fuit.

OLEUM CINNAMOMI.

R. Corticis Cinnamomi electi contuſi libras duas,
Salis communis uncias quatuor,
Aquae ſimplicis libras duodecim.

Per quatriduum in loco calido macerata deſtillentur per retortam, & poſt quietem trium vel quatuor ſeptimanarum, Oleum ſubſidens cauta aquae decantatione ſeparetur.

Eodem modo parantur:

Oleum Cubebarum.
Culilavan.

OLEUM CORTICUM AURANTIORUM.

R. Corticum extimorum Aurantiorum recentium libras duas,
Aquae ſimplicis libras duodecim.

Absque

Absque praevia maceratione deſtillentur, & Oleum Aquae innatans ſeparetur.

Eadem methodo paratur:

Oleum Corticum Citri.

Nota. Huic utiliter ſubſtituitur *Oleum de Cedro.*

OLEA EMPYREVMATICA.

OLEUM ANIMALE DIPPELII.

R. Olei Cornu Cervi quantum ſufficit, ut retorta vitrea ad dimidium repleatur.

Fiat deſtillatio ad ignem lenem, & protrahatur, quamdiu Oleum prodit fluidum. Tum affuſo triplo Aquae, quinquies repetatur deſtillatio, mutato ſemper recipiente, donec limpidum, album atque odore gratius evadat oleum. Quod ſi mora temporis obſcuriorem acquiſiverit colorem, novae deſtillationi admiſta aqua ſubjiciendum eſt. Oleum hoc rectificatum diſtribuatur per vaſcula vitrea drachmam continentia, quae probe obturata ſub aqua ſervanda ſunt.

OLEUM BUXI.

R. Ligni Buxi in ſcobem redacti quantum volueris.

Immittatur retortae ferreae & per gradus ex igne aperto vel arenae deſtilletur. Refrigeratis omnibus, oleum in fundo haerens a reliquo liquore ſeparetur, ac rectificetur.

OLEUM CAMPHORAE.

R. Camphorae tritae uncias tres,
Spiritus Nitri uncias ſex.

Digeran-

Digerantur in Vaſe probe obturato. Facta ſolutione oleum ſupernatans ſeparetur.

OLEUM CERAE.

R. Cerae flavae quantum volueris.

Liquata cum Arenae duplo immittatur retortae ac deſtilletur. Poſt liquorem acidum prodit Oleum craſſum collo adhaerens, niſi prunis admotis incaleſcat. Rectificatur in Oleum tenue, ſi aliquoties per ſe deſtilletur ex arena.

OLEUM CORNU CERVI FOETIDUM.

Obtinetur deſtillatione SPIRITUS CORNU CERVI, qui videndus eſt.

OLEUM FULIGINIS.

Elicitur una cum SPIRITU FULIGINIS, qui videatur.

OLEUM LIGNI GUAJACI.

Paratur inſtar *Olei Buxi.*

OLEUM LATERITIUM VULGO PHILOSOPHORUM.

R. Olei Olivarum quantum libet.

Imbibatur vel lateribus contuſis, vel Cineribus, vel Calce viva, vel quod praeſtat, pulvere Carbonum duriorum; deſtilletur per retortam & rectificetur.

OLEUM SUCCINI.

R. Succini raſi quantum volueris.

Mixtum

Mixtum cum Arena, vel, ſi Capite mortuo uti placet, per ſe deſtilletur, igne gradatim aucto. Primo exſtillabit *Spiritus* cum pauco Oleo flavo, dein *Oleum flavum*, cum pauco Sale, tum demum plus Salis cum Oleo ſubrubro. Liquor e recipiente effundatur, & *Sal* a lateribus collectus, atque inter plicas chartae emporeticae compreſſus exſiccetur. Tum Spiritus ab Oleo ſeparetur, Oleumque deſtillatione cum Muria Salis marini e cucurbita vitrea rectificetur.

OLEUM TARTARI FOETIDUM.

Obtinetur una cum SPIRITU TARTARI, qui videatur.

OLEUM TEREBINTHINAE.

Vid. SPIRITUS TEREBINTHINAE.

OLEUM VITRIOLI.

R. Vitrioli quantum volueris.

Leni calore ad flavedinem calcinatum e retorta terrea igne reverberii, per octiduum circiter continuato, deſtilletur. Phlegma & Spiritus ſeparatim excipiantur. Oleum, quod demum glaciei forma prodit, ab aëre ſollicite cuſtodiatur.

Nota. Raro apud nos deſtillatur. Utimur plerumque Oleo Vitrioli apud Altonavienſes parato; & ſi debilius requiritur, Anglicano.

OLEA COCTA, EXPRESSA, INFUSA, COMPOSITA ET PER DELIQUIUM PARATA.

OLEUM ABSYNTHII COCTUM.

R. Foliorum Abſynthii juniorum recentium libram unam. Inciſa & contuſa infundantur

Olei Olivarum libris duabus.

Digeſta per triduum leni igne, ſub continua agitatione cum ſpatula lignea, coquantur ad omnem humiditatis conſumtionem, quod exploratur, ſi hujus magmatis aliquantulum in prunas dejectum, ſtatim absque ſibilo aut ſtrepitu flammam concipit. Tunc cito ab igne removeatur, ſacco ingeratur, & ſub prelo calefacto omne Oleum eliciatur, quod poſt quietam refrigerationem a faecibus decantandum eſt.

Ad hanc normam parantur:

Oleum coctum Anethi.
Chamomillae.
Menthae.
Rosatum.
Rutae.
Verbasci.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

R. Amygdalarum amararum non rancidarum quantum volueris.

In pulverem groſſum redactis, ac ſacculo linteo incluſis, ſub prelo omne eliciatur Oleum.

Eodem modo parantur:

Oleum Amygdalarum dulcium.
Hyoscyami Seminis.
Lini Seminis.

Nota.

Nota. Poſteriora duo calide ſunt exprimenda.

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Camphorae partem unam,
Olei Amygdalarum dulcium partes quatuor.
Terendo ſolvantur.

OLEUM CARMINATIVUM.

R. Olei ſtillatitii Chamomillae,
Menthae ana uncias duas,
Carvi,
Cumini,
Foeniculi ana ſemidrachmam.
Miſceantur.

OLEUM COLOCYNTHIDIS.

R. Herbae Abſynthii,
Rutae ana uncias quatuor,
Fructus Colocynthidis uncias duas,
Radicis Hellebori nigri unciam unam.
Inciſis & contuſis affundantur
Olei Olivarum librae quatuor,
Vini albi ſemilibra.
Coquantur leni igne ad humidi evaporationem. Expreſſa colentur.

OLEUM HYPERICI.

R. Florum Hyperici adhuc in gemmis, a foliis circumdantibus bene mundatorum, contuſorum libras duas,

Vini albi ſemilibram,

Olei Olivarum libras quatuor.

Per triduum macerata decoquantur leni igne, ad omnem humidi conſumtionem. Expreſſis addantur

Terebinthinae unciae duae.

OLEUM LILIORUM ALBORUM.

R. Florum Liliorum alborum absque Antheris,

Olei Olivarum ana partes aequales.

Per aliquot dies macerata, ad calorem ſolis digerantur.

OLEUM MYRRHAE.

Vid. Liquor, ſeu Liquamen Myrrhae.

OLEUM NUCIS MOSCHATAE.

Nuces moſchatae contuſae Aquae calidae vapore irrigantur, & dum adhuc calent, Oleum exprimitur.

OLEUM OVORUM.

R. Ovorum recentium ad duritiem coctorum quot volueris.

Vitelli exemti, contriti & in ſartagine ad ruffedinem, vel pinguedinis exſudationem aſſati adhuc fervidi, ſacculo linteo includantur, atque ſub prelo calido exprimatur Oleum.

OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

R. Salis Tartari quantum libet.

In ſacculo linteo incluſum ſuſpendatur in cella, atque liquor deſtillans in patina ſuppoſita excipiatur.

* OXYMEL PECTORALE.

R. Radicis Helenii unciam unam,
Iridis Florentinae ſemunciam.
Inciſa & contuſa coquantur ex
Aquae fontanae libris tribus.
Colaturae ſubſidentia depuratae libris duabus addantur
Mellis deſpumati libra una,
Gummi ammoniaci in octuplo Aceti ſoluti unciam unam.
Coquendo miſceantur.

OXYMEL SCILLITICUM.

R. Mellis deſpumati libras duas,
Aceti ſcilliciti libram unam.
Coquantur in vaſe figulino vitreato ad Syrupi conſiſtentiam.

OXYMEL SIMPLEX.

R. Mellis deſpumati libras duas,
Aceti Vini albi libram unam.
Coquantur ad Syrupi conſiſtentiam.

PANACEA MERCURIALIS.

Vid. Mercurius dulcis.

PANIS CYDONIORUM.

R. Malorum Cydoniorum quot volueris.

Cortice detracto, & seminibus exemtis, coquantur in Aqua purissima. Pulpae per cribrum trajectae addatur
Sacchari albi dimidia pars.
Evaporent ad justam consistentiam.

PASSULAE LAXATIVAE.

R. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Coquantur ex
Aquae simplicis unciis decem.
Sub finem coctionis addantur
Zingiberis,
Cinnamomi ana sesquidrachma.
Expressa ebulliant cum
Sacchari albi libra una.
Syrupus colatus superfundatur
Passularum minorum librae uni.

PASTA ALTHEAE.

R. Radicum Altheae in taleolos dissectarum uncias quatuor,
Aquae fontanae libras octo.
Ad dimidiae partis consumtionem ebulliant. In colatura solvantur
Gummi Arabici albissimi ac purissimi,
Sacchari albi ana librae duae cum dimidia.
Colata lento igne ad spissitudinem Extracti evaporent, continua sub agitatione. Ab igne remotis ac celeriter agitatis inspergantur paulatim
Albumen in spumam conquassatum e viginti Ovis recentibus,

Aquae

Aquae Naphae odoratiſſimae unciae quatuor.

Lento calore, perpetuaque ſub agitatione inſpiſſentur, donec manui non amplius adhaereſcant. Formentur inde Paſtae, Amyli pulvere conſpergendae.

PILULAE.

Canones.

I. Conferantur Canones pro Pulveribus.

II. Gummi & Succi inſpiſſati molleſcant prius, affundendo liquorem praeſcriptum, additisque ſenſim Pulveribus & repetita contuſione perficiatur Maſſa.

III. Serventur Maſſae pilulares in veſicis, liquore quocum perficiuntur, aut Oleo aromatico idoneo ſubinde obliinendis.

PILULAE AETHIOPICAE.

R. Mercurii vivi drachmas ſex,
Saponis albi Hiſpanici,
Reſinae Guajaci ana ſemunciam.

In mortario vitreo ad perfectam globulorum exſtinctionem tritis addatur

Sulphuris aurati Antimonii tertiae praecipitationis ſemuncia,
Syrupi communis quantum ſufficit, ut fiat Maſſa Pilularum.

PILULAE DE AMMONIACO.

R. Extracti Aloës gummoſi uncias duas,

Gummi

Gummi Ammoniaci in Aceto depurati ſescunciam,
Myrrhae electae,
Maſtichis,
Benzoës electae,
Rhabarbari ana drachmas duas,
Croci ſcrupulos duos.
Miſceantur in Maſſam pilularem.

PILULAE ANTIMONIALES.

R. Antimonii crudi in pulverem triti unciam unam,
Gummi Guajaci drachmas duas,
Extracti Fumariae quantum ſufficit, ut fiat Maſſa pilularis.

PILULAE APERIENTES STAHLII.

R. Extracti Aloës gummoſi unciam unam,
Panchymagogi ſemunciam,
Limaturae Martis tenuiſſime tritae drachmas duas.
Miſceantur in maſſam pilularem.

PILULAE BALSAMICAE STAHLII.

R. Gummi Hederae,
Juniperi ana uncias duas cum dimidia,
Extracti aquoſi Aloës,
Myrrhae ana uncias duas,
Rhei,
Hellebori nigri ana drachmas quinque,
Trifolii fibrini,
Abſynthii,

Cardui

Cardui benedicti ana drachmas quindecim,
Fumariae drachmas quinque,
Terebinthinae Venetae unciam unam.
Misceantur in Massam pilularem.

PILULAE CACHECTICAE.

R. Gummi Ammoniaci depurati drachmas sex,
Extracti Aloës aquosi semunciam,
Chalybis tenuissime triti drachmas quinque,
Olei stillatitii Caryophyllorum,
Anisi ana scrupulum dimidium,
Spiritus Vini quantum sufficit, ut fiat Massa pilularis.

PILULAE CATARRHALES PURGANTES.

R. Extracti panchymagogi unciam unam,
Mercurii dulcis semunciam,
Resinae Jalappae drachmam unam,
Olei stillatitii Corticum Aurantiorum guttas triginta.
Misceantur in Massam pilularem.

PILULAE CEPHALICAE.

R. Massae pilularis de Succino,
Extracti Rhabarbari aquosi,
Panchymagogi,
Resinae Jalappae cum Amygdalis tritae ana semunciam,
Spiritus Vini quantum sufficit, ut fiat Massa pilularis

PILULAE DE CICUTA.

E Cicutae Extracto formentur Pilulae granorum duorum ponderis, Pulvere Cicutae conspergendae.

PILULAE e COLOCYNTHIDE cum ALOE.

R. Aloës Socotorinae,
Scammonei ana uncias duas,
MedullaeColocynthidis unciam unam.
Singulis in pulverem redactis admiſceantur
Olei Caryophyllorum drachmae duae,
Syrupi de Spina Cervina quantum ſufficit, ut fiat Maſſa pilularis.

PILULAE DE CYNOGLOSSO.

R. Radicis Cynogloſſi ſemunciam,
Seminis Hyoſcyami albi drachmas duas,
Myrrhae electae drachmas ſex,
Thuris ſemunciam,
Styracis calamitae,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi,
Caſtorei,
Croci ana drachmas duas,
Extracti Opii ſemunciam.
Contritis admiſceatur
Syrupi Papaveris albi quantum ſufficit, ut fiat Maſſa pilularis.

Nota. Hujus maſſae ſingulae drachmae inſunt grana quatuor Extracti Opii, & grana duo Seminis Hyoſcyami.

PILULAE FOETIDAE.

R. Aſae foetidae ſesquidrachmam,
Camphorae ſemidrachmam.

Contuſis

Contuſis addantur
Caſtorei Ruſſici ſesquidrachma,
Olei Cornu Cervi deſtillati guttae viginti quatuor.
Miſceantur in Maſſam pilularem.

PILULAE DE GAMBOGIA.

R. Aloës Socotorinae,
Extracti Hellebori nigri,
Mercurii dulcis,
Gambogiae ana drachmas duas,
Olei deſtillati Juniperi ſemidrachmam,
Syrupi de Spina Cervina quantum ſufficit, ut fiat Maſſa pilularis.

PILULAE LAXANTES.

R. Maſſae pilularum balſamicarum Stahlii ſescunciam,
Extracti panchymagogi ſemunciam.
Miſceantur.

PILULAE LAXANTES CUM MERCURIO.

Vid. PILULAE CATARRHALES.

PILULAE MERCURIALES SIALAGOGAE.

R. Mercurii vivi uncias duas,
Balſami Sulphuris drachmas duas,
Ad exſtinctionem Globulorum tritis addatur
Gummi Guajaci uncia una,
Extracti Liquiritiae drachma una.
Fiat Maſſa pilularis.

PILULAE CONTRA OBSTRUCTIONEM.

Vid. PILULAE APERIENTES STAHLII.

PILULAE PICEAE.

R. Picis liquidae quantum libet,
Pulveris Radicis Helenii ſufficientem quantitatem, ut fiat
Maſſa pilularis.

PILULAE POLYCHRESTAE BALSAMICAE.

Vid. PILULAE BALSAMICAE.

PILULAE POLYCHRESTAE STARKEY.

R. Pulveris ſubtiliſſimi Radicis Liquiritiae,
Hellebori nigri,
albi,
Extracti Opii ana unciam unam,
Saponis Starkeyani nncias tres.
Miſceantur in Maſſam pilularem, in vaſe vitreo ſervandam.

PILULAE RUFI.

R. Aloës Socotrinae unciam unam,
Myrrhae,
Croci ana ſemunciam.
Contritis admiſceatur
Syrupi Foeniculi quantum ſufficit, ut fiat Maſſa pilularis.

PILULAE SAPONACEAE.

R. Saponis Veneti drachmas duas,
Rhei pulverati,

Myrrhae

Myrrhae electae ana drachmam unam.
Miſceantur in Maſſam pilularem.

PILULAE SCILLITICAE.

R. Saponis Veneti unciam unam,
Gummi Ammoniaci,
Millepedum praeparatarum,
Scillae praeparatae ana ſemunciam,
Balſami de Copaiba drachmam unam.
Miſceantur in Maſſam pilularem.

PILULAE DE STYRACE.

R. Styracis calamitae ſemunciam,
Succi Liquiritiae depurati drachmas tres,
Olibani electi,
Benzoës,
Maſtichis ana drachmas duas,
Extracti Opii,
Croci Orientalis ana drachmam unam,
Eſſentiae Succini quantum ſufficit, ut fiat Maſſa pilularis, cujus grana tredecim continent Opii circiter granum unum.

PILULAE DE SUCCINO.

R. Succini praeparati ſeſcunciam,
Maſtichis unciam unam,
Aloës depuratae uncias duas cum dimidia,
Radicis Ariſtolochiae rotundae verae drachmas duas,
Eſſentiae Succini quantum ſufficit.
Fiat Maſſa pilularis.

PLUMBUM USTUM.

R. Scobis Plumbi libras duas,
Sulphuris citrini libram unam.

Mixta in crucibulo, quod operculo obiter clauditur, calcinentur. Materia calcinata ſaepius abluatur, exſiccetur & in pulverem teratur.

PULPA CASSIAE.

Vid. Cassia extracta.

PULPA PASSULARUM MINORUM.

Paſſulae minores elotae coquantur ex Aquae communis quantitate ſufficiente. Coctae cribro inverſo excipiantur, atque omne pulpoſum exprimatur, ad conſiſtentiam mellis dein evaporandum, cujus ſingulis libris addantur

Sacchari albi unciae quatuor.

Leni igne demum ad juſtam conſiſtentiam evaporent.

Ad eandem normam parantur:

Pulpa Prunorum.
Tamarindorum.

PULVERES.

Canones.

I. Simplicia, quorum virtus facile avolat, uti Aromata quaedam, Radices Ari, Valerianae &c., nec non Salia, in nimis magna quantitate pulveriſata ſervanda non ſunt.

II. Te-

II. Tenaciora & humidiora prius ad lenem ſiccanda ſunt ignem, ea tamen cum cautela, ut volatilioribus particulis praedita thecis papyraceis incluſa ſiccentur. Sicciora e contra aquae guttis aliquot inter pulverandum aſpergenda ſunt.

III. Radices fibroſae, uti Altheae, Liquiritiae, Enulae &c., a Cortice exteriore liberatae & inciſae demum in Pulverem terantur. Rejiciatur vero omnne carioſum, mucidum, exeſum.

IV. Fructus oleoſi admiſtis ſiccioribus, v. g. Saccharo; Gummi-reſinae & Succi inſpiſſati, ad Balnei Maris calorem ſiccata, aut hyeme congelata; Camphora vero additis Guttis aliquot Spiritus Vini demum Pulveriſationem admittunt.

V. Medicamina purgantia, inprimis reſinoſa, nec non Mercurius dulcis, minus violenter agunt, ſi in ſubtiliſſimum terantur Pulverem.

PULVIS ABSORBENS NITRATUS.

R. Concharum praeparatarum uncias quatuor,
Nitri puriſſimi uncias duas.
Miſceantur.

PULVIS CONTRA ACREDINEM.

R. Concharum citratarum libram unam,
Antimonii diaphoretici ſemilibram.
Miſceantur.

PULVIS ALTERANS EDINBURGENSIUM.

R. Mercurii dulcis ſexies ſublimati quantum volueris.

Contrito

Contrito in mortario lapideo, ſub continua tritura admiſceantur paulatim

Sulphuris aurati Antimonii tertiae praecipitationis partes aequales.

PULVIS ANTISPASMODICUS STAHLII.

R. Nitri puriſſimi uncias quatuor,
Tartari vitriolati uncias duas,
Cinnabaris factitiae praeparatae ſemunciam.
Miſceantur.

PULVIS BEZOARDICUS.

R. Lapidum Cancrorum praeparatorum unciam unam,
Antimonii diaphoretici,
Radicis Contrayervae ana drachmas duas.
Contundendo & conterendo miſceantur.

PULVIS BEZOARDICUS RUBER.

R. Concharum citratarum,
Antimonii diaphoretici ana uncias duas,
Cinnabaris factitiae praeparatae,
Nitri depurati ana ſemunciam.
Miſceantur.

PULVIS CACHECTICUS.

R. Limaturae Martis ſubtiliſſimae unciam unam,
Radicum Ari praeparatarum,
Coralliorum rubrorum praeparatorum,

Cornu

Cornu Cervi ſine igne praeparati ana drachmas duas,
Cinnamomi acuti ſcrupulos quatuor,
Sacchari albi uncias duas.
Subtiliſſime trita miſceantur.

PULVIS CONTRAYERVAE COMPOSITUS.

R. Radicis Contrayervae drachmas ſex,
Serpentariae Virginianae drachmas duas,
Lapidum Cancrorum praeparatorum uncias duas.
Miſceantur in pulverem.

PULVIS CORDIALIS CELLENSIS.

R. Cinnabaris factitiae praeparatae drachmas ſex,
Sacchari Canarienſis drachmas octodecim,
Olei Cinnamomi drachmam unam.
Miſceantur, ut fiat pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS DENTIFRICIUS.

R. Pulveris Herbae Nicotianae unciam unam,
Radicis Lapathi acuti,
Iridis Florentinae,
Gummi Myrrhae ana drachmas duas,
Olei Caryophyllorum ſtillatitii ſesquidrachmam.
Miſceantur.

PULVIS DIGESTIVUS.

R. Tartari vitriolati uncias duas,
Concharum citratarum unciam unam,
Radicis Ari drachmas duas.
Miſceantur in pulverem ſubtiliſſimum.

Nota. Utiliter adjiciuntur Rhei drachmae duae.

PULVIS DYSENTERICUS.

R. Rhabarbari optimi unciam unam,
Cornu Cervi usti praeparati semunciam,
Gummi Arabici drachmas tres,
Corticum Cascarillae drachmas duas.
Misceantur iu pulverem subtilissimum.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

R. Radicum Poeoniae uncias quatuor,
Rasurae Cornu Cervi,
Lapidum Cancrorum,
Coralliorum rubrorum ana uncias tres,
Visci querni unciam unam.
Subtilissime tritis admisceantur
Foliorum Auri triginta.

PULVIS FUMALIS OPTIMUS.

R. Benzoës uncias decem,
Storacis calamitae uncias sex,
Ligni Rhodii rasi uncias quatuor,
Radicis Iridis Florentinae unciam unam,
Cinnamomi drachmas sex,
Caryophyllorum drachmas tres,
Olei Ligni Rhodii guttas quadraginta octo,
Cinnamomi guttas duodecim,
de Cedro guttas sedecim,
Moschi in Spiritu Rosarum soluti grana triginta duo.
Misceantur in pulverem grossiusculum.

PULVIS

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

R. Baccarum Juniperi libras duas,
Succini raſi ſesquilibram,
Florum Roſarum rubrarum,
Lavendulae,
Benzoës,
Maſtichis ana uncias octo,
Storacis calamitae,
Olibani,
Ligni Rhodii raſi ana uncias ſex,
Gummi Ladani uncias tres.
Inciſa & contuſa groſſo modo miſceantur.

PULVIS GALACTOPOEUS.

R. Magneſiae albae unciam unam,
Flavedinis Corticum Aurantiorum,
Seminis Foeniculi ana drachmam unam,
Sacchari albi drachmas duas.
Miſceantur, ut fiat pulvis.

PULVIS INFANTUM CUM RHEO.

R. Magneſiae albae,
Lapidum Cancrorum praeparatorum,
Elaeoſacchari Foeniculi ana ſemunciam,
Pulveris Rhabarbari unciam unam.
Miſceantur in pulverem.

PULVIS INFANTUM SINE RHEO, vulgo PULVIS PUERORUM CITRINUS.

R. Magneſiae albae drachmas ſex,

Radicis Iridis Florentinae,
Sacchari albi,
Seminis Anisi ana drachmas duas,
Croci drachmam unam.
Misceantur in pulverem.

PULVIS LAXANS.

R. Radicis Jalappae praeparatae uncias duas,
Tartari vitriolati unciam unam.
Misceantur in pulverem.

PULVIS PECTORALIS.

R. Radicis Iridis Florentinae,
Liquiritiae ana drachmas sex,
Florum Sulphuris semunciam,
Benzoës drachmam unam,
Sacchari candi albi uncias duas,
Olei stillatitii Foeniculi,
Anisi ana guttas decem.
Misceantur in pulverem subtilissimum.

PULVIS PUERORUM CITRINUS.

Vid. Pulvis infantum sine Rheo.

PULVIS REFRIGERANS.

R. Nitri depurati drachmas septem,
Crystallorum Tartari drachmas quatuor,
Elaeosacchari Citri e corticibus drachmas quindecim.
Misceantur in pulverem.

PULVIS

PULVIS SCILLAE COMPOSITUS.

R. Radicis Scillae praeparatae,
Vincetoxici praeparatae ana ſemilibram.
Miſceantur,

PULVIS STERNUTATORIUS.

R. Foliorum ſiccatorum Aſari,
Majoranae,
Mari Syriaci,
Florum ſiccatorum Lavendulae ana partes aequales.
Conterantur ſimul in pulverem.

PULVIS STOMACHICUS BIRCKMANNI.

R. Radicum Ari praeparatarum uncias duas,
Calami aromatici,
Pimpinellae albae ana unciam unam,
Lapidum Cancrorum praeparatorum ſemunciam,
Cinnamomi drachmas tres,
Salis Abſynthii drachmas duas.
Miſceantur, ut fiat Pulvis.

PULVIS TEMPERANS.

R. Lapidum Cancrorum citratorum uncias quatuor,
Arcani duplicati uncias duas cum dimidia,
Nitri puri drachmas novem,
Cinnabaris Antimonii ſemunciam.
Miſceantur in pulverem.

PULVIS VERMIFUGUS.

R. Florum Tanaceti,
Seminis Santonici ana drachmas tres,
Salis Martis drachmam unam.
Conterantur in pulverem.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

R. Clavorum ferreorum purgatorum uncias octo.
Candentibus in Crucibulo paulatim adjiciantur
Antimonii Hungarici unciae ſedecim,
Optime fuſis addantur
Nitri unciae tres.

Perfecte fuſa effundantur in conum ſebo illitum, ſub jugi hujus percuſſione. Maſſa refrigerata, Regulus a ſcoriis ſeparetur, qui minutim tritus, iterum ſecunda ac tertia vice, addita eadem Nitri quantitate, fundendus atque a ſcoriis ſeparandus eſt.

REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS.

R. Antimonii Hungarici uncias quatuor.
Fuſis in Crucibulo clauſo adjiciatur paulatim
Nitri puri ſicciſſimi contriti ſescuncia.

Poſt ſingulas Nitri additiones caute claudatur crucibulum. Maſſà per decem minuta fuſioni commiſſa, & in mortarium ferreum calidum effuſa pro *Tinctura Antimonii nigra* paranda inſervit.

RFGULUS ANTIMONII SIMPLEX.

R. Antimonii electi libras duas,
Tartari ſesquilibram,

Nitri

Nitri uncias ſedecim.

Mixta in crucibulo ignito deflagrentur; deinde fuſa in conum calefactum ſebo illitum ſub jugi concuſſione effundantur, Regulus a ſcoriis liberetur & Aqua abluatur.

REQUIES NICOLAI.

Vid. ELECTUARIUM PRO INFANTIBUS.

RESINA JALAPPAE.

R. Radicis Jalappae optime contuſae quantum volueris,
Spiritus Vini rectificati ſextuplum.

Digerantur in balneo Arenae, ut extrahatur tinctura. Repetatur digeſtio, donec omnis extracta fuerit Reſina. Tincturae filtratae e cucurbita vitrea leni calore ad dimidias deſtillentur. E reſiduo praecipitetur ope aquae affuſae Reſina, quae Aqua probe elota atque a gummoſa parte liberata, leniſſimo calore ſiccetur.

Eodem modo parentur:

RESINA GUAJACI (e Gummi potius paranda).
SCAMMONII.

RESINA PRAEPARATA JALAPPAE.

Reſina Jalappae cum aequali quantitate Amygdalarum dulcium excorticatarum in pulverem ſubtiliſſimum teratur.

Nota. Recens dum praeſcribitur paranda, non aſſervanda eſt.

ROOB BACCARUM JUNIPERI.

Baccae Juniperi recentes, maturae, conquaſſatae, coquantur in Aqua communi. Colata & expreſſa, addita Sacchari albi quarta parte, leni igne inſpiſſentur ad mellis conſiſtentiam.

ROOB MORORUM.

Mora recentia, matura, piſtillo ligneo in vaſe figulino conquaſſentur & exprimantur. Succo expreſſo addatur Sacchari albi dimidia pars, ſimulque coquantur in vaſe figulino, ad mellis conſiſtentiam.

Ad eandem normam parentur:

Roob Ribium.
Sambuci.

ROOB NUCUM.

R. Succi e Nucibus viridibus circa Feſtum Baptiſtae extracti,
Mellis deſpumati ana libram unam.
Coquantur ad juſtam conſiſtentiam, ſub finem addendo
Cinnamomi drachmas duas.

SACCHARUM CLARIFICATUM.

Vid. Syrupus communis.

SACCHARUM HORDEATUM.

R. Sacchari albi libram unam,

Decocti

Decocti Hordei concentrati Cerevisiariorum uncias sex.

Ebulliant leni igne. Ad debitam consistentiam cocta effundantur in tabulam marmoream, Oleo Amygdalarum illitam, & in bacillos vel tabulas formentur.

SACCHARUM LACTIS.

R. Seri Lactis dulcis, cum coagulo Lactis in ventriculo vituli reperiundo, vel cum Herba Pinguicula vulgari parati quantum volueris.

Evaporetur in vase vitreo ad pelliculam balneo maris. Reponatur in cella, ut concrescant crystalli, aqua frigida abluendae. Evaporatio iterum atque iterum repetatur, quo omnes obtineantur crystalli.

SACCHARUM PENIDIUM.

R. Sacchari farinacei albi libras duas,
Decocti Hordei uncias duodecim.

Coquantur ad consistentiam inter Saccharum hordeatum & Tabulatum mediam; effundantur eodem modo ac Saccharum hordeatum, addendo ante effusionem

Olei de Cedro guttas aliquot.

Massa contrectatione ductilis facta, diversimode in fila ducatur donec albescat. Contorta fila indurescant.

SACCHARUM ROSATUM.

R. Sacchari albissimi libram unam,
Aquae Rosarum fragrantissimae uncias quatuor.

Coquantur ad electuarii solidi consistentiam, effundantur super marmor & fiant Tabulae.

SACCHARUM SATURNI.

R. Minii libram unam,

Aceti Vini destillati libras octo.

Coquantur in vase plumbeo donec Acetum satis dulcescat. Colata evaporentur & crystallisationi committantur.

SAL ACETOSELLAE.

Ex Foliis Acetosellae recentibus exprimatur succus. Folia succo orbata eluantur aqua pura frigida, ut omne extrahatur Acidum. Succus cum isto lixivio confusus, subsidentia & colatura depuretur. Tunc lento igne ad Syrupi consistentiam evaporata, in cella reponantur, donec conspiciantur crystalli, aqua fontana molliter abluendae.

SAL AMMONIACUS DEPURATUS.

Sal ammoniacus crudus solvatur in Aquae calidae quintuplo. Filtrata in vase vitreo solutio evaporetur ad pelliculam & in cella reponatur, ut concrescant crystalli.

SAL CORNU CERVI VOLATILIS DEPURATUS.

R. Fragmentorum Cornu Cervi quantum libet.

Fiat destillatio igne gradatim aucto; adscendent Spiritus, Sal & Oleum. Oleo separato Sal & Spiritus simul misti iterum lenissimo calore & caute aliquoties destillentur, ut uterque purus evadat; Spiritus nempe instar Aquae limpidus gratique odoris, Sal autem candidissimus.

Citius absolvitur Salis depuratio, si a Spiritu separatus, primum ex aequali pondere Cretae purissimae, dein ex pauxillo Spiritus Vini rectificati sublimetur.

SAL

SAL DIGESTIVUS SYLVII.

R. Materiae a deſtillatione Spiritus Salis Ammoniaci cum Sale Alcalino ſuperſtitis uncias decem.

In Aqua calida ſoluta filtrentur, & ad cuticulam evaporata cryſtalliſationi exponantur.

SAL MARTIS.

Vid. Vitriolum Martis.

SAL MIRABILIS GLAUBERI.

Reſiduum Spiritus Salis Glauberiani calcinetur, donec fumi evaneſcant; ſolutum in Aqua calida filtretur, & ad pelliculam evaporatum in loco frigido reponatur, ubi in maſſam glacialem coire ſolet, quae repetitis vicibus ſoluta, filtrata, inſpiſſata, vitro magno excepta & quiete in loco frigido relicta, facile in pulcherrimas concreſcit cryſtallos.

SAL PLANTARUM.

R. Herbae Abſynthii aut alius, amarae inprimis vel aromaticae quantum volueris.

Exſiccatae in loco aperto comburantur ad ignem non adeo fortem. Cineribus adhuc calentibus affundatur Aqua. Relinquantur per horas aliquot, bacillo ſaepius agitando. Decantetur Aqua & nova aliquoties adjiciatur, donec nullum amplius prodat ſaporem ſalinum. Lixivia haec commixta ac filtrata inſpiſſentur in Cacabo ferreo ad ſiccitatem. Reſiduum exhibet *Sal lixivioſum*, informem referens maſſam, quae poſt novam ſolutionem filtretur & evaporetur. Servandus eſt Sal

in pyxide terrea aut in vitro, locoque calido, ne humidum attrahat, vel deliquefcat.

SAL POLYCHRESTUS DE SEIGNETTE.

R. Salis Sodae libram unam,
Aquae fontanae libras octo.
Soluta atque filtrata in vafe figulino ebulliant; inter bulliendum infpergatur
Cryftallorum Tartari quantum fufficit ad Saturationem.
Solutio filtrata, ad tertias evaporata, cryftallifationi committatur.

SAL PRUNELLAE.

Vid. Lapides Prunellae.

SAL SEDATIVUS HOMBERGII.

R. Boracis Venetae unciam unam,
Aquae purae uncias duodecim.
Leni calore folutis caute affundatur
Olei Vitrioli Anglici femuncia.
Evaporata ad cuticulam cryftallifationi committantur; cryftalli enatae aqua abluantur.

Nota. Lixivium ab ifta cryftallifatione relictum iterumque ad cuticulam evaporatum & cryftallifationi commiffum, novas largitur cryftallos lamellofas, micantes. Quae vero ultimo loco concrefcunt cryftalli glaciales, Salem mirabilem Glauberi, ex Acido Vitrioli & Alcali Boracis natum exhibent. Priores itaque Cryftalli ab his feparandae funt & aqua abluendae.

SAL

SAL SODAE.

R. Sodae Hiſpanicae quantum volueris.

Solvatur in Aqua fontana; ſolutio filtrata evaporetur, cryſtalliſationi committatur, & demum, quo omne eliciatur Alcali, ad ſiccitatem evaporetur.

SAL SUCCINI VOLATILIS.

Obtinetur una cum *Oleo Succini*, quod videndum.

SAL TARTARI.

Videatur SPIRITUS TARTARI.

SAL VOLATILIS OLEOSUS SYLVII.

Vid. SPIRITUS VOLATILIS OLEOSUS.

SAL VOLATILIS SALIS AMMONIACI SICCUS.

R. Salis Ammoniaci libram unam,
Cretae puriſſimae libras duas.

Sublimentur e retorta igne forti.

SAL URINAE ESSENTIALIS.

R. Urinae Juvenis ſani bonam partem.

Coquatur in olla ferrea ad mellis confiſtentiam, inſpiſſata reponatur in cella, & cryſtalli cum Aqua pura eluantur.

SAPO STARKEYANUS.

R. Salis Alcali mineralis ſicci, vel Sodae depurati ſemilibram.

 Fluat

Fluat intenſo igne per horam, fervidumque effundatur in mortarium ferreum probe calefactum, & cum piſtillo calido in pollinem teratur. Pulveri inſtilletur confeſtim, ita ut guttâ guttam excipiat

Olei Terebinthinae aetherei ſesquilibra.

Terantur in mortario vitreo donec in ſaponem coaluerint. Mixtio perfecta cognoſcitur, ſi ab affuſa aqua oleum non ſeparatur.

SCILLA PRAEPARATA.

Radices Scillae recentes & a corticibus purgatae, ſingulae involvantur paſtae farinaceae, & in clibano coquantur. Tenerae factae, cultello ligneo ab invicem ſeparatae, in umbra ſiccentur.

SOLUTIO CORALLIORUM.

R. Coralliorum rubrorum in pollinem tritorum libram unam.

Affundantur ſenſim

Aceti Vini deſtillati acerrimi librae quatuor.

In vaſe vitreo leniter digerantur, atque ſpatula lignea agitentur ad ſolutionem. Liquore decantato novum addatur Acetum, donec omnia ſoluta fuerint. Solutiones filtratae ad ſiccitatem evaporentur, ſub continua agitatione.

SPECIES PRO CATAPLASMATE EMOLLIENTE.

R. Herbae Malvae,
Althaeae ana ſemilibram,
Meliloti,

Florum

Florum Sambuci ana uncias octo,
Radicum Althaeae uncias decem,
Seminis Foenugraeci,
Lini ana libras duas.
Incidantur & contundantur ſimul in pulverem groſſiuſculum.

SPECIES PRO CATAPLASMATE AD GANGRAENAM.

R. Herbae Scordii,
Cardui benedicti,
Rutae ana drachmas quatuordecim,
Radicum Angelicae,
Leviſtici ana uncias duas,
Myrrhae ſescunciam,
Salis Ammoniaci ſemunciam.
Minutim conciſa ac contuſa miſceantur.

SPECIES PRO CUCUPHA.

R. Ligni Aſpalathi,
Rhodii ana ſemunciam,
Herbae Baſilici,
Serpilli ana drachmas tres,
Florum Lavendulae,
Liliorum Convallium,
Rosmarini ana ſemunciam,
Storacis calamitae,
Cinnamomi,
Caryophyllorum aromaticorum ana drachmas tres.
Inciſa & contuſa miſceantur.

SPECIES

SPECIES PRO DECOCTO ADSTRINGENTE AD GARGARISMA.

R. Herbae Hederae terreſtris,
Salviae ana unciam unam,
Plantaginis,
Prunellae ana uncias duas,
Florum Roſarum rubrarum,
Balauſtiorum ana drachmas ſex.
Inciſa miſceantur.

SPECIES PRO DECOCTO AVENAE LOWERI.

R. Avenae albae electae ſaepius lotae iterumque exſiccatae uncias ſex,
Ligni ſantali rubri unciam unam,
Radicum Cichorei ſylveſtris ſescunciam.
Conciſa miſceantur.

Nota. Paratur ipſum Decoctum, coquendo praeſcriptum Specierum pondus in Aquae fontanae libris duodecim, & colaturae addendo Nitri ſemunciam, Sacchari uncias duas.

SPECIES PRO DECOCTO EMOLLIENTE AD GARGARISMA.

R. Radicum Althaeae,
Liquiritiae,
Herbae Malvae,

Florum

Florum Papaveris erratici,
Sambuci ana ſescunciam,
Seminis Pſyllii uncias duas.
Inciſa & contuſa miſceantur.

SPECIES PRO DECOCTO LIGNORUM.

R. Raſurae Ligni Guajaci uncias octo,
Saſſafras uncias quatuor,
Radicum Saponariae uncias octo,
Bardanae,
Chinae,
Liquiritiae,
Stipitum Dulcamarae ana uncias quatuor,
Baccarum Juniperi uncias tres,
Seminis Aniſi unciam unam.
Inciſa & contuſa miſceantur.

SPECIES DIAIREOS.

R. Specierum Diatragacanthae frigidarum,
Sacchari albiſſimi ana unciam unam,
Radicis Iridis Florentinae drachmas ſex.
Contundantur in pulverem.

SPECIES DIATRAGACANTHAE FRIGIDAE.

R. Gummi Tragacanthae uncias duas,
Arabici drachmas decem,
Amyli ſemunciam,
Radicis Liquiritiae drachmas duas.
Miſceantur in pulverem.

Nota. Semina frigida ſub diſpenſatione demum ſunt addenda, ea proportione, ut cum Uncia una Specierum miſceantur
Seminum Papaveris albi,
quatuor frigidorum majorum ana drachma una.

SPECIES PRO ENEMATIBUS.

Vid. Species pro Cataplasmate emolliente.

SPECIES PRO FOMENTATIONE, SEU DISCUTIENTES.

R. Herbae Majoranae,
Menthae criſpae,
Rutae hortenſis,
Salviae,
Florum Lavendulae,
Meliloti,
Baccarum Juniperi ana uncias quatuor.
Incidantur & contundantur.

SPECIES HIERAE PICRAE.

R. Aloes ſocotrinae uncias quatuor,
Radicis Serpentariae Virginianae,
Zingiberis ana ſemunciam.
Incidantur & contundantur in pulverem.

SPECIES PRO INFUSO PECTORALI.

R. Radicum Bardanae uncias quatuor,
Althaeae ſeſcunciam,

Enulae,

Enulae,
Liquiritiae,
Herbae Tuſſilaginis,
Veronicae ana drachmas ſex,
Florum Papaveris rhoeados,
Verbaſci,
Bellidis minoris ana drachmas duas,
Seminis Aniſi ſtellati ſemunciam.
Inciſa & contuſa miſceantur.

SPECIES PRO MORSULIS STOMACHICIS.

R. Cinnamomi acuti uncias duas,
Cardamomi excorticati ſemunciam,
Nucis moſchatae drachmas tres,
Galangae,
Zingiberis ana drachmas duas,
Caryophyllorum aromaticorum drachmam unam.
Groſſiuſcule conciſa & contuſa miſceantur.

SPECIES RESOLVENTES EXTERNAE.

R. Herbae Abſynthii,
Meliſſae,
Menthae,
Origani ana uncias quatuor,
Florum Chamomillae,
Sambuci ana uncias tres,
Baccarum Lauri uncias duas.
Inciſa & contuſa miſceantur.

SPECIFICUM CEPHALICUM MICHAELIS.

R. Cinnabaris factitiae praeparatae uncias octo,
Radicis Poeoniae uncias tres,
Coralliorum rubrorum praeparatorum,
Cornu Cervi sine igne praeparati ana unciam unam,
Succini praeparati semunciam,
Foliorum Auri quantum libet.
Misceantur in pulverem tenuissimum.

SPIRITUS AETHEREUS.

Vid. NAPHTHA VITRIOLI.

SPIRITUS ANISI.

R. Seminis Anisi contusi libram unam,
Spiritus Vini libras octo.
Macerentur per viginti quatuor horas, & e vesica igne moderato destilletur Spiritus.

SPIRITUS ANTISCORBUTICUS.

R. Spiritus Tartari optimi libram unam,
Cochleariae uncias quatuor,
Olei Vitrioli concentrati unciam unam.
Mista destillentur ad siccitatem.

SPIRITUS BEZOARDICUS.

Vid. LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

R. Spiritus Nitri fumantis unciam unam,

Vini

Vini rectificatissimi uncias duodecim,
Tartari uncias sex.
Mixta destillentur e retorta.

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

R. Cerasorum nigrorum maturorum quantum volueris,
Contusa una cum nucleis in dolio querno, addito pauxillo floris Cerevisiae loco tepido relinquantur, donec fermentando acidum aut vinosum spirent odorem, quo facto e vesica destillentur, prolectusque spiritus rectificetur.

SPIRITUS COCHLEARIAE.

R. Herbae Cochleariae recentis cum Floribus & semine libras decem,
Contusis affundantur
Spiritus Vini non rectificati librae viginti.
In vesica per noctem macerata destillentur, juncturis exacte clausis. Spiritus recenti herbae affusus denuo destilletur, quod tertia vice repeti potest.

SPIRITUS CORNU CERVI.

Vid. Sal Cornu Cervi.

SPIRITUS CORTICUM AURANTIORUM.

R. Corticum exteriorum Aurantiorum Curassaviensium sesquilibram,
Spiritus Vini rectificati libras octo,
Aquae fontanae libras duas.

E vesica lento igne destillentur Spiritus librae octo, Aqua fontana diluendae ac Saccharo edulcorandae.

SPIRITUS CORTICUM CITRI.

Paratur ut *Spiritus Corticum Aurantiorum.*

SPIRITUS DIATRION RECTIFICATUS, seu MIXTURA SIMPLEX RECTIFICATA.

R. Spiritus theriacalis uncias decem,
Olei Vitrioli glacialis drachmas sex,
Spiritus Tartari rectificati uncias sex.

Per triduum digesta, destillentur e retorta in balneo Arenae ad siccitatem.

Nota. Si unciae uni addantur Camphorae grana decem, vocatur *Mixtura simplex camphorata.*

SPIRITUS FORMICARUM.

R. Formicarum recentium, Mense Junio Juliove captarum libram unam,
Spiritus Vini rectificati libras duas

Destillentur e balneo maris ad siccitatem.

SPIRITUS FULIGINIS.

Paratur ut *Spiritus Tartari.*

SPIRITUS JUNIPERI.

R. Baccarum Juniperi recentium maturarum libras quatuor. Conquassatis affundantur

Spiritus

Spiritus Vini non rectificati librae octo.
Post infusionem per noctem fiat destillatio e vesica.

SPIRITUS LAVENDULAE.

R. Florum Lavendulae leniter siccatorum libram unam,
Spiritus Vini non rectificati libras sex.

Per triduum digesta destillentur e balneo maris ad tertias, iterumque fiat destillatio supra Florum recentium semilibra.

SPIRITUS LAVENDULAE COMPOSITUS.

R. Florum recentium Lavendulae libras duas,
Rosmarini libram unam,
Corticum Citri exteriorum recentium uncias tres,
Spiritus Vini rectificati libras duodecim.

Destillentur e balneo maris ad siccitatem. In spiritu destillato macerentur per triduum
Cinnamomi unciae tres,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebarum ana uncia una,
Rasurae Ligni Santali rubri unciae duae.
Colentur.

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

Vid. Oleum Ligni Guajaci.

SPIRITUS LILIORUM CONVALLIUM.

R. Florum Liliorum Convallium recentium libram unam,
Vini generosi libras quinque,

Spiritus

Spiritus Vini rectificati libram unam.

Destillentur e Cucurbita ad dimidias. Aqua spirituosa novis Floribus iterum affundi, & ad tertias abstrahi potest.

SPIRITUS LUMBRICORUM TERRESTRIUM.

R. Lumbricorum terrestrium vivorum libras quatuor.
Probe mundatis & contusis affundantur
Spiritus Vini non rectificati librae decem.
Per biduum digesta leni igne destillentur ad tertias.

SPIRITUS MATRICALIS.

R. Mastichis,
Myrrhae,
Thuris ana unciam unam.
Tenuissime terantur cum
Olei Tartari per deliquium quantitate sufficiente.

In pastam mollem subactis, ac leni calore exsiccatis addantur

Spiritus Vini rectificati librae tres.
Per triduum digesta destillentur e retorta.

SPIRITUS MELISSAE.

Paratur uti *Spiritus Lavendulae.*

SPIRITUS MENTHAE.

Paratur instar *Spiritus Lavendulae.*

SPIRITUS

SPIRITUS MINDERERI.

R. Salis ammoniaci volatilis quantum volueris.
Paulatim inſtilletur, ſubinde agitando

Aceti deſtillati quantum ſufficit donec non amplius efferveſcant.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

R. Spiritus Vini rectificatiſſimi uncias viginti quatuor.
Paulatim inſtillentur

Spiritus Nitri fumantis unciae duae.

Per aliquot dies digeſta deſtillentur e cucurbita & deſtillatio altera vice repetatur.

SPIRITUS NITRI FUMANS.

R. Nitri ſicciſſimi in pulverem triti libras tres.

Immittatur retortae vitreae ſiccae & calefactae, atque ſuperfundantur guttatim

Olei Vitrioli concentrati librae duae.

Juncturis optime clauſis fiat deſtillatio leni arenae igne. Spiritus ſub fumorum rubicundorum ſpecie prodiens in vitro, epiſtomio vitreo munito, ſervetur.

SPIRITUS ROSARUM.

Paratur uti *Spiritus Liliorum Convallium.*

SPIRITUS RUBI IDAEI.

Paratur uti *Spiritus Ceraſorum.*

SPIRITUS SALIS AMMONIACI ANISATUS.

R. Salis Ammoniaci depurati libram unam,
Cinerum clavellatorum libras duas,
Seminis Anifi uncias fex,
Spiritus Vini,
Aquae fontanae ana libras quatuor.
Deftillatione e cucurbita vitrea proliciantur Liquoris oleofi volatilis librae quinque.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM CALCE PARATUS.

R. Salis Ammoniaci depurati libras duas,
Calcis vivae recenter paratae libras duas cum dimidia.
Seorfim tritis ac mixtis, in retorta capaci loricata affundantur
Aquae fontanae librae quindecim.
Retorta manu claufa bene agitetur; tum receptaculo amplo agglutinato, mox inftituatur deftillatio leni igne, ad fex feptemve libras Spiritus, qui vafe optime claufo fervetur.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS, vulgo *Eau de Luce.*

R. Olei Succini rectificati guttas duodecim ad fexaginta,
Spiritus Vini rectificati unciam unam,
Salis Ammoniaci vinofi uncias duodecim.
Igne moderato e retorta deftillentur.

SPIRITUS

SPIRITUS SALIS AMMONIACI URINOSUS feu AQUOSUS.

R. Salis Ammoniaci in pulverem triti libram unam,
Cinerum clavellatorum libras duas.
Mixtis in retorta vitrea affundantur
Aquae fontanae librae octo.

Leni igne deftillentur librae tres vel quatuor ad menfuram.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

R. Salis Ammoniaci in pulverem triti femilibram,
Tartari libram unam.
Mixtis in cucurbita vitrea affundantur
Spiritus Vini non rectificati librae quatuor.
Leni igne ex arena deftillentur librae duae ad menfuram.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS CONCENTRATUS feu GLAUBERI.

R. Salis communis in pulverem redacti libras duas.
Retortae vitreae tubulatae immiffis paullatim affundatur
Olei Vitrioli Anglici libra una.

Adaptetur vas recipiens Spiritu falis intus humectatum, atque juncturis optime claufis leni arenae igne deftilletur Spiritus fub fumorum fpecie prodiens, qui nova deftillatione rectificari poteft.

Nota. E Refiduo paratur *Sal mirabilis Glauberi.*

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Spiritus Vini rectificatiſſimi uncias duodecim.
Phialae capaci immiſſis paulatim affundatur
Spiritus Salis concentrati uncia una.

Per aliquot dies in vaſe bene clauſo digeſta, deſtillationi ex arena ſubjiciantur, quinquies repetendae.

SPIRITUS SAMBUCI FLORUM.

Paratur ut *Spiritus Liliorum Convallium.*

SPIRITUS SERPILLI.

Paratur inſtar *Spiritus Lavendulae.*

SPIRITUS SULPHURIS.

Hujus locum ſupplet Spiritus Vitrioli.

SPIRITUS TARTARI.

℞. Tartari rubri depurati quantum ſufficit ad repletionem retortae terreae ad duas tertias.

Recipiente amplo adaptato leni igne deſtilletur phlegma. Quam primum vero prodeunt nubeculae albae, mutato recipiente, juncturis probe clauſis, ſumma ignis vi urgeantur Spiritus & Oleum, ope vitri ſeparatorii a ſe invicem ſeparanda, atque ſeorſim e cucurbita deſtillanda. Oleum cum Aqua eſt rectificandum. Maſſa poſt deſtillationem ſuperſtes calcinata exhibet *Salem Tartari.*

SPIRITUS, seu OLEUM TEREBINTHINAE.

R. Terebinthinae clarae libras duodecim.
In vesica cuprea affundantur
Aquae fontanae librae quadraginta octo.
Instituatur destillatio, oleumque aethereum ab aqua separetur.

Nota. Residuum in vesica exhibet TEREBINTHINAM COCTAM, quae lento igne absque Aqua cocta vocatur COLOPHONIUM.

SPIRITUS THERIACALIS.

R. Radicum Angelicae,
Imperatoriae,
Serpentariae Virginianae,
Zedoariae ana unciam unam,
Herbae Scordii uncias duas,
Corticum Citri,
Baccarum Juniperi,
Myrrhae rubrae ana unciam unam,
Croci orientalis semunciam.
Concisa & contusa infundantur
Spiritus Vini non rectificati libris septem.
Digerantur per triduum & leni igne destillentur librae quatuor.

Nota. Addendo unciae uni Camphorae scrupulum unum, paratur SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

R. Spiritus Vini rectificati libras duas,
Camphorae uncias duas.
Solvantur.

Nota. Si hujus Spiritus librae uni, addatur Essentiae Croci uncia una, vocatur SPIRITUS VINI CAMPHORATUS CROCATUS.

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

Spiritus Vini e vesica cuprea per alembicum stanneum destilletur, donec phlegma quasi lactescens prodierit. Destillatio cum tertia parte Aquae repeti potest.

SPIRITUS VINI RECTIFICATISSIMUS.

Spiritus Vini rectificatus leni igne abstrahatur ad dimidias.

SPIRITUS VITRIOLI.

R. Olei Vitrioli glacialis partem unam,
Aquae simplicis partes sex, vel octo.
Misceantur.

Videatur *Oleum Vitrioli.*

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Vid. *Liquor anodynus mineralis.*

SPIRITUS

SPIRITUS vulgo SAL VOLATILIS OLEOSUS SYLVII.

R. Cinnamomi acuti uncias quatuor,
Nucum moſchatarum,
Radicum Galangae,
Angelicae,
Calami aromatici,
Valerianae ana unciam unam,
Coſti odorati,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebarum,
Zingiberis,
Granorum Paradiſi,
Cardamomi minoris,
Seminum Coriandri,
Foeniculi ana ſemunciam,
Conciſis ac contuſis affundantur
Spiritus Vini rectificatiſſimi librae octo.
Per triduum digeſtis addantur
Spiritus Salis ammoniaci cum calce viva parati librae quatuor.
Leni igne deſtillentur ad libras octo.

SPONGIA PRAEPARATA.

Spongia tenuis exſiccata ac repurgata Cerae flavae liquefactae immergatur ac fortiter exprimatur.

STANNI AMALGAMA.

R. Rasurae Stanni purissimi uncias duas,
Mercurii purissimi drachmas tres.
In mortario lapideo terantur in pulverem.

STANNUM PULVERATUM.

Stannum Anglicum purissimum liquefactum, effundatur in pyxidem ligneam intus crenatam, atque celeri succussione redigatur, quantum potest, in pulverem. Reliquum iterum fusum eodem modo in pulverem mutatur.

SUCCINI PRAEPARATIO.

Succinum ablutum iterumque exsiccatum & tritum, affuso pauxillo Aquae, super porphyritem in pollinem tenuissimum teratur & exsiccetur.

* SUCCI SCORBUTICI.

R. Succi Cochleariae hortensis partes duas,
Beccabungae,
Nasturtii aquatici,
Taraxaci,
Aurantiorum ana partem unam.
Misceantur, & faecibus subsidentibus decantentur.

SUCCUS AURANTIORUM.

Ex Aurantiis recentibus exprimatur succus, atque defaecatus servetur in Vitro angustioris colli, affuso Olei Olivarum pauxillo vesica muniendo.

Eodem

Eodem modo ſervantur:

Succus Citri.
Cydoniorum, &c.

SUCCUS LIQUIRITIAE DEPURATUS.

Succus Liquiritiae Hiſpanicus in fruſtula diſſectus & Aqua tepida ſolutus, per pannum coletur. Faecibus ſubſidentibus liquor decantetur, ac leni calore inſpiſſetur.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII TERTIAE PRAECIPITATIONIS.

R. Reſidui a Tinctura Antimonii tartariſata quantum volueris.

In pulverem trito addatur
Aquae fontanae octuplum.

Poſtquam ſatis diu cocta fuerint, ſolutioni ex flavo rubrae filtratae inſtilletur in vaſe vitreo Acetum deſtillatum. Sulphur praecipitatum ope chartae bibulae ſeparetur. Lixivio iterum affundatur Acetum, iterumque ſeparetur ſulphur aurantii coloris. Tertia demum vice multum addatur lixivio Aceti, pulvisque excuſſus tenuiſſimus, coloris aurantii minus ſaturati, probe abluatur, donec foetorem depoſuerit.

SUPPOSITORIUM USUALE.

R. Specierum Hierae picrae unciam unam,
Seminum Colocynthidis drachmas duas,
Salis communis drachmas ſex,

Farinae Frumenti uncias quatuor,
Saponis albi uncias tres,
Mellis quantum sufficit
ut fiat pasta, ex qua formentur Suppositoria.

SYRUPI.

Canones.

I. Quod Syrupis non coctis admiscetur Saccharum, purissimum sit. Coquatur primum ad Tabellati consistentiam & clarefactum cum Ovi Albumine despumetur.

II. Syrupi acidi, aut e Succis fructuum parati, non committantur vasis cupreis, nisi stanno probe obductis.

SYRUPUS ABSYNTHII.

℞. Summitatum recentium Absynthii junioris libram unam. Incisa infundantur
Aquae fontanae sesquilibrae.
Sub praelo stanneo exprimantur ac colentur. Colaturae unciis duodecim addantur
Sacchari albi unciae viginti.
Una aut altera ebullitione solvantur & fiat Syrupus.

SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

℞. Succi Citri depurati & filtrati uncias decem,
Sacchari albissimi uncias viginti.
Mixta post unam alteramve ebullitionem in vase stanneo colentur.

SYRUPUS

SYRUPUS DE ALTHAEA.

R. Radicis Althaeae uncias tres,
Aquae fontanae libras ſex.
Coquantur ad tertiae partis conſumtionem, ſub finem addendo
Radicis Liquiritiae unciam unam,
Herbae Capillorum Veneris ſescunciam.
Colaturae ſubſidentia depuratae addantur
Sacchari albi librae ſex.
Coquantur leni igne ſub continua agitatione, donec fiat Syrupus.

SYRUPUS DE AMMONIACO.

R. Gummi Ammoniaci electi uncias duas,
Vini albi uncias decem.
Solutis admiſceantur
Sacchari albi ad conſiſtentiam tabulati cocti unciae ſedecim.
Agitentur donec refriguerint.

SYRUPUS AMYGDALINUS.

R. Amygdalarum dulcium excorticatarum uncias octo,
Aquae Roſarum uncias ſedecim,
Naphae unciam unam.
Emulſionis inde factae unciis duodecim addantur
Sacchari albiſſimi ad tabulati ſpiſſitudinem cocti librae duae.
Miſceantur in Syrupum.

SYRUPUS AURANTIORUM CORTICUM.

R. Flavedinis Aurantiorum recentiorum concifae uncias octo,
Aquae fontanae ferventis libras duas.
Infundantur vafe claufo per fex horas in balneo maris.
Colaturae addantur
Sacchari albi librae quatuor.
Mifceantur in Syrupum.

SYRUPUS BERBERUM.

Paratur uti *Syrupus Acetofitatis Citri.*

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

R. Herbae Capillorum Veneris incifae uncias fex,
Aquae ferventis libras feptem.
Per noctem digefta leniter ebulliant ad quartae partis confumtionem. Colaturae clarificatae addantur
Sacchari albi librae tres cum dimidia.
Coquantur ad Syrupi confiftentiam addendo demum
Aquae Naphae uncias tres.

SYRUPUS CERASORUM ACIDORUM.

Paratur uti *Syrupus Acetofitatis Citri.*

SYRUPUS E CHAMOMILLA.

R. Florum Chamomillae vulgaris recentium,
Aquae ferventis ana libram unam.
In vafe probe claufo per duodecim horas infufa exprimantur, ac iterum eadem Florum Chamomillae quantitate infundan-

infundantur, iterumque expreſſa clarificentur. Hujus infuſi unciis novem addantur

Sacchari albi unciae ſedecim.

Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS E CICHOREO CUM RHEO.

R. Radicum Cichorei uncias quinque,
Aquae fontanae libras tres.
Ad tertiae partis conſumtionem coctis addantur
Rhei minutim conciſi unciae duae.
Ebulliant leni igne. Expreſſis immiſceantur
Sacchari albi librae duae.
Clarificato ac colato Syrupo addantur
Aquae Cinnamomi vinoſae unciae duae.

SYRUPUS CINNAMOMI.

R. Cinnamomi optimi craſſiuſcule contuſi uncias quinque,
Aquae Cinnamomi vinoſae optimae libras duas,
Roſarum odoratiſſimae uncias duas.

In cucurbita vitrea probe obturata per viginti quatuor horas in loco calido digeſtis, addantur

Sacchari albi clarificati, ad tabulati conſiſtentiam cocti librae tres cum unciis quatuor.

Miſceantur in Syrupum.

SYRUPUS COMMUNIS, ſeu SACCHARUM CLARIFICATUM.

R. Sacchari albi,

Aquae fontanae ana partes aequales.
Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS CYDONIORUM.

Paratur inſtar *Syrupi Acetoſitatis Citri.*

SYRUPUS DIACODION.

R. Capitum Papaveris rhoeados mediocriter maturorum, modice ſiccatorum uncias quatuordecim,
Radicis Liquiritiae ſemunciam,
Aquae fontanae bullientis libras octo.
Per noctem macerata coquantur ad dimidias. Colaturae fortiter expreſſae addantur
Sacchari albi librae quatuor.
Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS DOMESTICUS, ſeu DE SPINA CERVINA.

R. Succi depurati Baccarum Spinae cervinae maturarum libras ſex,
Sacchari albi libras quatuor.
Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS DE ERYSIMO.

R. Herbae Eryſimi totius recentis libram unam,
Radicum Enulae uncias tres,
Summitatum ſiccatarum Rosmarini,
Stoechadis ana ſemunciam,
Semi-

Seminis Anisi drachmas sex,
Passularum mundatarum uncias duas.
Incisa & contusa coquantur in
Aquae fontanae libris tribus,
Succi Erysimi unciis quinque,
donec supersint unciae viginti duae.
Expressa additis
Sacchari albi unciis quadraginta
Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS DE FARFARA, seu TUSSILAGINE.

℞. Succi Herbae Farfarae depurati uncias novem,
Sacchari albi libram unam.
Repetita ebullitione fiat Syrupus.

SYRUPUS FOENICULI.

℞. Seminis Foeniculi contusi semilibram,
Aquae fontanae libras sex.
Per viginti quatuor horas digerantur, & leni calore abstrahantur liquoris unciae septem, admiscendae
Sacchari albi unciis quatuordecim.
Residuum colatum itidem cum
Sacchari albi libris quatuor
Coquatur in Syrupum, qui superiori tepidus admisceatur.

SYRUPUS FRAGORUM.

Paratur ut *Syrupus Acetositatis Citri.*

SYRUPUS GRANORUM KERMES.

R. Coccinellae ſemunciam,
Probe teratur cum
Aquae Cinnamomi non vinoſae,
Roſarum ana unciis duodecim,
Salis Tartari granis duodecim.
Per noctem infuſis addantur
Sacchari albi librae duae,
Succi Granorum Kermes unciae duodecim,
Unica ebullitione fiat Syrupus, per linteum colandus.

SYRUPUS HYSSOPI.

Paratur ex Succo Hyſſopi depurato, eadem ratione ac *Syrupus de Farfara.*

SYRUPUS LIQUIRITIAE.

R. Radicum Liquiritiae mundatarum uncias duas,
Herbae Capillorum Veneris,
Hyſſopi ana drachmas ſex,
Aquae ferventis libras tres.

Per diem noctemque infuſa coquantur ad dimidias. Colaturae addantur
Mellis deſpumati unciae ſex,
Sacchari albi unciae octodecim.
In Syrupum miſtis adjiciantur
Aquae Roſarum fragrantis unciae tres.

SYRUPUS E MANNA.

R. Radicum Polypodii uncias tres,
Aquae fervidae libras duas cum dimidia.
Per noctem macerata coquantur ad tertiae partis consumtionem. Colaturae addantur
Foliorum Sennae electorum unciae quatuor,
Seminis Foeniculi,
Zingiberis ana drachma una.
In loco calido digesta exprimantur. Clarificata demum, admistis
Mannae Calabrinae unciis sex,
Sacchari albi unciis viginti duabus
Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS MENTHAE.

R. Herbae Menthae siccae uncias quatuor,
Aquae Menthae libram unam.
In vase clauso per biduum digesta exprimantur, & additis
Sacchari albi unciis sedecim
Unica ebullitione fiat Syrupus.

SYRUPUS MORORUM.

Paratur uti *Syrupus Acetositatis Citri.*

SYRUPUS NICOTIANAE.

R. Foliorum Nicotianae Virginianae semunciam.
Coquantur in Aqua fontana per horam; abjecto decocto Folia excocta cum
Radicis Liquiritiae uncia una,

Aquae ſontanae bullientis unciis duodecim

In vaſe aperto denuo coquantur & exprimantur. Colaturae unciis decem addantur

Mellis depurati unciae quatuor,

Sacchari albi unciae ſedecim.

Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

Vid. SYRUPUS DIACODION.

SYRUPUS PAPAVERIS RHOEADOS, ſeu ERRATICI.

℞. Florum Papaveris erratici recentium ſesquilibram,

Aquae puriſſimae ferventis libras tres.

Per noctem macerata exprimantur, ac colaturae ad dimidias evaporatae addantur

Sacchari albi librae tres.

Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS POEONIAE FLORUM.

Paratur uti *Syrupus Papaveris rhoeados.*

SYRUPUS E QUINQUE RADICIBUS APERIENTIBUS.

℞. Radicum Apii,

Aſparagi,

Foeniculi,

Petroſelini,

Ruſci ana uncias duas,

Aquae fontanae libras ſex.

Coquan-

Coquantur ad tertiae partis confumtionem. Expreffa additis
Sacchari albi libris tribus
Coquantur in Syrupum, admifcendo fub finem
Aceti Vini puri uncias octo.

SYRUPUS RHABARBARI BINGII.

R. Rhabarbari incifi uncias duas,
Aquae fontanae uncias fedecim.

Per diem noctemque infufa exprimantur ac infpiffentur ad fescunciam. Additis demum
Sacchari albi unciis quatuor
Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS RIBIUM.

Paratur uti *Syrupus Acetofitatis Citri.*

SYRUPUS ROSARUM SOLUTIVUS.

R. Florum Rofarum pallidarum libras duas,
Aquae ferventis libras quatuor.

Per viginti quatuor horas infufa exprimantur & colentur, iterumque eadem Rofarum quantitate infundantur, quod tertia vice repetendum eft. Hujus infufi unciis novem addantur
Sacchari albi unciae fedecim.
Unica ebullitione fiat Syrupus.

SYRUPUS RUBI IDAEI.

Paratur inftar *Syrupi Acetofitatis Citri.*

SYRUPUS E SPINA CERVINA.

Vid. Syrupus domesticus.

SYRUPUS TUNICAE FLORUM.

Paratur uti *Syrupus Rofarum.*

SYRUPUS VIOLARUM.

R. Florum Violarum recentium mundatorum libram unam,
Aquae ferventis libras duas.

In vafe ftanneo per noctem macerata exprimantur & colentur. Additis demum

Sacchari albi libris quatuor

Leni ebullitione in vafe ftanneo fiat Syrupus, iterum colandus.

TARTARUS EMETICUS.

R. Croci metallorum,
Cryftallorum Tartari ana uncias octo,
Aquae fontanae libras fex.

Per diem infufa, leni igne in vafe figulino vitreato coquantur ad folutionem. Liquor fervidus filtratus evaporetur, perpetuo agitando, ad ficcitatem. Maffa remanens in pulverem teratur.

TARTARUS TARTARISATUS, feu SOLUBILIS.

R. Salis Tartari uncias octo,
Aquae fontanae libras fex.

Coquantur ad folutionem, inter bulliendum infpergendo

Cryftallo-

Cryſtallorum Tartari quantum ſufficit
ad perfectam ſaturationem. Liquor filtratus evaporetur ad ſiccitatem.

TARTARUS VITRIOLATUS.

R. Cinerum clavellatorum,
Vitrioli Anglici ana partes aequales.
Seorſim ſolvantur in Aqua calida. Solutiones ſucceſſive confundantur, donec nulla amplius naſcatur effervеſcentia. Magna Aquae quantitate dilutae reponantur ad ſubſidentiam, limpidusque humor decantatus iterum ſubſidentiae committatur, iterumque decantetur. Evaporetur deinde in vaſe ferreo ad cuticulae apparitionem, & poſt repetitam evaporationem reponatur in loco frigido, ut concreſcant cryſtalli. Liquor his ſupernatans decantetur, iterumque evaporetur ad cuticulam, & novae cryſtalliſationi committatur, quod repetendum, donec omnes exhauſtae fuerint cryſtalli, quae demum Aqua frigida abluendae ſunt ac ſiccandae.

Nota. Quamvis hic Sal idem ſit cum jam deſcripto *Arcano duplicato*, formula tamen, conſuetudinis gratia, addita fuit.

TEREBINTHINA COCTA.

Vid. Cleum Terebinthinae.

TERRA FOLIATA TARTARI.

R. Salis Tartari puriſſimi & ſicciſſimi uncias ſex.
In cucurbita vitrea affundantur

Aceti Vini destillati librae octo.

Mixta evaporentur ad siccitatem, lenissimo circa finem igne. Quod si sal minus perfecte saturatus fuerit, alia Aceti destillati libra, vel quantum ad perfectam saturationem sufficit affundatur, iterumque evaporentur. Residuum salinum Aqua fontana, vel si requiritur, Spiritu Vini solutum atque filtratum evaporetur, exsiccetur atque in vase bene clauso locoque calido servetur.

TERRA VITRIOLI DULCIS.

R. Colcotharis Vitrioli quantum volueris.

In Aqua calida per aliquot horas infusa bulliant, & post subsidentiam decantentur; quod toties est repetendum, donec Aqua insipida evaserit. Residuum exsiccetur,

THERIACA ANDROMACHI.

R. Radicum Dictamni albi,
Scillae praeparatarum ana libram unam,
Iridis Florentinae semilibram,
Petasitidis,
Zingiberis albi,
Rhabarbari ana uncias tres,
Calami aromatici,
Valerianae sylvestris ana uncias duas cum dimidia,
Angelicae,
Gentianae ana uncias duas,
Aristolochiae longae unciam unam,
Asari scrupulos octo.
Herbae Mari veri,

Majoranae

Majoranae,
Scordii ana ſemilibram,
Dictamni Cretici,
Marrubii albi,
Meliſſae citrinae ana uncias tres,
Chamaedryos,
Polii Cretici,
Chamaepityos ana uncias duas,
Foliorum Indorum uncias duas cum dimidia,
Florum Centaurii minoris unciam unam,
Florum Roſarum rubrarum ſemilibram,
Hyperici uncias duas,
Seminum Apii ſemilibram,
Amomi,
Petroſelini ana uncias quatuor,
Aniſi,
Foeniculi cretici,
Ammeos,
Sileris montani,
Thlaſpi ana uncias duas cum dimidia,
Dauci ſescunciam,
Piperis longi libram unam,
albi,
nigri ana uncias quatuor,
Cardamomi minoris,
Cubebarum ana uncias duas,
Cinnamomi acuti uncias quatuor,
Coſti Arabici uncias tres cum dimidia,
Ligni Aſpalathi ſcrupulos octo,
Aloës ſemunciam,
Myrrhae electae uncias quatuor,

Olibani

Olibani electi uncias tres,
Maſtichis ſcrupulos quatuor,
Gummi Arabici,
Terrae ſigillatae,
Caſtorei Ruſſici ana uncias duas,
Viperarum Italicarum libram unam.

Leni calore omnia ſiccentur, inque pollinem terantur, per cribrum trajiciendum ac ſeorſim ſervandum. Itidem

R. Florum Stoechadis Arabicae uncias tres,
Spicae Celticae uncias ſex,
Schoenanthi uncias tres cum dimidia.

Minutiſſime conciſa, cum
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantitate ſufficiente contundantur in paſtam, quae deinde exſiccata in pulverem redigatur, priori admiſcendum. Tunc

R. Extracti Opii uncias octo,
Succi Liquiritiae ſemilibram,
Catechu,
Sagapeni ana uncias tres,
Galbani unciam unam,
Vini Canarienſis libras quatuor.

Solutis & colatis admiſceantur
Vitrioli Martis ad albedinem calcinati unciae duae,
Croci Auſtriaci triti unciae quatuor.

Vino diluantur, & cum
Mellis deſpumati libris quinquaginta octo
optime ſubigantur. Tandem

R. Styracis in Granis, vel Reſinae ejusdem expreſſae uncias duas,
Terebinthinae Cypriae uncias tres.

Solutis addantur

Balſami

Balſami Tolutani unciae ſex cum dimidia.

His denique ſub perpetua ac ſtrenua agitatione alternatim, modo Mellis ſuperioris mixti aliqua portio affundatur, modo Pulveres inſpergantur, donec omnia probe fuerint commiſta. Tunc vaſi capaci commiſſa fermentationi ſubjiciantur, ſpatula magna lignea interdum agitando.

Nota. Quaelibet Uncia Theriacae continet Opii grana quatuor & Croci grana duo.

THERIACA PAUPERUM.

R. Radicis Ariſtolochiae rotundae,
Helenii,
Myrrhae electae,
Roob Juniperi ana partes aequales,
Syrupi Corticum Aurantiorum quantum ſufficit
Ut fiat Electuarium.

THERIACA PRO PECORIBUS.

Vid. Electuarium pro Pecoribus.

TINCTURAE.

Canones habent cum Eſſentiis communes.

TINCTURA ALOES.

R. Aloës ſocotrinae uncias duas,

Spiritus Vini rectificati uncias decem.
In vase obturato leni igne digesta filtrentur.

TINCTURA AMARA.

R. Radicis Gentianae uncias duas,
Flavedinis Corticum Aurantiorum siccatae unciam unam,
Cardamomi minoris excorticati semunciam,
Spiritus Vini Gallici libras duas.
Absque calore digesta filtrentur.

TINCTURA ANTIMONII ACRIS.

R. Reguli Antimonii martialis libram unam,
Nitri purissimi libras quatuor.

In pulverem trita deflagrentur in crucibulo tecto, & per horam bene liquentur. Massa adhuc fervens confestim in mortario calefacto in pulverem redacta, & cucurbitae vitreae immissa, infundatur

Spiritus Vini rectificatissimi libris novem.
Tinctura rubicunda extracta filtretur.

TINCTURA ANTIMONII NIGRA.

R. Regulum Antimonii medicinalem eo, qui supra praescriptus est, processu recenter paratum, adhuc fervidum, in mortario ferreo in pollinem tritum,
Liquoris Nitri fixi uncias quatuor.

Digestioni committantur. Quam primum Materia spissescens Alcohol tingere coeperit, calida effundatur in cucurbitam, & additis

Spiri-

Spiritus Vini rectificatissimi unciis decem

subinde commovendo, extrahatur Tinctura, a solis calore probe arcenda.

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA.

R. Antimonii crudi electi semilibram,

Salis Tartari libram unam.

Mixta injiciantur paulatim in crucibulum ut fluant igne forti. Post horam dimidiam effundantur in mortarium ferreum calefactum, tritisque in pulverem & adhuc calidis affundantur in phiala

Spiritus Vini rectificatissimi librae tres.

Per triduum digesta filtrentur.

TINCTURA BENZOES.

R. Benzoës contritae uncias duas,

Spiritus Vini rectificati uncias duodecim.

In vase vitreo digerantur igne arenae per aliquot dies, subinde agitando, & tinctura extracta filtretur.

TINCTURA BEZOARDICA.

Est Mixtura simplex cum Floribus Malvae tincta.

TINCTURA CATECHU.

R. Catechu uncias duas,

Spiritus Vini rectificati uncias decem.

Per biduum digesta filtrentur.

TINCTURA CATHARTICA.

R. Refinae Jalappae femunciam,
Spiritus Vini rectificati uncias fex,
Olei Foeniculi guttas viginti quatuor.
Ad folutionem digefta filtrentur.

TINCTURA GINGIVALIS BALSAMICA.

R. Myrrhae electae,
Catechu ana unciam unam.
In pulverem trita irrorentur
Balfami Peruviani drachma una.
Superfufis denique
Spiritus Cochleariae,
Vini rectificati ana unciis tribus
Digerantur ac filtrentur.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

R. Radicis Hellebori nigri uncias quatuor,
Coccinellae femidrachmam.
Contufis affundantur
Spiritus Vini Gallici librae duae.
Per triduum digefta filtrentur.

TINCTURA LACCAE.

R. Gummi Laccae baculis adhaerentis unciam unam,
Aluminis crudi fesquidrachmam,
Aquae Salviae uncias tres,
Rofarum fescunciam.

Coquan-

Coquantur lento igne ad extractionem Tincturae rubicundae & colentur.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA.

R. Vitrioli Martis,
Cremoris Tartari ana uncias quatuor,
Aquae fontanae libras ſex.
In vaſe ferreo coquantur ſub continua agitatione ad ſiccitatem fere. Tunc in
Aquae Cinnamomi non vinoſae unciis quatuor
Soluta atque
Spiritus Vini rectificati unciis octo
Diluta, digerantur ac filtrentur.

Nota. Praeſtat loco Spiritus Vini adhibere Liquorem anodynum mineralem.

TINCTURA ODONTALGICA.

R. Raſurae Ligni Sancti uncias duas,
Saſſafras unciam unam,
Radicis Pyrethri drachmas ſex,
Foliorum Nicotianae drachmas tres,
Herbae Serpilli,
Origani ana drachmas duas,
Caryophyllorum aromaticorum drachmam unam,
Camphorae ſemidrachmam,
Opii Scrupulum unum.
Inciſis & contuſis ſuperinfundantur
Spiritus Vini rectificati librae duae.
Digeſta filtrentur.

TINCTURA PAPAVERIS E FLORIBUS.

R. Petalorum Florum Papaveris ſiccatorum ſemunciam,
Spiritus Vitrioli drachmas duas,
Aquae fontanae uncias quatuor.
Per triduum digeſta exprimantur.

TINCTURA PECTORALIS RINGELMANNI.

Vid. Elixir pectorale Ringelmanni.

TINCTURA PROPRIETATIS MYNSICHTI.

R. Spiritus Aniſi uncias ſedecim,
Elixir Proprietatis unciam unam,
Confectionis Alkermes incompletae ſemunciam,
Florum Tunicae rubrorum drachmam unam.
Digeſta ac perfecte tincta filtrentur.

TINCTURA QUASSIAE.

R. Ligni Quaſſiae minutim conciſi unciam unam,
Spiritus Vini Gallici uncias ſex.
Digerantur leni calore ad extractionem Saporis.

TINCTURA RHABARBARI AQUOSA.

R. Rhabarbari electi contuſi unciam unam,
Salis Tartari drachmas duas,
Aquae fontanae,
Cinnamomi ana uncias quinque.
Per diem noctemque in loco calido digeſta colentur.

TINCTU-

TINCTURA RHABARBARI VINOSA.

R. Rhabarbari electi uncias duas,
Seminum Cardamomi minoris decorticatorum unciam dimidiam,
Croci drachmas duas,
Vini albi libras duas.
Digerantur ſine calore & filtrentur.

TINCTURA SACRA.

R. Aloës ſocotrinae tritae unciam unam,
Radicis Serpentariae Virginianae,
Zingiberis ana drachmam unam,
Coccinellae ſcrupulum unum,
Vini albi Hiſpanici ſesquilibram.
Per triduum digeſta colentur.

TINCTURA SALINA.

R. Corticum Aurantiorum recentium,
Radicis Gentianae ana ſemilibram.
Conciſa infundantur
Aquae fontanae libris ſex,
Salis Alcalini depurati libris duabus.
Per quatriduum digeſta, additis
Spiritus Vini rectificati libris duabus cum dimidia
Filtrentur.

TINCTURA SERPENTARIAE.

R. Radicis Serpentariae Virginianae uncias tres,

Spiritus

Spiritus Vini non rectificati libras duas.
Absque calore digesta colentur.

TINCTURA STOMACHICA.

R. Radicis Calami aromatici,
Gentianae ana sescunciam,
Corticis Peruviani uncias duas,
Aurantiorum Curassaviensium,
Seminis Cardui benedicti,
Summitatum Centaurii minoris ana unciam unam.
Concisis & contusis adjiciantur, nodulo inclusae,
Limaturae Ferri unciae duae.
Superinfusis
Vini albi libris octo
Digerantur per triduum & filtrentur.

TINCTURA SUCCINI.

R. Succini citrini uncias duas,
Liquoris anodyni mineralis libram unam.
In leni balnei Arenae calore per quatriduum digesta filtrentur.

TINCTURA TARTARI.

R. Salis Tartari puri libram unam.
In crucibulo igne acerrimo ad colorem purpureum fusum, immittatur adhuc calidum mortario calefacto, atque cito contrito superinfundantur in phiala
Spiritus Vini rectificatissimi librae duae.

Digerantur

Digerantur per aliquot dies balneo Arenae, ſubinde agitando, & tinctura rubicunda extracta filtretur.

TROCHISCI ALHANDAL.

R. Pulpae Colocynthidis uncias duas.
Contundantur in mortario marmoreo cum
Mucilaginis Gummi Arabici ſufficiente quantitate.
Maſſa exſiccata in pollinem teratur, ac ejusdem mucilaginis ope in Trochiſcos formetur.

TROCHISCI BECCHICI ALBI.

R. Radicis Liquiritiae unciam unam,
Iridis Florentinae ſemunciam,
Sacchari albi ſesquilibram.
Conterantur in pollinem, & formentur, ope mucilaginis Gummi Tragacanthae, in Trochiſcos.

TROCHISCI BECCHICI CITRINI.

Vid. Liquiritia cocta citrina.

TROCHISCI BECCHICI NIGRI.

R. Pulveris Radicis Iridis Florentinae,
Liquiritiae,
Seminis Aniſi,
Foeniculi ana unciam unam,
Succi Liquiritiae in Aqua Foeniculi ſoluti uncias quatuor,
Sacchari albi uncias ſedecim,

Mucilaginis Tragacanthae quantum ſufficit
Ut fiat paſta in Trochiſcos efformanda.

TROCHISCI CARDIALGICI.

R. Teſtarum Oſtrearum,
Cretae albae ana uncias duas,
Gummi Arabici ſemunciam,
Nucis Moſchatae ſemidrachmam,
Sacchari albi uncias ſex.
Redigantur in pulverem, & fiant cum Aquae fontanae quantitate ſufficiente Trochiſci.

TROCHISCI LIQUIRITIAE COMMUNES.

R. Succi Liquiritiae Hiſpanici libras quatuor.
In Aqua ſimplici ſoluto & colato addatur
Sacchari albi libra una.
Inſpiſſentur & cum pauxillo Farinae fiant Trochiſci.

TROCHISCI DE MINIO.

R. Minii ſemunciam,
Mercurii ſublimati corroſivi unciam unam,
Micae Panis exſiccatae & tritae uncias quatuor.
Aquae Roſarum quantum ſufficit
Ut fiat maſſa in Trochiſcos oblongos formanda.

TROCHISCI PECTORALES REGII.

R. Succi Liquiritiae depurati,
Sacchari albi ana unciam unam,

Laudani liquidi guttas quindecim ad viginti.
Mifta fiant Trochifci, ponderis grani unius.

TURPETHUM MINERALE.

R. Mercurii Vivi,
Olei Vitrioli concentrati ana partes aequales.

In retorta ebulliant igne Arenae ad mercurii folutionem. Menftruo deinde ad ficcitatem abftracto, maffa in mortario marmoreo teratur, & repetitis vicibus Aqua frigida abluatur, iterumque ficcetur, addendo quicquid e menftruo abftracto ac Aqua primae ablutionis, ope Olei Tartari praecipitari poteft.

TUTIA PRAEPARATA.

Tutia repetitis vicibus in crucibulo candefacta, iterumque in Aqua exftincta, fuper marmor laevigetur.

VINUM CHALYBEATUM.

R. Limaturae Ferri uncias quatuor,
Cinnamomi,
Macis ana femunciam,
Vini Rhenani libras quatuor.

Per menfem fub frequenti agitatione macerata, colentur.

VINUM EMETICUM.

Vid. Aqua benedicta Rulandi.

VINUM LILIORUM CONVALLIUM.

R. Florum Liliorum Convallium recentium libram unam,

Aquae calidae libras ſex,
Spiritus Vini Gallici libras duas.
Per quindecim dies in loco calido digerantur: deinde deſtillatione eliciantur librae quatuor.

Eodem modo parantur:

VINUM MELISSAE.
MENTHAE.

VINUM SCILLITICUM.

R. Scillae praeparatae uncias octo,
Vini generoſi libras quatuor.
Per quindecim dies macerentur & filtrentur.

VINUM ZEDOARIAE.

R. Radicis Zedoariae tenuiter contuſae libras duas,
Spiritus Vini libras octo.
Macerentur per menſem. Additis denique
Aquae fontanae libris octo
Deſtillentur inde librae duodecim.

VITRIOLUM MARTIS.

R. Limaturae Ferri,
Olei Vitrioli Anglici ana libram unam,
Aquae fontanae puriſſimae libras tres.
Digerantur inter agitationes ad perfectam ſolutionem. Filtrata ad cuticulam iterum iterumque evaporentur, & cryſtalliſationi committantur.

VITRUM

VITRUM ANTIMONII.

Vid. Antimonii Vitrum.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

Vid. Antimonii Vitrum ceratum.

UNGUENTUM AEGYPTIACUM.

R. Viridis Aeris in pulverem redacti uncias quinque,
Mellis optimi uncias quindecim,
Aceti Vini fortis uncias decem.

Sub perpetua agitatione coquantur ad consistentiam Unguenti.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

R. Unguenti albi simplicis frigefacti uncias duas,
Camphorae cum paucis Olei Amygdalarum guttulis tritae grana viginti quatuor.

Misceantur.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

R. Axungiae porcinae libram unam,
Cerussae semilibram.

Ad lenem ignem fusa agitentur, ad perfectam refrigerationem.

UNGUENTUM DE ALTHAEA.

R. Mucilaginis Radicum Althaeae libram unam,
Seminis Foenugraeci,
Lini ana semilibram,

Butyri insulsi libras sex.
Coquantur ad aquosi exhalationem, & admista
Pulveris Radicis Curcumae uncia una,
Colliquentur. Ab igne remota & adhuc calida, additis
Terebinthinae unciis duabus
colentur & exprimantur.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

R. Lithargyrii in pulverem triti unciam unam,
Olei Olivarum libras duas cum dimidia.
Lento igne coquantur, paulatim addendo
Aceti Vini albi uncias duas.
Tum injiciantur
Cerae flavae unciae duae cum dimidia,
Resinae Pini drachmae quatuordecim.
Sub agitatione colliquatis & ab igne remotis addantur
Terebinthinae drachmae quatuordecim,
Immisceantur demum, in pulverem contrita:
Radicis Aristolochiae longae,
Myrrhae,
Bdellii,
Thuris ana drachmae sex,
Viridis Aeris drachmae duae.

Nota. Exposcitur ad curandos Equos.

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

Vid. Unguentum contra Vermes.

UNGUEN-

UNGUENTUM BASILICON.

R. Cerae flavae,
Refinae Pini,
Picis navalis ana uncias fex,
Lento igne colliquatis addantur
Terebinthinae unciae tres.
Calidis & colatis admifceatur
Olibani in pulverem triti uncia una.

UNGUENTUM CARDIACUM.

R. Unguenti populei,
de Althaea ana partes aequales.
Mifceantur.

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS.

R. Olei Olivarum libras duas,
Herbae Solani libram unam.
Coquantur ad confumtionem humidi, inter coquendum addendo
Cerae citrinae uncias octo.
Ab igne remotis injiciantur, tenuiffime trita:
Florum Zinci, vel Pompholygos,
Ceruffae Venetae ana unciae duae,
Plumbi ufti unciae fex,
Olibani unciae tres.
Agitando cum piftillo ligneo mifceantur.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

R. Terebinthinae Venetae femilibram,
Vitellos Ovorum quatuor.

Exacte

Exacte contritis admiſceantur
Olei Hyperici ſescuncia,
Olibani triti,
Myrrhae tritae ana drachmae tres.
Leniſſimo igne diſſletur aquoſum.

Nota. Si color deſideretur flavus, addatur Crocus.

UNGUENTUM ENULATUM.

R. Radicum Enulae recentium ſesquilibram,
Axungiae porcinae uncias novem,
Olei Olivarum puriſſimi uncias ſex.

In mortario lapideo contuſa, leni igne coquantur ad omnis humidi conſumtionem. Expreſſis & colatis addantur
Terebinthinae purae,
Cerae flavae ana ſescuncia.
Probe miſceantur ut fiat Unguentum.

UNGUENTUM HAEMORRHOIDALE.

R. Unguenti nutriti drachmas ſex,
Olei Hyoſcyami cocti drachmas duas,
Camphorae tritae ſcrupulos duos,
Croci ſcrupulum unum.
Miſceantur in Unguentum.

UNGUENTUM DE LINARIA.

R. Herbae Linariae cum floribus libram unam,
Sempervivi minoris uncias duas,
Hyoſcyami unciam unam.

Contuſa

Contusa macerentur per aliquot dies cum
Butyri insulsi liquati sesquilibra.
Coquantur & exprimantur.

UNGUENTUM DE LITHARGYRIO, seu NUTRITUM.

R. Aceti Lithargyrii,
Olei Olivarum ana partes aequales.
In mortario stanneo, vel marmoreo misceantur in unguentum.

UNGUENTUM MAJORANAE.

Vid. BUTYRUM MAJORANAE.

UNGUENTUM MERCURIALE, seu NEAPOLITANUM.

R. Mercurii vivi purissimi unciam unam,
Terebinthinae Venetae semunciam.
Ad Mercurii exstinctionem tritis addentur
Axungiae porcinae unciae tres.
Misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM MERCURIALE RUBRUM.

Vid. UNGUENTUM POMATUM RUBRUM.

UNGUENTUM NERVINUM.

R. Herbae Rosmarini,
Rutae,
Lavendulae cum Floribus,
Majoranae,
Salviae totius,
Menthae,
Florum Meliloti,
Chamomillae vulgaris,
Baccarum Juniperi viridium,
Lauri ana unciam unam.

Incisa & contusa macerentur per aliquot dies in
Olei Olivarum sesquilibra.

Coquantur ad humidi consumtionem. Expressis & colatis addantur,

Cerae citrinae unciae sex,
Terebinthinae Venetae unciae duae cum dimidia,
Olei Laurini unciae quatuor,
Terebinthinae drachmae decem,
Benzoes tenuissime tritae & Spiritu Vini rectificatissimo solutae sescuncia.

Misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM DE NICOTIANA.

R. Foliorum Nicotianae incisorum libras tres,
Succi Nicotianae uncias novem,
Axungiae porcinae sesquilibram.

Per noctem macerata coquantur leni igne ad humidi consumtionem. Expressis & colatis addantur,

Resinae

Refinae unciae tres,
Cerae flavae fescuncia,
Pulveris Radicis Ariftolochiae rotundae unciae tres.
Mifceantur in Unguentum.

UNGUENTUM NIHILI.

R. Nihili albi,
Tutiae praeparatae ana femunciam,
Camphorae tritae fcrupulum unum,
Axungiae viperinae, vel porcinae uncias fex.
Mifceantur in Unguentum.

UNGUENTUM NUTRITUM.

Vid. Unguentum de Lithargyrio.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

R. Saponis Veneti femilibram,
Olei Baccarum Juniperi deftillati unciam unam,
Seminis Erucae triti drachmas fex.
Mifceantur in Unguentum.

UNGUENTUM CONTRA PEDICULOS.

R. Seminis Sabadilli,
Sinapi ana uncias duas cum dimidia,

Radicis Hellebori albi,
Pyrethri ana uncias duas.
In pulverem redacta excipiantur
Axungiae porcinae libris quinque,
Olei laurini unciis quinque.

UNGUENTUM POMATUM ALBUM.

℞. Axungiae porcinae in Aqua Rosarum saepius lotae libram unam,
Aquae Rosarum fragrantis uncias tres,
Naphae,
Spiritus Rosarum ana semunciam,
Olei Lavendulae semidrachmam,
Ligni Rhodii,
de Cedro ana guttas sedecim.
Misceantur.

UNGUENTUM POMATUM RUBRUM, seu MERCURIALE.

℞. Mercurii praecipitati rubri,
Cinnabaris factitiae,
Minii ana uncias tres.
Tenuissime trita excipiantur
Axungiae porcinae libris duabus.
Misceantur in Unguentum.

UNGUEN-

UNGUENTUM POPULEUM.

R. Gemmarum Populi arboris recentium libras duas,
Axungiae porcinae libras quinque.
Conquassentur & serventur, donec per aestatem sequentia haberi possint recentia:
Foliorum Solani,
Hyoscyami,
Papaveris albi,
Sambuci,
Herbae Violae ana unciae quatuor,
Sempervivi unciae tres.
Incisa infundantur cum magmate priore, atque coquantur ad humidi consumtionem. Expressa colentur.

UNGUENTUM POTABILE RUBRUM.

R. Radicum Alkannae concisarum libram unam,
Vini rubri uncias decem.
Per aliquot dies absque calore macerata, additis
Butyri majalis recentis ac insulsi libris quinque
Coquantur ad humidi consumtionem, exprimantur & colentur.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

R. Axungiae porcinae saepius lotae uncias decem,
Radicis Oxylapathi coctae ac per setaceum trajectae uncias tres,
Enulae in pulverem redactae,

Baccarum Lauri contuſarum,
Sulphuris triti ana unciam unam,
Olei Tartari per deliquium ſemunciam.
Miſceantur in Unguentum.

UNGUENTUM AD TINEAM.

R. Picis liquidae libram unam,
Sulphuris vivi in pulverem triti uncias quatuor,
Cerae flavae unciam unam.
Miſceantur in Unguentum.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

R. Butyri inſulſi libram unam,
Fellis Tauri inſpiſſati uncias duas,
Pulveris Aloës hepaticae,
Trochiſcorum Alhandal,
Sulphuris citrini ana ſemunciam,
Olei ſtillatitii Abſynthii,
Anthos ana ſesquidrachmam.
Miſceantur in Unguentum.

INDEX.

INDEX.

Aqua

Balſamum

Gummi

Herba

Muſcus

Sal

Semen

Vipera.

Dansk Register.

Asparris.

Boborel.

Cretiſk

Guds:

Jordved-

Narislegræs.

Peruviansk

Slange-

Vægvardsfree.

Deutsches Register.

Brennessel-

Eberraut.

Harnkraut.

Rhodiſerholtz.

Stöchas=